

P. 11247



L. VIDAL & M. DAREAU


DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

1923



OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE

5, Rue de Tracy, PARIS (2^e)



11 2 24 1902
12 1 24 1902
13 1 24 1902

14 1 24 1902
15 1 24 1902
16 1 24 1902

17 1 24 1902
18 1 24 1902
19 1 24 1902

20 1 24 1902
21 1 24 1902
22 1 24 1902

1^{re} Partie



TABLE

par Indications Thérapeutiques
des Spécialités
figurant dans cet ouvrage

Table par Indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

- I. Albuminurie.
- II. Alimentation — Régimes.
- III. Analgésiques externes. — Anesthésiques.
- IV. Analgésiques internes — Antinévralgiques.
- V. Anémie. — Asthénie.
- VI. Antipyrétiques.
- VII. Antiseptiques externes — Désinfectants.
- VIII. Antiseptiques internes — Antitoxiques.
- IX. Artériosclérose — Hypertension artérielle — Angine de poitrine, etc.
- X. Arthritisme — Goutte — Rhumatisme.
- XI. Blennorrhagie.
- XII. Bronches — Poumons — Appareil respiratoire.
- XIII. Calmants — Antispasmodiques.
- XIV. Cœur — et Appareil circulatoire.
- XV. Constipation.
- XVI. Convalescences.
- XVII. Dermatoses — Acné — Eczéma — Furunculose — Crevasses des seins, etc.
- XVIII. Diabète.
- XIX. Empoisonnements et intoxications.
- XX. Estomac.
- XXI. Foie — Pancréas — Rate.
- XXII. Gynécologie et Obstétrique.
- XXIII. Hémostatiques.
- XXIV. Hypnotiques.
- XXV. Intestins.
- XXVI. Lymphatisme — Scrofule — Rachitisme.
- XXVII. Maladies infectieuses et parasitaires — Grippe — Paludisme, etc.
- XXVIII. Nerfs (Hystérie, Epilepsie, Neurasthénie, etc.)
- XXIX. Obésité.
- XXX. Ophtalmologie.
- XXXI. Oto — Rhino — Laryngologie.
- XXXII. Opothérapie et Vaccinothérapie.
- XXXIII. Peau et Cheveux (Gerçures, engelures, etc.)
- XXXIV. Reconstituants, Stimulants, Toniques, Récupérateurs.
- XXXV. Stomatologie.
- XXXVI. Syphilis.
- XXXVII. Système veineux — Varices — Hémorroïdes.
- XXXVIII. Tuberculose.
- XXXIX. Tumeurs — Cancer.
- XL. Voies Génito-Urinaires (Reins, Vessie, Utricle, Testicules, etc.).

I. — ALBUMINURIE

Alatyl.
Caratoxine.
Dialyl.
Doloma-Génophos.
Eau de Saint-Colomban.
Immunizols Grémy.
Néolyse.
Panhillac.
Santhéose.
Silicyl.

Théssine.
Théobryl Roche.
Theosalvosé.
Uraseptine Rogier.
Urazine.
Urnosol.
Uroformine Gobey.
Urométine Lambiotte.
Urotrypslne.
Varénoferments.

II. — ALIMENTATION — RÉGIMES

Allment Tinardon.
Atural.
Biotose.
Céréalose.
Embryonine Barré.
Extrait de malt français
Desjardins.
Farine dextrinée-maltée
Milo.
Farine lactée Salvy.
Farine lactée Nestlé.
Farines diverses Heude-
bert.
Farines maltées Jammet
Gloma.
Képhir Salmon.
Kymosine.
Lab-Ferment Petit-Mialhe.
Lait caillé Salmon.
Lebnol.
Maltosan.

Mokavène.
Nutromalt.
Opothérapie Chaix.
Opothérapie Choay.
Opothérapie du D^r Frayssé
Opothérapie Viglier-Huerre
Ovomaltine.
Pain essentiel Heudebert.
Pains spéciaux Heudebert.
Peptone Vassal.
Phosphatine Fatières.
Phosphogène Favrichon.
Produits diététiques Fa-
vrichon.
Painase Grémy.
Pulvo-Képhyr Salmon.
Silicyl.
Tridigestine Dalloz.
Vitamyl.
Zymatine.

III. — ANALGÉSIIQUES EXTERNES ANESTHÉSIIQUES

Algolane.
Bétul-Ol Midy.
Chéloïdine.
Chloroforme Usines du
Rhône.
Chloroforme Lambiotte.
Ether Usines du Rhône.
Goménol.
Isobromyl.

Kélène.
Salène Ciba.
Salénal Ciba.
Scurénaline.
Scurocaine.
Scuroforme.
Stovaine.
Urosan.

IV. — ANALGÉSIIQUES INTERNES ANTINÉVRAUGIQUES

Algoeratine Lancosme.
Ampoules de Pantopon Roche.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Anapeptone Vassal.
Antalgol Dalloz.
Antialgos Christiaens.
Antigrippine Midy.
Antipyrine Usines du Rhône.
Antodyne.
Asciatine Usines du Rhône
Aspirine Usines du Rhône.
Aspirine granulée Usines du Rhône.
Atophan Cruet.
Béatol.
Bi-bromure Vicario.
Borocalcyl Thévenot.
Broméine Montagu.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromure Robin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cervol.
Chloral bromuré Dubois.
Cryogénine Lumière.
Dial Ciba.
Dialacétine Ciba.
Didial Ciba.
Dozéol.
Energétène Valériane Byla
Eusomnine Bélières.
Hypneural Cos.
Képhaldol.
Micranyl Grémy.
Migrainol.

Naïodine.
Narcyl Grémy.
Neurène.
Neurinase.
Névralgol Brossard.
Pantopon Roche.
Paroxyl.
Phytothérapie Ciba.
Pilules Doumer.
Pilules de Moussette.
Pyramidon Usines du Rhône.
Pyréthane.
Quiétol.
Rhoféine.
Sambul Gondard.
Sédatine Christiaens.
Sédobrol Roche.
Sirop du Dr Gelineau.
Sirop Teyssèdre.
Soneryl.
Sorgal Thevenot.
Spasmalgine Roche (Ampoules, Comprimés).
Spasmine Jolly.
Thébaïl.
Tribromure Gigon.
Valbornine Rogier.
Valéral Pay.
Valérianate liquide Gignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Byla.
Valériane Gmet (sans alcool).
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.
Valéronal.
Véronidia Buisson.

V. — ANÉMIE — ASTHÉNIE

Algatan.
Aliment Tinardon.
Arséniode Buriat.
Ampoules Churchill indolores.

Bi-iodures Souffron.
Biocalcose.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.
Biophorine Girard.

Biophoral.
 Biosine Le Perdriel.
 Blétose Ciba.
 Biozol.
 Calciphose.
 Capsules Morrhuine Puy.
 Capsules Sals.
 Carnine Lefranc.
 Céréalose.
 Cérébroil Leysin.
 Céréossine.
 Colarsé.
 Chlorocalcion.
 Composés Gmet.
 Comprimés Roche de Thio-
 col.
 Créosol Dubois.
 Diastogène.
 Dragées Hecquet.
 Elbur Ducro.
 Embryonine Barré.
 Entode.
 Eucalcium.
 Eudynol.
 Extrait de malt français
 Desjardins.
 Extrait hématique Choay.
 Extrait moelle osseuse
 Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Fer Bravais.
 Féroxal.
 Fer Rabuteau.
 Ferrocodille et Ferricodille.
 Ferrocol.
 Ferromalt.
 Ferrophytine Ciba.
 Ferrygène Carron.
 Fortossan Ciba.
 Fosfoxyll Carron.
 Fucus Gmet.
 Gloma.
 Glutinettes d'hémoglo-
 bine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphates Robin.
 Glykolaïne Robin.
 Granulé Girard.
 Granules Crosnier.
 Hectine.
 Helital.
 Hémocrinol (Lipoïdes H. I.)

Hémagénine.
 Hémofixine Branchu.
 Hémoglobine Byla.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschamps.
 Hémostyl du D^r Roussel.
 Hémotonine.
 Hipposarcine Roy.
 Holos.
 Huile Riche.
 Hypophosphites Churchill.
 Iodaselle Delamarre.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodurase Couturieux.
 Iodures Souffron.
 Ionolides.
 Jugland Gmet.
 Kola Astier.
 Lécithine Clin.
 Lécithosine Robin.
 Lipocérébrine Chevreton.
 Lipocéthine.
 Marinol.
 Mésothorium Buisson.
 Mourhuétine Jungken.
 Narsenol.
 Nécarsycodille.
 Néarsite.
 Néo-rhomonol.
 Nergine Heudebert.
 Neurotrophol Byla.
 Neurovoïne Grémy.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Nucléo-Fer Girard.
 Opocalcium du D^r Guer-
 sant.
 Orexyl.
 Pancalcine.
 Pepto-Fer du D^r Jaillot.
 Peptonate de fer Robin.
 Phoscalgène.
 Phosphogène Favrichon.
 Phosphorgane.
 Phytine Ciba.
 Pilules Blancard.
 Pilules Gyp.
 Plurion Couturieux.

Prosthénase Galbrun.
 Quassia-Kina Rabet.
 Quina Baron.
 Quina-Fer Mechling.
 Quinquina Gmet.
 Reconstituant Mary.
 Santogénol Caubin.
 Séroplase
 Sérum Ferrugineux Fraisse
 Sérum Neurophile Thé-
 venot.
 Sérum névrosthénique
 Fraisse.
 Sérum Oliviero.
 Sinrénaline Dechaussy.
 Sirop Auzes.
 Sirop Blancard.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Spectrol.

Splenocrinol (lipofides H. I.)
 Splenotonic Grémy.
 Strychnal Longuet.
 Stenergine.
 Stenophyl Vigan.
 Succomusculine Chaix.
 Synergyl Vadam.
 Tabural Monal.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Vanadarsine (Ampoules,
 Gouttes).
 Vanadine Chevrier.
 Vanucléol.
 Vérianne Burlat.
 Vin de Bugeaud.
 Vin Girard.
 Vin et Sirop Nourry.
 Zohol.

VI. — ANTIPYRÉTIQUES

Antigrippine Midy.
 Antipyrine Usines du
 Rhône.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Apaludol.
 Cervol.
 Cryogénine Lumière.
 Dialacétine Ciba.
 Elbon Ciba.

Endovarénol.
 Néoquinine Falières.
 Pantopon Roche.
 Pyramidon (Usines du
 Rhône.)
 Pyréthane.
 Quinoidine Duriez.
 Quinquina Gmet.
 Rhoféine.

VII. — ANTISEPTIQUES EXTERNES (DÉSINFECTANTS)

Airol Roche.
 Aloysine.
 Antodol.
 Antiphlogistine.
 Baume Delacour.
 Boricine.
 Clonazone Daufresne.
 Comprimés Guillaumin à
 l'oxycyanure d'Hg.
 Créosoforme Lambiotte.
 Cytovarénol.
 Ektogan Bocquillon.
 Goménol.
 Keriol.
 Leucovarénol.

Lipovarénol.
 Lusoforme.
 Mésosome.
 Néol.
 Quataplasme.
 Savon Roche au thigénol.
 Savons antiseptiques Vigan.
 Savons Lieutaud.
 Savons Spa.
 Stéramine.
 Thigénol Roche.
 Thymine.
 Tochlorine.
 Vioforme Ciba.

VIII. — ANTISEPTIQUES INTERNES (ANTITOXIQUES)

Amibiasine.	Lactobacilline.
Aniodol.	Lebnol.
Antalgol Dalloz.	Lentol Couturieux.
Apaludol.	Levurase.
Atenos.	Mésiforme.
Bulgarine Thépénier.	Mycolysine du D ^r Doyen.
Carbochloryls.	Néolides.
Chloramine.	Panbiline.
Choléoboldine Thévenot.	Phylactone Byla.
Clonazone Daufresne.	Physiosthénine.
Colloïdes Clin.	Produits Midy au Collargol
Diastogène.	Propidon.
Endovarénol.	Ractopanbiline.
Entéroseptyl Clérambourg	Rhéantine Lumière.
Entérozone.	Sauge Gmet.
Félamine.	Sélénol Couturieux.
Glycogène Clin.	Septicémine Cortial.
Goménol.	Silicyl.
Hypodermozone.	Staphylase du D ^r Doyen.
Iodaselle Delamarre.	Staphylococcine.
Iodaseptine Cortial.	Thionhydrol Grémy.
Iodométine.	Urnosol.
Immunizols Grémy.	Varénol.

IX. — ARTÉRIOSCLÉROSE HYPERTENSION ARTÉRIELLE ANGINE DE POITRINE

Alatyl (Lipolides H. I.).	Diurène.
Aloysine.	Eniode.
Ampoules Boissy.	Eranol.
Antonal.	Euphrénine Bastia.
Arséniodé.	Eupnine Vernade.
Artério-sérum Vincardi.	Entensyl Grémy.
Benzo-Iodhydrine.	Glycocarpine.
Benzylol.	Goménol.
Bi-Iodure Souffron.	Gui Gmet.
Cardibaïne.	Guipsine.
Cardiotonic Grémy.	Hémoductyl.
Collo-Iode Dubois.	Iodalose Galbrun.
Cathiodé.	Iodamélis Logeais.
Cratægus Bocquillon.	Iodéyl Fournier.
Curiode.	Iodogénol Pépin.
Dépuratif Kromelinck.	Iodométine.
Diasclérol.	Iodostarine Roche.
Dioséine Prunier.	Iodurase Couturieux.

Iodone Robin.
 Iodure Philippe.
 Iodures Souffron.
 Iode organique Boissy.
 Lipoïne Ciba.
 Lipoïdine Ciba.
 Mésothorium Buisson.
 Naïodine.
 Oléo-iode Dubois.
 Opothérapie Chaix.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie du D^r Frayssé.
 Opothérapie Moncour.
 Opothérapie Vigier-Huerre.
 Panbiline.
 Phythothérapie Ciba.
 Pilules Doumer.
 Rectopanbiline.
 Rénotonic Grémy.
 Riodine.
 Rythmos Leysin.

Santhéose.
 Scillarène.
 Serum hypotensif Fraisse.
 Silisode.
 Silicyl.
 Sornaldéhyde.
 Sornyl.
 Spasmine Jolly.
 Théisine.
 Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).
 Théosalvose.
 Thyrénine Grémy.
 Thyrol (Lipoïdes H. I).
 Trinitrine caféinée Dubois.
 Trinitrine Vicario.
 Uracétose.
 Urnosol.
 Urotrypsine.
 Veinosine.

X. — ARTHRITISME — GOUTTE RHUMATISME

Afatyl (Lipoïdes H. I).
 Akcsol Muzl.
 Algatan.
 Algolane.
 Ampoules Reipar.
 Antalgol Dalloz.
 Antialgos Christiaens.
 Antiphlogistine.
 Antiurique de Contrexéville.
 Arséniodé.
 Arthritose.
 Aspirine Usines du Rhône.
 Aspirine granulée Usines du Rhône.
 Atophan Cruet.
 Atoquinol Ciba.
 Azulrol.
 Benzo-iodhydrine.
 Baume du D^r Gigon.
 Baume Rhodia.
 Bétul-ol Midy.
 Capsules de Morrhuine Puy.
 Cathiodé.
 Cervol.

Chéloïdine.
 Colarsé.
 Colchi-sal Midy.
 Colloïode Dubois.
 Collothiol.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Corps thyroïdes Moncour.
 Curatoxine.
 Curtode.
 Diabétifuge.
 Dialyl.
 Diasclérol.
 Dimétol Vicario.
 Doloma-Cénophos.
 Eau de Saint-Colomban.
 Eranol.
 Extrait hépatique Choay.
 Extrait thyroïdien Choay.
 Farines maltées Jammal.
 Fosfoxyll Carron.
 Fucus Gmet.
 Globules Fumouze.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Hépatotonic Grémy.

Immunizols Grémy : Rhumatisme.
 Iodalose Galbrun.
 Iodamelis Logeais.
 Iodaselle Delamarre.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodométine.
 Iodo-thyroïdine Catillon.
 Iodures Cros.
 Iode organique Boissy.
 Lebnol.
 Lipoiodine Ciba.
 Liqueur Laville.
 Liseranine Bellières.
 Migrainol.
 Mutandine Grémy.
 Naiodine.
 Néolyse.
 Néphrocrinol (Lipoides H. I.).
 Névralgol Brossard.
 Nitroyl Leysin.
 Oléo-iodé Dubois.
 Oxydothyridine Pâris.
 Panbiline.
 Panurol Tissot.
 Phosoforme.
 Phosphirine.
 Pilules du Dr Séjournet.
 Pipérazine Mkly.
 Pyrétthane.
 Rhésal Vicario.
 Riodyne.
 Salène Ciba.

Saliceral.
 Salsanos.
 Salyserum.
 Sambul Gondard.
 Santhéose.
 Sels de Lithine effervescents Le Perdriel.
 Seotral Leysin.
 Silicyl.
 Solurol.
 Sphérulines Moncour.
 Sulfargyre.
 Sulfoiodol Robin.
 Sulfurine.
 Théisine.
 Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).
 Thyonhydrol Grémy.
 Thyrénine Grémy.
 Topique Bertrand.
 Ulmarène Gigon.
 Ulmarol Gigon.
 Uracétose.
 Urascol.
 Uraseptine Rogier.
 Urazine.
 Urisal du Dr Deschamp
 Urifluine.
 Uroformine Gobey.
 Urométine Lambiotte.
 Urosan.
 Urotrypsine.
 Vin de Bugeaud.

XI. — BLENNORRAGIE

Arbéol.
 Capsules Raquin.
 Cedryl.
 Clonazone Daufresne.
 Coccidal Grémy.
 Dmégon.
 Eumétine.
 Felargent.
 Glyco-Phytol.
 Goménol.
 Gonacrine.
 Gonovarénol.
 Gynéco-Phytol.
 Hexoal.

Immunizols Grémy : Urétrite.
 Mictasol.
 Néol.
 Ovules au Phytol.
 Phytol.
 Phytoline Albarran.
 Pipérazine Midy.
 Préventyl.
 Salol Usines du Rhône.
 Santal Monal.
 Santalol Montagu.
 Santhéose.
 Sécacornine Roche.

Spasmalgine Roche.	Valériane Dausse.
Spasmine Jolly.	Valériane Gnet (sans alcool).
Valbornine Rogler.	Valérianose Gigon.
Valéral Puy.	Valérobromine Legrand.
Valérianaté liquide Grignon.	Valéromenthol.
Valérianate Pierlot.	Valéronal.
Valériane Byla.	Vériane Buriat.

XIV — CŒUR ET APPAREIL CIRCULATOIRE

Ampoules de Digalène Roche.	Iodamelis Logeais.
Ampoules de Théobryl Roche.	Kola Astier.
Antirrhode.	Kola Midy.
Benzo-Iodhydrine.	Lipoféine Ciba.
Cardibaïne.	Mokavène.
Cardiocrinol (Lipoides H. L.).	Ousabaïne.
Cardiotonic Grémy.	Panbiline.
Cathode.	Pantopon Roche.
Cigarettes Escouffaire.	Physcine Grémy.
Combretine Bocquillon.	Phytothérapie Ciba.
Crataegus Bocquillon.	Pneumogéine Renard.
Curiodé.	Poudre Escouffaire.
Dépuratif Kromelneck.	Rectopanbiline.
Diastogène.	Rythmos Leysin.
Digalène Roche.	Santhéose.
Digibaïne.	Seillarène Sandoz.
Digicardine.	Sécacornine Roche.
Digifoline Ciba.	Silicyl.
Digitaline cristallisée Native.	Sirop de Digitale Labélonne.
Digitaline Petit-Mialhe.	Sédobrol Roche.
Diurène.	Spasmine Jolly.
Eupnine Vernade.	Strophantus Catillon.
Extrait myocardique Choay.	Sulfargyre.
Hamamélode.	Théisine.
Iodalose Galbrun.	Théobromose Dumesnil.
	Théobryl Roche (Ampoules, Gouttes).
	Théosalvose.
	Trinitrine Caféinée Dubé

XV. — CONSTIPATION

Amylodiastase Thépénier.	Cascara liquide Alexandre.
Anusol.	Cascara Midy.
Benzylol.	Cascarine Leprince.
Bilifluine.	Choléoboldine Thévenot.
Biotose Ciba.	Choléo-combrétol boldiné

Cristolax.	Paraffinéol Hamel.
Entéroerinol (Lipoides H. I.).	Pastilles Citon.
Extrait entéritique Choay.	Pastilles laxatives Chatel-Guyon Miraton.
Extrait intestinal Moncour.	Péristaltine.
Farines maltées Jammet.	Pilules purgatives du D ^r Dehaut.
Frangoléine Auelair.	Poudre Georges.
Frangulose Flach.	Reetopanbiline.
Fucosine.	Sallia Chatel Guyon Miraton.
Glycobyl.	Santéiné.
Grains laxatifs de Châtel Guyon Miraton.	Scorogène.
Grains de santé du D ^r Franek.	Sirop de la Maternité.
Hormolaxine.	Suppositoires Chaumel.
Hullaxine Gillet.	Suppositoires Pépet.
Huile Crolas.	Tamar Indien.
Képhir Salmon.	Tanacetyl.
Lansoyl.	Taxol.
Laxagarine.	Thaolaxine.
Laxamalt.	Tisane Saint-Luc.
Laxatif orgeat.	Tridigestine Dalloz.
Laxopeptine Girard.	Urnosol.
Lebnol.	Varénoferments.
Lieutine Grémy.	Varilaxine.
Listose Viscario.	Vasolaxine.
Magnésie lourde de Durel.	Végétaline Dubois.
Nujol.	Zymatine.
Oléolaxine.	

XVI. — CONVALESCENCES

Aliment Tinardon.	Céréossine.
Ampoules Churchill indolores.	Colarsé.
Arséniodé Buriat.	Composés Gmet.
Arsyeodile.	Créosal Dubois.
Ascofène Rivier.	Diasténine Grémy.
Biocalcose Chevretin.	Diastogène.
Biogénol Demasles.	Doloma-Enophos.
Biophorine Girard.	Dragées Hecquet.
Biosine Le Perdriel.	Dragées névrosthéniques Yse.
Biotose Ciba.	Elixir Duchamp.
Biozol.	Elixir Ducro.
Calcéose.	Embryonine Barré.
Calcéline.	Enterozone.
Calciphose.	Eucalcium.
Capsules Sals.	Exo-Orebitine Byla.
Carnine Lefraneg.	Extrait orehitique Choay.
Céréalose.	Farines maltées Jammet.

Fer Bravais.
 Feroxal.
 Fer Rabuteau.
 Ferrocodile et Ferricodile.
 Ferromalt.
 Ferrophytine Ciba.
 Ferrygène Carrau.
 Fortossan Ciba.
 Fosloxyt Carron.
 Fraxol.
 Gaurel.
 Géodyl.
 Gloma.
 Glutinettes d'hémoglobine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Grannlés Girard.
 Glykolaine Robin.
 Héltal.
 Hémagénine du D^r Giraud.
 Hémocrinol (Lipoides H.I.).
 Hémostixine Braucha.
 Hémoglobine Byla.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hémostyl du D^r Roussel.
 Holos.
 Huile Riche.
 Hypophosphites Churchill.
 Kola Astier.
 Kola Midy.
 Lipochol Byla.
 Lipocithine.
 Malt calciné.
 Marinol.
 Mésotliorlum Buisson.
 Morrhuétine Jungken.
 Musculosine Byla.
 Néo-Arsycodile.
 Néo-Rhomnol.
 Nergine Heudebert.
 Neurotrophol Byla.
 Neurovoïne Grémy.
 Névrosthénine Grémy.
 Névrosthénine Freyssinge.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Nucléo fer Girard.
 Opocalcium du D^r Guer-
 sant.
 Opothérapie Chaix.
 Opothérapie Choay.

Opothérapie du D^r Frayze.
 Orchitine Byla.
 Ostéo-hépatine.
 Ovo-lécithine Billon.
 Pancalcine.
 Panhémiol.
 Pepto-fer Jalliet.
 Pepto-kola Robin.
 Peptonate de fer Robin.
 Phoscalgène.
 Phosphogène Favrichon.
 Phosphorgane.
 Phytine Ciba.
 Plurion Conturieux.
 Prosthénase Galbrun.
 Quassia-Kina Rabot.
 Quina Baron.
 Quina-Fer Mechling.
 Quina Laroche.
 Quinéine.
 Quinquina Gmet.
 Reconstituant Mary.
 Rhomnol.
 Santogénol Caubin.
 Serum Neurophile Thève-
 not.
 Serum Oliviero.
 Sinrénaline Dehaussy.
 Sirop Girard.
 Sirop d'Hémoglobine Byla.
 Spectrol.
 Splenotanie Grémy.
 Stenergine.
 Stenophyl Vigan.
 Strychnal Longuet.
 Strychnarsitol Robin.
 Strychno-Fluocodyle.
 Succomusculine Chaix.
 Synergyl Vadam.
 Toni lécithine Rogier.
 Tonikéint Chevreton.
 Tonndol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Vanadarsine.
 Vériane Buriat.
 Vitamyl.
 Vin Bugeaud.
 Vin Girard.
 Vin et Sirop Nourry.
 Zohol.

XVII. — DERMATOSES — ACNÉ

ECZÉMA — FURONCULOSE, CREVASSES DES SEINS, etc.

Aloysine.	Iodométine.
Anaseptone Vassal.	Iodone Robin.
Antiphlogistine.	Iodostarine Roche.
Arséniode Buriat.	Iodothyryne Catillon.
Atoquinol Ciba.	Iodurase Couturieux.
Baume Delacour.	Iodures Souffron.
Baume Duret.	Jugland Gmet.
El-iodure Souffron.	Laccodermes.
Boricine Meissonnier.	Lebnol.
Bulgarine Thépénier.	Levurase.
Capsules Sals.	Levurine Couturieux.
Carbochloryls.	Lipoiodine Ciba.
Carbolactyl.	Néolyse.
Clonazone Daufresne.	Néoplalysines du D ^r Ri-
Colloïxols du D ^r Riquoir.	quoir.
Collothiol.	Nisaméline Trouette-Per-
Créosoforme Lambiotte.	ret.
Curatoxina.	Ouataplasme.
Curiode.	Panuröl Tissot.
Dermo-plastos Dumesnil.	Phlyctol.
Diadermine.	Procuta.
Diasclérol.	Propidon.
Dimetol Vicario.	Rhagadine Bracquemond.
Dmesta. (Neo-)	Riodine.
Ebanyl.	Sapolan.
Eczéda.	Savon Lieutaud.
Ektogan Bocquillon.	Savon Pérusol.
Emplâtre Cavaillès.	Savon Roche au Thigé-
Endovarénol.	nol.
Entéroseptyl Clérambourg.	Savons Spa.
Extrait thyroïdien Choay.	Savons Vigier.
Eranol.	Silicyl.
Farines maltées Jammet.	Siróp Crosnier.
Favolysine Thévenot.	Stannoxyl.
Ferromalt.	Stannylose Thévenot.
Fixine Grémy.	Stanion.
Gastro-Sodine.	Staphylase du D ^r Doyen.
Goménol.	Staphylo-coccine Fraquet.
Granules Crosnier.	Staphylocide Audras.
Hémagénine du D ^r Giraud.	Stéramine.
Huile Riche.	Sulfargyre.
Immunizols Grémy : Acné,	Sulfodermol Rambaud.
Eczéma, Furonculose.	Thigénol Roche.
Iodarsenic Guiraud.	Thyrénine Grémy.
Iodaselle Delamarre.	Thionhydrol Grémy.
Iodéyl Fournier.	Tridigestine Dalloz.
Iodogénol Pépin.	Ulcérine Berger.

Varénoferments.
Varénol.

Xemaderm.

XVIII. — DIABÈTE

Blozol.
Choléo-Combrétol Boldi-
nisé.
Diabétifuge.
Diasclérol.
Glycorol.
Hémofixine Branchu.

Hépatotonic Grémy.
Panbiline.
Pilules du D^r Séjournet.
Sinahin.
Urnosol.
Vin de Bugeaud.

XIX. — EMPOISONNEMENTS INTOXICATIONS


Ambiasine.
Bulgarine Thépénier.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Colloïdes Clin.
Digalène Roche.
Duodénase Cros.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entérozone.
Eusomnine Bélières.
Hypodermozone.
Iodaseptine Cortial.
Lantol Couturieux.
Lebnol.

Mycolysine du D^r Doyen.
Naiodine Logeais.
Panbiline.
Phylactone Byla.
Propidon.
Produits Midy au Col-
largol.
Rectopanbiline.
Régyl.
Sélénol Couturieux.
Septicémine.
Staphylase du D^r Doyen.
Staphylo-coccine Fraquet.
Théisine.

XX. — ESTOMAC

Antacidol.
Benzolactol.
Biogastrine.
Bismuth Desleaux.
Carbolactyl.
Cétrarose Gigon.
Charbon Fraudin.
Charbon Tissot.
Choléoboldine Thévenot.
Citrosodine Grémy.
Colloïl Leysin.
Condurango Gmet.
Digestif Harvey.
Doloma-Cenophos.
Dyspeptine Hepp.

Elixir de Joseph Bonjean.
Elixir Ducro.
Elixir du D^r Mialhe.
Entérozone.
Extrait de malt français
Desjardins.
Extrait gastrique Choay.
Extrait gastrique Moncor.
Farine de malt Heudebert.
Farine dextrinée malté
Milo.
Farines maltées Jammé.
Fluoridia.
Gastrocalcine.
Gastrocaol.

Gastrosodine.
 Gélobarine.
 Gélogastrine.
 Hipposarcine Roy.
 Hopogan Boequillon.
 Kaolinase.
 Képhir-Salmon.
 Lebnol.
 Levurase.
 Maltosan.
 Mangaine.
 Néolyse.
 Néoplalysines du D^r Ri-
 quoir.
 Nutronalt.
 Opothérapie Choay.
 Panbiline.
 Pangestyl Narty.
 Peptone Trouette-Perret.
 Peptonal.
 Peptone Vassal.
 Peptosthénine. 
 Persodine Lumière.
 Phosoforme.

Poudre Génia.
 Proxytol.
 Psinase Grémy.
 Quina Laroche.
 Quassia-Kina Rabot.
 Rectopanbiline.
 Régyl.
 Royérine Dupuy.
 Salsanos.
 Saturel.
 Sauge Gmet.
 Sel de Hunt.
 Sel digestif Bé-me-cé.
 Spasmalgine Roche (Am-
 poules).
 Stomophile.
 Sulfotodol.
 Tablettes Perroud.
 Tridigestine Dalloz.
 Urnosol.
 Vanadine Bocquillon.
 Vin de Bugeau.
 Zymatine.

XXI. — FOIE — PANCRÉAS — RATE

Biléyl Fournier.
 Bilifluine.
 Bilirhéne.
 Boldo Gmet.
 Carbolactyl.
 Chlorobyl.
 Choléine Camus.
 Cholélyse.
 Choléo-boldine Thévenot.
 Choléo-Combretol boldi-
 nisé.
 Choléo Kinase.
 Choléo-lactol.
 Cholergine.
 Combretine Boequillon.
 Diurène.
 Duodénase Cros.
 Extrait de bile Choay.
 Extrait de bile Moncour.
 Extrait hépatique Choay.
 Extrait entéro-pancréati-
 que Moncour.
 Extrait pancréatique
 Choay.

Extrait splénique Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Félamine.
 Frangoléine Auclair.
 Gastrosodine.
 Glycolactimase.
 Grains de santé du D^r
 Franck.
 Hépatobyl.
 Hépatocrinol (Lipoides
 H. I.).
 Hépatotanie Grémy.
 Hexotal.
 Jécol.
 Lebnol.
 Magnésie lourde de Durel.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie du D^r Frayssé.
 Opothérapie Viglier-Huerre.
 Panbiline.
 Pancréatotanie Grémy.
 Pancréol (Lipoides H. I.).
 Pangestyl Narty.
 Peptosthénine.

Pilules Debouzy,
 Proxylol.
 Rhodazyl.
 Rectopanbiline.
 Salsanos.
 Sornyl.
 Spasmalgine Roche (Am-
 poulés, Comprimés).
 Sphérulines Moncour.

Splénocrinol (Lipoides
 H.I.).
 Tridigestine Dalloz.
 Uracétose.
 Urisanine.
 Urnosol.
 Urosan.
 Yaourtine.
 Zymatine.

XXII. — GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

Agomensine Cyba.
 Alrol Roche.
 Anexol.
 Antiphlogistine.
 Aniodol.
 Anneaux Pessaires J. P.
 Boricine Meissonnier.
 Cétrarose Gigon.
 Chloral bromuré Dubois.
 Clonazone Daufresne.
 Colloïxols du Dr Riquoir.
 Comprimés Guillaumin à
 l'oxycyanure d'Hg.
 Corps thyroïdes Moncour.
 Cosmargyre Thévenot.
 Crataegus Bocquillon.
 Ektogan Bocquillon.
 Elixir de Virginie Nyrdhal.
 Epoqualine.
 Extrait ovarien Choay.
 Extrait mammaire Choay.
 Extrait placentaire Choay.
 Extrait hypophysaire (lobe
 postérieur), injectable
 Choay.
 Félargent.
 Fritaline Grémy.
 Gobérol.
 Goménol.
 Gyneco-Phytol.
 Gynéose.
 Gynergène Sandoz.
 Gynocrinol (Lipoides H.I.)
 Gynohutéol (Lipoides H. I.)
 Gynopausine.
 Hamamelis Gmet.
 Hexotal.
 Hémoductyl.
 Hémoglobine Deschiens.

Hydralin.
 Hypergal Grémy.
 Immunizols Grémy : Mé-
 trites.
 Laurénol.
 Leucovarénols.
 Ménovarine.
 Mésiforme.
 Métritols.
 Nalodine Logeais.
 Néolides.
 Novarine Vicario.
 Ocréine Grémy.
 Opothérapie Chaux.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie Vigier-Huerre.
 Ovules Chaumel.
 Ovules Derma.
 Ovules au Phytol.
 Ovules Roche au Thigénol.
 Panbiline.
 Physéine Grémy.
 Phytoline Albarran.
 Poudre ovarienne Moncour.
 Pyréthane.
 Rectopanbiline.
 Savon antiseptique Lieu-
 taud.
 Savons antiseptiques Vi-
 gier Huerre.
 Savon Pérusol.
 Savon Roche au thigénol.
 Sécacornine Roche.
 Sirop de la Maternité.
 Sistomensine Ciba.
 Sornyl.
 Sulfargyre Thévenot.
 Suppo-Gynals.
 Surrénotanin Grémy.

Syncerines n° 1-4-4 bis-
6 bis-7.
Tampol Roche.
Thigénol Roche.
Thionhydrol Grémy.
Thymine.
Thyrénine Grémy.

Thyrocréine Grémy.
Topique Bertrand.
Uraseptine.
Urométine Lambiotte.
Véinosine.
Vitamyl.

XXIII. — HÉMOSTATIQUES

Anthéma.
Boricine Meissonnier.
Chlorocalcion.
Elixir de Virginie Nyrdaht.
Ergot de seigle.
Ergotine Bonjean.
Extrait de sérum sanguin
Choay.
Extrait hypophysine (lobe
postérieur) injectable
Choay.
Gui Gmet.
Gulpsine.

Gynergène Sandoz.
Hamamelode.
Hamamelis Gmet.
Hémostyl du D^r Roussel.
Physéine Grémy.
Rénaleptine.
Scurénaline.
Sécacornine Roche (Am-
poules. Comprimés).
Serum Oliviero.
Sirénaline Dechaussy.
Spectro.

XXIV. — HYPNOTIQUES

Achanol (Opïomanie, Mor-
phinomanie).
Ampoules de Pantopon
Roche.
Ampoules de Spasalgine
Roche.
Arseniode Buriat.
Asciatine.
Boules Quils.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromures Souffron.
Chroral bromuré Dubois.
Crataegus Bocquillon.
Dial Ciba.
Dialacétine Ciba.
Dédial Ciba.
Dozéal.
Energétène de Valériane
Byli.
Eusomnine Bellères.
Gardénal.
Hypneural Cos.
Hypodermozone.
Isobromyl.

Nalodine Logeais.
Narcyl Grémy.
Neurène
Neurinase.
Neurotanie Grémy.
Nyctal.
Pantopon Roche.
Sédobrol Roche.
Sédol.
Sirop d'Auhergier.
Sirop du Dr Gélinau.
Sirops Henry Mure.
Sirop Teyssède.
Somnifène Roche.
Sonéryl.
Sorgal Thévenot.
Spasalgine Roche (Am-
poules, Comprimés).
Spesmine Jolly.
Tribromure Gigon.
Thébafl.
Valbornine Rogler.
Valéral Puy.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.

Valériane Gmet.
Valérobromine Legrand.
Valéromenthol.

Valéronal.
Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.

XXV. — INTESTINS

Acésine.
Adrépatine.
Aloysine.
Alunozal.
Amibiasine.
Anudal.
Amylodiasase Thépénier.
Anapeptone Vassal
Antirrhoïde.
Benzolactol.
Benzylol.
Bismuth Desleaux.
Bilifluine
Biolactyl Fournier.
Blédine Jacquemaire.
Boldo Gmet.
Boléase Monal.
Bulgarine Thépénier.
Carbolactyl.
Cascara liquide Alexandre.
Cascara Midy.
Cascarine Leprince.
Cathiodé.
Charbon Tissot.
Chloramine.
Chlorobyl.
Choléitoires Byla.
Choléoboldine Thévenot.
Colloïl Leysin.
Choléo-Combrétol boldi-
nisé.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Combrétine Bocquillon.
Condurango Gmet.
Coréine.
Créosoforme Lambiotte.
Cristolax.
Dimol.
Doloma-Œnophos.
Duodénase Cros.
Dyspeptine Hepp.
Elixir de Jh. Boujean.
Dépuratif Kromelinck.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entérovaccin Lumière.

Enterozone.
Extrait de bile Choay.
Extrait entéritique Choay.
Extrait entéro-hépatique.
Choay.
Extrait intestinal Moncour
Farine dextrinée maltée
Milo.
Farines maltées Jammet.
Félamine.
Fixine Grémy.
Fluoridia.
Frangoléine Auclair.
Frangulose Flach.
Gastrocaol.
Gastro-sodine.
Gélotanin.
Glycobyl.
Glycolactimase.
Goménol.
Gouttes Lolotsé Isberg.
Grains laxatifs de Châtel-
Guyon Miraton.
Hipposarcine Roy.
Hopogan Bocquillon.
Hormolaxine.
Hullaxine Gillot.
Huile Crolas.
Immunizols Grémy : Ap-
pendicite ; Dysenterie ;
Entérite.
Képhir-Salmon.
Lab-lacto ferment.
Lactimase.
Lactobacilline.
Lactolaxine Fydau.
Lactozymase.
Lansoyl.
Laxagarine.
Laxamalt.
Laxatif Orgeat.
Laxopeptine Girard.
Lebnol.
Levurase.
Lieutine Grémy.

Listosé Vicario.
 Magnésie lourde de Durel.
 Maltosan.
 Mangafne.
 Néolyse.
 Néoplalysines du D^r Ri-
 quoir.
 Nujol.
 Nutromalt.
 Oléolaxine.
 Panbiline.
 Pancréol (Lipoïdes H. I.)
 Panlacto Midy.
 Papafne Trouette-Perret.
 Paraffincol Hamel.
 Pastilles laxatives Châtel-
 Guyon Miraton.
 Peptosténine.
 Péristaltine.
 Pilules purgatives du D^r
 Dehaut.
 Phylactone Byla.
 Physéine Grémy.
 Pommade Midy.
 Poudre Genda.
 Proxylol.
 Pslnase Grémy.
 Rectoline.

Rectopanbiline.
 Sallia Châtel-Guyon Mi-
 raton.
 Salol Usines du Rhône.
 Salsanos.
 Scorogène.
 Sirop de la Maternité.
 Sphérulines entéritiques.
 Moneour.
 Stomophile.
 Sulloiodol
 Suppositoires Adreno-Styp-
 tiques Midy.
 Suppositoires Pepet.
 Ténifuge Kirn.
 Tamar indien.
 Taxol.
 Thaolaxine.
 Thigénol Roche.
 Tisane Saint-Luc.
 Tridigestine Dalloz.
 Urnosol.
 Varénoferments.
 Varilaxine.
 Vasolaxine.
 Végétaline Dubois.
 Yaourline.
 Zymatine.

XXVI. — LYMPHATISME — SCROFULE RACHITISME

Arsénolode Buriat.
 Biocalcose.
 Biosine Le Perdriel.
 Biozol.
 Cachets Roche de Thio-
 col.
 Calciphosa.
 Capsules de Morrhuine
 Puy.
 Capsules Sals.
 Carnine Lefrancq.
 Céréalose.
 Céréossine.
 Chloro-Calcion.
 Comprimés Roche de Thio-
 col.
 Créosal Dubois.
 Cariode.

Diastogène.
 Elixir Duero.
 Embryonine Barré.
 Eucalcium.
 Extrait malt français Des-
 jardins.
 Extrait moelle osseuse
 Choay.
 Farines maltées Jammot.
 Ferromalt.
 Ferrophytine Ciba.
 Fosloxy Carron.
 Globules Fumouze.
 Glutinettes d'hémoglobine
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Granules Grosnier.
 Granulé Girard.

Hédital.
 Hémagénine.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémofixine Branchu.
 Histogénol Naline.
 Holos.
 Huile Riche.
 Hypophosphites Churchill.
 Iodaloze Galbrun.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodaselle Delamarc.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodostarine Roche.
 Iodurase Couturieux.
 Lécithosine Robin.
 Lipocithine.
 Lipocythol Grémy.
 Lipofodine Ciba.
 Malt calciné.
 Marinol.
 Morrhuéline Jungken.
 Nergine Heudebert.
 Opocalcium du D^r Guer-
 sant.

Ovomaltine.
 Panbiline.
 Pancalcine.
 Panhémol.
 Persodine Lumière.
 Phospho-Galacol Mary.
 Phosphogène Favrichon.
 Phosphorgané.
 Phytine Ciba.
 Prosthénase Galbrun.
 Reconstituant Mary.
 Sirop Auzes.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Girard.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Stenergine.
 Stenophyl Vigan.
 Succomusculine Chaix.
 Tonudol.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Trixyl Fraudin.
 Vanadarsine.
 Vanucléol.
 Varénol.
 Vin Girard.
 Vitamyl.
 Zohol.

XXVII. — MALADIES INFECTIEUSES

et PARASITAIRES. GRIPPE, PALUDISME, ETC.

Apaludol Auclair.
 Aplexil.
 Antalgot Dalloz.
 Atonos.
 Capsules Sals.
 Cervol.
 Combrétine Bocquillon.
 Cosmargyre Thévenot.
 Digalène Roche.
 Elixir Duchamp.
 Endovarénol.
 Entérozone.
 Eupnine Vernade.
 Ferromalt.
 Hectargyre.
 Hectine.
 Huile Riche.
 Hypodermozone.
 Immunizols Grémy.

Iode organique Boissy.
 Kola granulée Astier.
 Lactobacilline.
 Panbiline.
 Panhémol.
 Phytinate quinine Ciba.
 Plurion Couturieux.
 Produits Midy au Colla-
 gol.
 Propidon.
 Quinease.
 Quinolforme.
 Quinoïdine Duriez.
 Rectopanbiline.
 Résyl Ciba.
 Rhagadine Braquemond.
 Sédogène Sallé.
 Septicémine.

Splénotanin Grémy.
 Staphylase du D^r Doyen.
 Staphylocide Audras.
 Staphylo-coccine.
 Stibyl.
 Thyonhydrol Grémy.
 Sulfargyre Thévenot.

Urnosol.
 Urométine Lambiotte.
 Urosan.
 Uracétose
 Urisanine.
 Varénol.

XXVIII. — NERFS (HYSTÉRIE, EPILEPSIE. NEURASTHÉNIE, ETC.)

Ampoules de Pantopon
 Roche.
 Ampoules de Spasmalgine
 Roche.
 Antialgos Christiaens.
 Azigol Thévenot.
 Béatol.
 Benzylol.
 Biodynamine.
 Biosine Le Perdriel.
 Blozol.
 Borocalcyl Thévenot.
 Broméine Montagu.
 Bromiase Couturieux.
 Bromogénol Pépin.
 Bromure Robin.
 Bromures Souffron.
 Calciphose.
 Cérébrocrinol (Lipoidell. l.)
 Cérébroil Leysin.
 Chloral bromuré Dubois.
 Colarsé.
 Comitlol.
 Dial Ciba.
 Dialacétine Ciba.
 Diasténine Grémy.
 Diastogène.
 Doloma-Cénophos.
 Dragées du D^r Gelineau.
 Dragées névrosthéniques
 Yse.
 Energétène de valériane
 Byla.
 Eusomnine Belières.
 Fosloxyll Carron.
 Gardénal.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Hémoglobine Dalloz.

Histogénol Naline.
 Hypneural Cos.
 Kola Granulées Astier.
 Lipocérébrine Chevreton.
 Mokavène.
 Naïodine.
 Néolyse.
 Nergine Heudebert.
 Neurène.
 Neurinase.
 Neurobore.
 Neurodose.
 Neurotanin Grémy.
 Neurotrophol Byla.
 Neurovoïne Grémy.
 Nopirine Vicario.
 Opothérapie Chaix.
 Opothérapie Choay.
 Opothérapie du Dr Frayssé
 Panbiline.
 Pantopon Roche.
 Phoscalcène.
 Phosolormé.
 Phytine Ciba.
 Quiétol.
 Rectopanbiline.
 Sédatine Christiaens.
 Sédatose.
 Sédobrol Roche.
 Sédol.
 Sédoneurol Dehaussy.
 Sérum Neurophile Théve-
 not.
 Sérum Névrosthénique
 Fraisse.
 Sirop du D^r Gelineau.
 Sirop d'Aubergier.
 Solution Laroyenne.
 Somnifène Roche.

Sorgal Thévenot.
 Spasmalgine Roche.
 Spasmine Jolly.
 Staphylase bromurée du
 D^r Doyen.
 Succomusculine Chaix.
 Sulfargyre.
 Tribromure Gigon.
 Trixyl Fraudin.
 Valbornine Rogier.
 Valéral Puy.
 Valériane Gmel (s. alcool).

Valérianate liquide Gri-
 gnon.
 Valérianate Picriot.
 Valérobromine Legrand.
 Valéromenthol.
 Valéronal.
 Valimyl.
 Vanadine Bocquillon.
 Vériane Buriat.
 Vanucléol.
 Véronidia Buisson.

XXIX. — OBÉSITÉ

Afatyl (Lipoïdes H. L.)
 Algatan.
 Antiurique de Contre-
 xéville.
 Colloïdine.
 Corps thyroïde Moncour.
 Curiode.
 Dépuratif Kromelinck.
 Doloma-Cenophos.
 Dialyl.
 Diasclérol.
 Diastogène.
 Eau de Saint-Colomban.
 Extrait thyroïdien Choay.
 Fucus Gmel.
 Globules Fumouze.
 Hémagénine.
 Iodalse Galbrun.
 Iodamelis Logeais.
 Iodhydrinedu D^r Deschamp
 Iodométine.
 Iodostarine Roche.

Iodo-thyroidine Catillon.
 Iodures Cros.
 Iodure Philippe.
 Lipoiodine Ciba.
 Oxydothyryne Paris.
 Panbilline.
 Panurol Tissot.
 Pastilles réductrices Châ-
 tel-Guyon Miraton.
 Riodyne.
 Salsanos.
 Santhéosc.
 Théisine.
 Théobryl Roche (Ampoules
 Gouttes).
 Théosalvose.
 Thyrénine Grémy.
 Uraseptine Rogier.
 Urazine.
 Urnosol.
 Uroformine Gobcy.
 Urométine Lambiotte.

XXX. — OPHTALMOLOGIE

Adrénaline Clin.
 Aniodol.
 Clonazone Daufresne.
 Collaborine Dupuy.
 Felargent.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Immunizols Grémy : Con-
 jonctivites ; Ulcérations
 de la Cornée.
 Naiodine.

Ophtalmine.
 Ophtalmovarénol.
 Phytol.
 Panbilline.
 Scurénaline.
 Scurocaine.
 Scuroforme.
 Silicyl.
 Stéramine.
 Sulfargyre.
 Thigénol-Roche.

Thionhydrol Grémy.
Tubes Dulcis.
Tubes du D^r Guiraud.

Tubes Sals.
Vioforme Ciba.

XXXI.—OPOTHÉRAPIE ET VACCINOTHÉRAPIE

Adrénaline Aguetant.
Adrépatine.
Adrénophyséine Grémy.
Agomensine Ciba.
Aplexil.
Capsules Sals.
Cardiotanic Grémy.
Cholé Kinase.
Colloïxols du D^r Riquoir.
Endocrisines Fournier.
Enterovaccin Lumière.
Epidosine Grémy.
Extraits totaux Choay.
Gynopausine.
Hémoglobine Deschiens.
Hépatotanic Grémy.
Huile Riche.

Immunizols Grémy ; Absès
chauds, Plaies suppu-
rées ; Absès froids, Fis-
tules ; Acné ; Appendi-
cite ; Asthme ; Asthme
des foies ; Bronchites
chroniques ; Conjoncti-
vites ; Cystites, Pyélo-
néphrites ; Dysenterie ;
Eczéma, Psoriasis ; En-
térite ; Furunculose ;
Gangrène ; Grippe ;
Métrites ; Méningoco-
que ; Ostéomyélite ;
Otites ; Rhumatismes ;
Sarcome ; Typhoïde ;
Ulcérations de la cor-
née ; Uréthrites.

Lipoides H. I. — Chaque
lipoïde est en même
temps un aliment et un
excitant pour l'organe
dont il provient.

Neurovoïne Grémy.

Neurotanic Grémy.
Ocréine Grémy.
Opothérapie Byla.
Opothérapie Chaix.
Opothérapie Choay.
Opothérapie Colre.
Opothérapie Fournier Fr.
Opothérapie associée du
D^r Frayssé.
Opothérapie Moncour.
Opothérapie de la Société
Française d'Opothérapie
S. F. O.

Opothérapie Vigier-Huerre
Opothérapie Paris.
Opozones Lumière.
Ostéohépatine.

Panbiline.
Panglandine.
Peptosténine Choay.
Physéine Grémy.
Pilules du D^r Debouzy.
Pneumotanic Grémy.
Proxytases.

Rectopanbiline.
Rénotanic Grémy.
Rhéantine Lumière.
Sinrénaline Dehaussy.
Sérum Oliviero.

Sistomensine Ciba.
Splénotanic Grémy.
Surrénotanic Grémy.
Syncrines Choay.
Thyrénine Grémy.
Thyrocréine Grémy.
Tridigestine Dalloz.

Vaccins atoxiques stabili-
sés Poulenc.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins microbiens cura-
tifs et préventifs Grémy.

XXXII. — OTO — RHINO — LARYNGOLOGIE

Adrénaline Clin.
Anaquintine.

Aniodol.
Antiasthme Bengalais.

Arhine Lambiotte.
 Audigénine.
 Balsamiolol.
 Balsamol.
 Boricine Meissonnier.
 Boules Quiès.
 Capsules Sals.
 Cigarettes Espic.
 Clonazone Daufresne.
 Cocaïne Midy.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Colluborine Dupuy.
 Glycocarpine.
 Goménol.
 Granules Crosnier.
 Freinix.
 Hémagénine.
 Huile Riche.
 Immunizols Grémy : As-
 thme des Foins ; Otites.
 Kinectine.

Kipsol.
 Mésoforme.
 Mucosodine.
 Nalodine.
 Néol.
 Pastilles Géraudel.
 Pastilles Mackenzie.
 Pastilles Méry.
 Rhinargyne.
 Rhino-menthol.
 Seurocaine.
 Sedogène Salle.
 Sirop Crosnier.
 Stéramine.
 Sulfargyre.
 Sulfuryl Monal.
 Tablettes d'oxymenthol
 Perraudin.
 Thigénol Roche.
 Vaccins bactériens I. O. D.
 Vioforme Ciba.

XXXIII. — PEAU ET CUIR CHEVELU (GERÇURES, ENGELURES, etc)

Acépilline.
 Aniôdol.
 Baume Duret.
 Bi-iodure Souffron.
 Bulgarine Thépénier.
 Capsules Sals.
 Clonazone Daufresne.
 Collothiol.
 Créosoforme Lambiotte.
 Crypthermol.
 Curatoxine.
 Curiode.
 Cytovarénol.
 Dermo-plastols Dumesnil.
 Diadermine.
 Dmesta (Néo-).
 Ebanyl.
 Eczéda.
 Emplâtres Cavallès.
 Entéroseptyl Clérambourg.
 Eranol.
 Extrait Thyroïdien Choay.
 Favolysine Thévenot.
 Gastro-Sodine.
 Globules Fumouze.
 Goménol.

Granules Crosnier.
 Hémagénine du D^r Giraud.
 Huile Riche.
 Immunizols Grémy : Acné
 Eczéma. — Psoriasis
 Furunculose.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodéyl Fournier.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.
 Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodothyroïdine Catillon.
 Iodurase Couturieux.
 Iodures Souffron.
 Jugland Gmet.
 Laccodermes.
 Lebnol.
 Levurase.
 Levurine Couturieux.
 Lipolodine Ciba.
 Lipovarénol.
 Mésoforme.
 Néol.
 Néolyse.
 Nisaméline Trouette-Per

Ouataplasme.
 Panbiline.
 Panurol Tissot.
 Peptonal.
 Phlyctol.
 Propidon.
 Rectopanbiline.
 Rhagadine Bracquemond.
 Riodine.
 Sapolan.
 Savon Lientaud au gou-
 dron boraté.
 Savon marque SPA, à tous
 médicaments.
 Savon Pérusol.
 Savon Roche au Thigénol.
 Savons antiseptiques Vi-
 gier et Huerre.

Silicyl.
 Sirop Crosnier.
 Station Couturieux.
 Stannoxyd.
 Stannylose Thévenot.
 Staphylase du Dr Do-
 yen.
 Staphylococcine Fraquet.
 Stéramine.
 Sulfargyre.
 Sulfodermol Rambaud.
 Thigénol Roche.
 Thyréline Grémy.
 Thionhydrol Grémy.
 Ulcérine Berger.
 Varénoferments.
 Xenaderm.

XXXIV. — RECONSTITUANTS — STIMULANTS TONIQUES — RÉCALCIFIANTS

Ampoules Churchill indo-
 lores.
 Arsycodyle.
 Ascoléine Rivier.
 Biocalcose Chevreton.
 Biogénol Demasles.
 Biophorine Girard.
 Biophorol.
 Biosine Le Perdriel.
 Biotose Ciba.
 Calcéose.
 Calciline.
 Calciphose.
 Carnine Lefrancq.
 Céréalose.
 Cérébroil Leysin.
 Cérépsine.
 Colarsé.
 Composés Gmet.
 Créosal Dubois.
 Diasténine Grémy.
 Diastogène.
 Doloma-Enophos.
 Dragées Hecquet.
 Dragées névrosthéniques
 Yse.
 Elixir Duchamp.
 Elixir Ducro.

Embryonine Barré.
 Entérozone.
 Epidosine Grémy.
 Eucalcium.
 Exo-orchitine Byla.
 Extrait orchitique Choay.
 Extrait surrénal Choay.
 Farines maltées Jammet.
 Fer Bravais.
 Ferrophytine Ciba.
 Ferromalt.
 Feroxal.
 Fer Rabuteau.
 Ferrocodile et Ferricodile.
 Ferrygène Carron.
 Fortossan Ciba.
 Fosfoxyd Carron.
 Gaurod.
 Géodyl.
 Gloma.
 Glutinettes d'hémoglobine
 Glycérophosphate Dalloz.
 Glycérophosphate Robin.
 Glykolaine Robin.
 Héliatal.
 Hémagénine du Dr Giraud.
 Hémocrinol (Lipoides H. I.)

Hémoglobine Byla.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschiens.
 Hipposarcine Roy.
 Holos.
 Hypophosphites Churchill
 Iodaselle Delamarre.
 Kola Astier.
 Kola Midy.
 Lipochol Byla.
 Lipocithine.
 Lipocythol Grémy.
 Marinol.
 Mésorthorium Buisson.
 Morrhuetine Juncken.
 Musculosine Byla.
 Néo-arsycodile.
 Néo-Rhomnol.
 Neurosine Prunier.
 Neurotrophol Byla.
 Névrosthénine Freys-
 singe.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Nucléo-fer Girard.
 Opocalcium du D^r Guer-
 sant.
 Opothérapie Choay.
 Orexyl.
 Orchitine Byla.
 Ostéohépatine.
 Ovolécithine Billon.
 Ovomaltine.
 Pancalcine.
 Pepto-fer Jaillet.
 Pepto-Kola Robin.

Peptonate de fer Robin.
 Phosphorgane.
 Phytine Ciba.
 Poudre Georges.
 Quassia-Kina Rabot.
 Quina Baron.
 Quinéine.
 Quinoïdine Duriez.
 Quinquina Gmet.
 Rhomnol.
 Santogénol Caubin.
 Sérum Neurophile Thé-
 venot.
 Sérum névrosthénique
 Fraisse.
 Sérum Oliviero.
 Silieyl.
 Sinrénaline Dehaussy.
 Sirop d'Hémoglobine Byla
 Solution Henry Murc.
 Spectrol.
 Strychnarsitol Robin.
 Strychnofluocodyle.
 Synergyl Vadam.
 Toni-lécithine Rogier.
 Tonikéine Chevreton.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Vanadarsine (ampoules-
 gouttes).
 Vanucléol.
 Vin de Bugeand.
 Vin Girard.
 Zohol.
 Zymatine.

XXXV. — STOMATOLOGIE

Adrénaline Clin.
 Akesol Muzi.
 Aniodol.
 Antipyrine des Usines du
 Rhône.
 Aspirine Usines du Rhône
 Boricine Meissonnier.
 Clonazone Daufresne.
 Crypthermol.
 Dial Ciba.
 Didial Ciba.

Képhaldol.
 Mésforme.
 Naïodine.
 Néol.
 Névralgol Brossard.
 Pyramidon Usines du Rhône
 Pyréthane.
 Quiétol.
 Spasmalgine Roche.
 Stomavarinol.
 Véronidia Buisson.

XXXVI. — SYPHILIS

Akezol Muzl.
 Arguéritol Lesure.
 Arsénobenzol.
 Bihégon.
 Bilodure Hg. Midy.
 Bilodures Souffron.
 Biodermyl Monal.
 Bismhydral.
 Cathiote.
 Cérébrocrinol (Lipoides
 H. I.).
 Cyanhermine.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Cosmargyre Thévenot.
 Crypthermol.
 Curiode.
 Cytotropines.
 Elixir Déret.
 Elixir iodo dépuratif Pépin.
 Elixir Spes.
 Enésol.
 Eniode.
 Eparséno.
 Eparséno infantile.
 Eranol.
 Galyl.
 Globules Fumouze.
 Granules Crosnier.
 Hectargyre.
 Hectine.
 Hermasinol.
 Huiles Duret.
 Huiles stérilisées Vigier-
 Huerre.
 Hydrargol.
 Iodalose Galbrun.
 Iodarsenic Guiraud.
 Iodaselle Delamarre.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéyl Fournier.
 Iodo-Bismuthate de Qui-
 nine Fraisse.
 Iodogénol Pépin.
 Iodométine.

Iodone Robin.
 Iodostarine Roche.
 Iodurase Couturieux.
 Iodure Philippe.
 Iodures Souffron.
 Iode organique Boissy.
 Lipogyre Ciba.
 Lipoïdine Ciba.
 Luatol.
 Metarsenobenzol Saca.
 Muthanol.
 Narsénol.
 Néoby Trouette Perret.
 Néo Trépol.
 Novargyre.
 Novarsénobenzol.
 Oléo Iode Dubois.
 Pilules Lemary.
 Plurion Couturieux.
 Pilules d'Hermel (Breton-
 neau).
 Préventyl.
 Quinby (Quinto-Bismuth).
 Rhodarsan.
 Rioline.
 Rubyl.
 Savon dentifrice Vigier.
 Savon marque SPA.
 Signodine Grémy.
 Sirop Crosnier.
 Staphylase iodurée du D^r
 Doyen.
 Stovarsol.
 Sulfarène.
 Sulfargyre Thévenot.
 Sulfarsénol.
 Sulfocidol Robin.
 Suppargyres du D^r Fau-
 chier.
 Tarbisol.
 Thionhydrol Grémy.
 Trépol.
 Vin et Sirop Nourry.

XXXVII. — SYSTÈME VEINEUX VARICES — HÉMORROIDES

Adrépatine.
 Antirrhoïde.

Anusol.
 Cytovarénol.

Dioséine Prunier.
 Galyl.
 Glycocarpine.
 Gouttes fluxines.
 Gouttes de Séru.
 Gouttes Lolotsé Isberg.
 Hamaméline Roya.
 Hamamélode.
 Hamamélis Gmet.
 Hémoductyl.
 Iodamelis Logeais.

Kerlol.
 Lipovarénoï.
 Panbiline.
 Pommade Midy.
 Rectoline.
 Rectopanbiline.
 Silicyl.
 Suppositoires Midy.
 Suppositoires Pepet.
 Thyrodoxe.
 Veinosine.

XXXVIII. — TUBERCULOSE

Algatan.
 Aloysine.
 Amponles Churchill.
 Anaquintine.
 Angiolymphé du D^r Rous.
 Arséniode.
 Ascoléine Rivier.
 Bactioxyne.
 Balsamol.
 Blocalcose Chevreton.
 Biogénol Demasles.
 Biophorine Girard.
 Biosine Le Perdriel.
 Biozol.
 Cachets Roche de Thiocol.
 Calcéose.
 Calcéline.
 Calciphose.
 Capsules de Morrhaine
 Puy.
 Capsules Sals.
 Carnine Lefrancq.
 Cathiote.
 Céréalose.
 Céréossine.
 Chlorocalcion.
 Cholergine.
 Chnozyl.
 Cmol.
 Colloïxols du D^r Riquoir.
 Collothiol.
 Composés Gmet.
 Comprimés Roche au
 Thiocol.
 Créosal Dubois.
 Cuprocithine Grémy.
 Diastogène.

Dioradin.
 Doloma-Cénophos.
 Elatine Bouin.
 Elbon Ciba.
 Elixir Duchamp.
 Elixir Duero.
 Embryonine Barré.
 Emulsion Marchais.
 Entérozone.
 Eranol.
 Eucalcium.
 Farines maltées Jammet.
 Fluoridia.
 Fortossan Ciba.
 Fosloxyll Carron.
 Galacalcine La Tour.
 Gaurol.
 Géodyl.
 Germose.
 Globules Fumouze.
 Glutinettes d'hémoglobine.
 Glycérophosphate Dalloz.
 Goménol.
 Gouttes livoniennes de
 Trouette-Pervet.
 Gouttes Nican.
 Gouttes Scandinaves.
 Granulés Crosnier.
 Granulé Girard.
 Hectine.
 Hélical.
 Hémagénine du D^r Girard.
 Hémofixine Branchu.
 Hémoglobine Dalloz.
 Hémoglobine Deschamps.
 Hémostyl du D^r Rouss.
 Hépatotanie Grémy.

Hipposarcine Roy.
 Histogénol Naline.
 Holes.
 Huile Riche.
 Hypodermozone.
 Hypophosphites Churchill.
 Immunizols Grémy : Absès
 froids, Fistules.
 Iodaselle Delamarre.
 Iodaseptine Cortial.
 Iodéine Montagu.
 Jugland Gmet.
 Kola Astier.
 Kola Midy.
 Lipocithine.
 Lipocythol Grémy.
 Mésothorium Buisson.
 Morrhuéine Jungken.
 Musculosine Byla.
 Nécarsycodile.
 Nergine Heudebert.
 Neurotrophol Byla.
 Nucléarsitol Robin.
 Nucléatol Robin.
 Nucléo-ler Girard.
 Oléo iode Dubois.
 Opocalchum du D^r Guer-
 sant.
 Optarségol.
 Orexyl.
 Osteohépatine.
 Ostréine Buisson.
 Panbiline.
 Pancalcine.
 Panhémol.
 Pélospanines Fournier.
 Perles Taphosote.
 Persodine.
 Phosote Lamblotte.
 Phosphorgane.
 Phytine Ciba.

Pneumotanic Grémy.
 Pneumobiol.
 Pnoléol.
 Pulmostéryl.
 Quina Baron.
 Rectopanbiline.
 Régénérateur Bouyer.
 Résyl Ciba.
 Santogénol Caubin.
 Saugé Gmet.
 Sérum antiphymique
 Vadam.
 Séroplase.
 Silicyl.
 Sirop Auzes.
 Sirop Crosnier.
 Sirop Girard.
 Sirop Roche au Thiocol.
 Spectrol.
 Sténophyl Vigan.
 Succomusculine Chaix.
 Terkal Monal.
 Thalaxotonine Vadam.
 Thiocol Roche.
 Thiopeptone.
 Tonikéine Chevreton.
 Tricalcine.
 Triféryl.
 Trixyl Fraudin.
 Tuberculine C. L.
 Tubérol.
 Vaccin antiasthmatique.
 du prof. Minet.
 Vanadine Bocquillon.
 Vanucléol.
 Vanadarsine (ampoules
 Gouttes).
 Vérianne Buriat.
 Vin de Bugeaud.
 Vin Girard.
 Zohol.

XXXIX. — TUMEURS — CANCER

Backerine activée.
 Doloma.

Néoplatysines de D^r Riquoir
 Onophos.

XL. — VOIES GÉNITO-URINAIRES (reins, vessie, urètre, testicules, etc...)

Adrépatine.
 Anéxol.

Antiurique de Contrexé-
 ville.

Arhéol.	Pipérazine Midy.
Boricine Meissonnier.	Préventyl.
Clonazone Daufresne.	Rectopaniline.
Coccidal Grémy.	Rénotanin Grémy.
Colchi-Sal Midy.	Rhéantine Lumière.
Drégon (Néo-).	Salol Usines du Rhône.
Eau de Saint-Colomban.	Salsanos.
Elatine Bouin.	Santal Monal.
Eumictine.	Santhéose.
Extrait Rénal Choay.	Sécacornine Roche.
Extrait Rénal Moncour.	Sektal Grémy.
Globules Ramon.	Sels de Lithine efferves-
Glyco-Phytol.	cents.
Goménol.	Septicémine.
Gonacrine.	Sornyl.
Genovarénol.	Sphérulines Moncour.
Gynergène.	Thésine.
Hamamelis Gmet.	Théobryl Roche (Ampos-
Hétérolysine Oliviero.	les, Gouttes).
Héxotal.	Thigénol Roche.
Immunizols Grémy : Uré-	Uracétose.
thrite.	Uraséol.
Leucovarénol.	Uraseptine Rogier.
Mictasol.	Urazine.
Néphrocrinol (Lipoldes H.-	Urifluine.
L.)	Urisanine.
Panbiline.	Urnosol.
Panurol Tissot.	Uroformine Gobey.
Phytol.	Urométine Lambiotte.
Phytoline Albarran.	Urosan Dufayard.
Pilules Doumer.	Varénosferments.



2^e Partie

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

•

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ACÉPILINE

Spécifique des alopecies

Composition. — Acétone très pur, Alcool Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopecies post-fébriles, Alopecies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin, peigner au démailloir et à la brosse dure, pour enlever les cheveux morts prêts à tomber. Puis friction à l'Acépiline à l'aide d'une brosse à dents demi-dure, raie par raie, durant dix minutes (chevelure féminine), ou sur toute la tête durant cinq minutes (hommes ayant les cheveux courts). Cela tant que les cheveux morts continueront à tomber. Ensuite, par période d'une semaine de temps en temps.

Laboratoire RAMBAUD

38, rue Gay-Lussac — PARIS



ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — L'Acésine est une pommade à base d'extrait de capsules surrénales, de chloréthane et de stovaine.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier, dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes; quand les hémorroïdes sont internes, visser sur le tube la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications trois ou quatre fois par jour.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

ACHANOL

Anti-Opium

Produit français exempt de Toxiques
des Tableaux A et B

à base de (Berberine-Hélénine-Granatotanin)

L'Achanol est l'élément chimiothérapique rationnel pour le traitement du morphinisme, du thébaïsme et des intoxications chroniques par les poisons stupéfiants.

L'Achanol permet d'obtenir un sevrage rapide et sans troubles pénibles et prémunit le convalescent contre les rechutes.

Demander la brochure rédigée à l'usage exclusif des Médecins.

Produits Biologiques et Physiologiques
286, Faub. Bannier-Les Aydes — ORLÉANS

ADRENALINE AGUETTANT

PHYSIOLOGIQUE — EXTRACTIVE

Certifiée exempte de synthétique

La date d'impression du Codex 1908 n'a pas permis d'y mentionner l'Adrénaline artificielle. A la faveur de cette lacune, le commerce offre, sous le nom générique d'adrénaline, le produit synthétique dont le prix de revient est plus faible.

Tous les physiologistes et les thérapeutes savent qu'il n'est pas indifférent d'employer des produits synthétiques ou des produits extraits (F. Arloing et Thévenot, *Congrès de Méd.* 1922 : « Pouvoir athéromatogène de l'Adrénaline synthétique. »)

Les biologistes qui recherchent les actions profondes sur les glandes endocrines tiennent à juste titre à être certains de l'origine physiologique du produit qu'ils emploient.

Laboratoire N. AGUETTANT
36, Quai Fulchiron — LYON

ADRÉNOPHYSÉINE GRÉMY

On connaît l'action de l'adrénaline dans la crise d'asthme. Cette action est considérablement renforcée par l'adjonction de la médication hypophysaire.

Doses et mode d'emploi. — Le jeu comprend 3 ampoules :

- 1° Une ampoule de physéine (voir Physéine ;
- 2° Une ampoule d'eau distillée ;
- 3° Une ampoule d'adrénaline au 1/1.000.

Le médecin peut ainsi doser les quantités de physéine ou d'adrénaline qu'il veut injecter.

Indications. — Sédatif de la crise d'asthme.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

ADRÉPATINE

POMMADE — SUPPOSITOIRES

Association pluriglandulaire

Composition — *Extraits d'Organes* : Foie, Surrénales, Thyroïde, Hypophyse, Prostate

Extraits Végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamelis.

Excipient Antiseptique et Calmant.

Propriétés et Indications thérap. — L'*Adrépatine* est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits polyglandulaires englobés,
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants,
- 3° Par son action vaso-constrictive locale,
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique,

est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes*, des *Rectites et Prostatites*, du *Prurit anal*, des *Fistules*.

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Laboratoires LALEUF

49, avenue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

Téléphone : Ségur 63-01

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux*

Doses. — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : Une goutte par mois d'âge.
		de 1 à 2 ans : 12 à 20 gouttes.
		de 2 à 5 ans : 20 à 25 gouttes.
		de 5 à 10 ans : 25 à 30 gouttes.
		de 10 à 15 ans : 30 à 35 gouttes.
		et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : 50 à 60 gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

FALCOZ & C^{ie}

9, Rue Boissonade — PARIS

AGOMENSINE (voir à SISTOMENSINE)

AGOMENSINE CIBA

Substance extraite du corps jaune de l'ovaire, appartenant à la classe des hormones, soluble dans l'eau.

Action Physiologique.

Elle favorise le flux menstruel et accélère le développement des organes ainsi que l'apparition ou le maintien des caractères sexuels secondaires, ces modifications s'accomplissant rapidement sans aucun trouble d'ordre général.

Indications :

I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées.

II. — Malaises qui précèdent ou qui accompagnent l'installation de la menstruation.

III. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.

IV. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures.

Le flacon de 20 Comprimés : 6 francs
(Voir Sistomensine)

Labotatoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodée donnant au contact des plaies de l'iode à l'état naissant.

AIROL " Roche", en poudre.

Prop. thérap. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol " Roche "* est le seul succédané pratique).

Indic. thér. — Toutes celles de l'iodoforme.

Bien spécifier la marque " Roche".

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges, PARIS

AKESOL MUZI

Spécifique de la douleur sous toutes ses formes.

Composition. — Valériamidoquinine.

Formes. — Cachets.

Propriétés thérap. — Agit sur toutes les douleurs, sans préjuger de leur nature ni de leurs causes.

Indicat. thérap. — Tabès, sciatique, névralgies, migraines, céphalalgies, rages de dents, rhumatismes, lumbago, douleurs intercostales, abdominales, menstruelles, etc.

Posologie. — 2 à 3 cachets par 24 heures, pris dans une infusion chaude, au moment des repas. On peut, en cas de douleurs plus vives ou plus persistantes, porter sans inconvénient, la dose à 4 ou 5 cachets.

ROUSSY, Pharmacien

à SARLAT (Dordogne)

ALEPSAL GENEVRIER

Spécifique de l'Épilepsie et des Convulsions
(Communication à la Sté Médico-Psychologique
de Paris)

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényl-éthylmalonylurée très pure associée à la Bétadone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

Posologie. — 2 comprimés par jour, absorbés purs ou dans une boisson chaude ; le premier le matin au réveil, le deuxième le soir vers 5 heures. AUCUN RÉGIME SPÉCIAL.

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques ; l'intelligence de l'ÉPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (Dr Dueoste, médecin chef des Asiles de la Seine).

Contre-Indications. — Néant.

Prix : Le tube 6 francs

Laboratoire GENEVRIER

33, boul. du Château — NEUILLY-PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

ALGATAN

(Corps nouveau)

*Combinaison colloïdale définie d'iode,
d'Anhydride sulfureux et de Tanin
en milieu Sulfo Calcique Fluoré.*

Iode et tous dérivés complètement indécélables.

Forme. — Cachets.

Compos. — Chaque cachet (1 gr.) contient :

Iode bi-sublimé.....	0,033	} Combinaison
Bi-sulfite de Na.....	0,033	
Tannate de Na.	0,198	
Fluorure de Na.	0,020	} Milieu
Carbonate de Ca O.....	0,333	
Soufre colloïdal.	0,333	
Matières amylacées..	q. s.	

et agit thérapeutiquement comme :

XX gouttes de teinture d'iode au 1/10^e et comme environ 0 gr. 20 d'iodures alcalins.

Remarque. — Ces comparaisons ne sont que purement indicatives puisque l'iode n'est pas libre et qu'il se trouve « engagé complètement dans un système colloïdal directement complexe d'où il ne peut être libéré par les réactifs usuels ».

Indications thérapeutiques. — Tuberculose, Scrofulose, Lymphatisme, Anémie, Affections cardio-vasculaires, Asthme, Catarrhe bronchique, Kératites interstitielles et strumeuses, Pleurésie, Pneumonie, Pré-tuberculose et toutes indications de l'iode et des iodures.

Posologie. — A prendre toujours au milieu ou à la fin des repas. *Adultes*, 2 à 6 cachets par jour. *Enfants*, 3 à 5 ans, 1/2 cachet; 5 à 10 ans, 1 cachet; 10 à 15 ans, 2 cachets. Toujours au milieu ou à la fin des repas principaux.

Pour enfants au-dessous de 3 ans ou nouveau-nés ouvrir le cachet et mélanger la dose prescrite avec du miel.

Prix la boîte de 30 cachets 6 fr. 60 (impôt compris)

Société de l'Aniodol

40, Rue Condorcet — PARIS

ALGOCRATINE

(Citrates de Phénylamidoxanthine)

Forme. — En cachets de 0 gr. 75.

Indic. thér. — Migraines, névralgies, sciaticques. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les cas de *règles douloureuses*.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs et un autre une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Littérature, Echantillons :

E. LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel III, 71
PARIS (8^e)

ALGOLANE

Médecament antiseptique et analgésique puissamment actif, sans odeur désagréable, non irritant, exempt de tous les inconvénients des préparations salicylées destinées à l'usage externe.

Indications. — S'emploie avec succès contre le rhumatisme aigu, suraigu ou chronique; les névralgies de toute nature; les douleurs musculaires (lumbago, torticollis), les douleurs de la colique hépatique; le prurit.

Mode d'emploi. — Verser quelques gouttes d'Algolane sur la région douloureuse, les étaler par une friction légère, recouvrir d'un imperméable et d'un pansement ouaté.

Littérature sur demande.

Etablissements POULENG Frères

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

ALIMENT TINARDON

Nutrition - Recalcification - Reminéralisation

Forme. — En paquets dosés pour la préparation, soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable.

Composition :

Carbonate de chaux..	0 30	Lactose.....	2 30
Phosphate de chaux..	0 20	Caséine purifiée.....	0 50
Glycéroph. de chaux..	0 05	Arrow Root.....	4 »
Magnésie calcinée..	0 05	Sucre.....	12 »
Éléments céréalo-légumineux.....	5 »	Cacao vanillé.....	8 50

par paquet.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 paquets par jour.
Adultes : 2 à 3 — —

Indications. — Dégénérescence infantile. Scrofule, Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'École Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

ALOYSINE

A base de suc d'ail

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'huile aucune odeur alliée.

Formes. — Pilules, pommade.

Indications. — Pilules : Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire.

Pommade. — Tuberculoses externes, Plaies suppurées, Dermatose, etc.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les deux jours).

Laboratoire GOUZENE

139, rue de Paris, 139

à PANTIN (Seine)

ALUNOZAL

(Salicylate basique d'Alumine U. R.)

L'ALUNOZAL libre, dans l'intestin seulement, l'alumine dont l'état gélatineux intensifie le pouvoir d'absorber les toxines et les propriétés astringentes. Ces effets sont heureusement complétés par l'action analgésique et antiseptique du salicylate alcalin formé.

ANTIDIARRHEIQUE PUISSANT

(Diarrhées aiguës, chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diarrhée des nourrissons)

Tolérance stomacale parfaite Toxicité nulle

Présentation et mode d'emploi. — 1° COM-PRIMES à 0 gr. 50 (Tubes de 20), 2 à 10 pro die.

— 2° GRANULES à 25 %. Une faible cuillerée à café correspond à un comprimé.

Laboratoire des Produits USINES DU RHONE

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8°)

AMIBIASINE

(Extrait de garcinia composé.)

(Accepté par le Service de Santé.)

Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

Action. — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales, du tenesme. Antihémorragique et antidiarrhéique énergique. Agit sur l'amibe et ses kystes.

Indications. — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysenterie amibienne, bacillaire. — Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse. — Diarrhée infantile, cholériforme.

Dose :

Formes aiguës : 6 à 12 cuill. à café « pro die » pendant 1 à 2 jours

Formes chroniques : 3 à 6 — — — — 4 à 5 jours

Diarrhée infantile. Formuler :

Manne en larmes 5 gr.

Eau bouillie..... 10 gr.

Amibiasine... .. 15 gr. (3 cuill. à café.)

(Dose à donner dans la journée et répéter pend. 3 à 4 jours.

Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée.

Littérature et Echantillons

Lab. AMIBIASINE : 27, rue Miromesnil — PARIS

AMIDAL

Amidon paraffiné — Ferments lactiques

Forme. — Poudre et comprimés.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, source d'artério-sclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à trois cuillerées à soupe ou six à huit comprimés par jour.

Laboratoire BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

AMPOULES BOISSY

pour INHALATIONS

AMPOULES BOISSY de NITRITE d'AMYLE

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Crises gastriques du Tabès, Syncoopes, Mal de mer, Migraines, Epilepsie, Hémiplégie hystérique, etc.*

AMPOULES BOISSY d'IODURE d'ÉTHYLE

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts, et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main

Laboratoire BOISSY

32 bis, boulevard d'Argenson,
à NEUILLY-sur-SEINE

AMPOULES CHURCHILL

INDOLORES

à base d'Hypophosphites

Agents les plus actifs de la médication reconstituante
par le Phosphore

Ampoules indolores de Poliol Churchill : 0,10 d'Hypophosphites composés dans la proportion des bases minérales de l'organisme, avec addition de Méthylarsinate de Strychnine : 1 mgr. — *Indiquées dans la Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique*

Ampoules indolores d'Iroal Churchill, à base d'Hypophosphite de fer : 0,002 dans 1 cm³. — *Indiquées dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée, Ictère hémolytique.*

Ampoules indolores de Limol Churchill, à base d'Hypophosphite de chaux : 0,10 dans 1 cm³. — *Indiquées dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Brouchites.*

Ampoules indolores de Sorol Churchill, à base d'Hypophosphite de soude : 0,10 dans 1 cm³. — *Mêmes indications mais en cas d'Hypertension artérielle et d'âge avancé.*

Et de tous autres Hypophosphites : Manganèse, Quinine, etc.
3 fr. la boîte de 10 ampoules (Prix réglementé)

PHARMACIE SWANN

12, Rue Castiglione, 12 — PARIS

AMPOULES DE DIGALÈNE

" ROCHE "

(Digitale injectable)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

1 cc. = 0,15 cgt. poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. . 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Prop. thér. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation. (Voir Digalène " Roche ").

injections. — Hypodermiques, *intra-veineuses*, *intra-musculaires* (indolores).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

AMPOULES DE PANTOPON

" ROCHE "

(opium total injectable)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 cgt. de Pantopon " Roche "

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. Enfants 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON " ROCHE " représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 cgt. de Pantopon " Roche ",
= 0,50 cgt. de teinture d'opium,
= 0,025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6 et 12 Ampoules

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, place des Vosges, PARIS

AMPOULES REIPAR

Composition :

Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications :

Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales.

Action :

Curative certaine, sédative très rapide.

Mode d'emploi :

En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée aux

Laboratoire du REIPAR

AUDINCOURT (Doubs)

AMPOULES DE SÉCACORNINE " ROCHE "

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle)
(Voir page spéciale Sécacornine " Roche ")

Indic. thér. — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

Doses et mode d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine " Roche " agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule par jour.
Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h.
(Voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^e

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMPOULES DE SPASMALGINE

" ROCHE "

(Antispasmodique vrai)

Composition. — Chaque ampoule contient :

Un centigramme Puntopon " Roche "

Deux centigrammes Papavérine " Roche ".

Un milligramme Atrinal " Roche ".

(Voir page spéciale Spasmalgine " Roche ").

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.*

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMPOULES DE THÉOBRYL

" ROCHE "

(Théobromine injectable)

Indications. — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Doses et mode d'emploi. — Chaque ampoule = 2 cc.

Dose moyenne utile : Adultes, 2 ampoules par jour.

Enfants, 1/2 ampoule par jour.

Dose forte ... Adultes, 3 à 4 ampoules par jour.

Enfants, 1 ampoule par jour.

(Par voie intramusculaire indolore).

Dose d'urgence Adultes, 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

Enfants, 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire).

Nota. — Les injections intramusculaires sont indolores ; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse — (Voir thèse du D^r Joulesse, Paris 1920 et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhot, des D^{rs} Richard St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénéch, etc.)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines
de croissance des Céréales germées

Forme. — Comprimés et Sirop.

Indic. Thér. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique) Tuberculose, Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop, après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou 2 comprimés écrasés d'amylodiastase dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Laboratoire des Ferments

A. THÉPÉNIER

12, Rue Clapeyron — PARIS

ANAPEPTONE VASSAL

Forme. — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphilactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme urticaires, troubles intestinaux.

Echantillon gratuit sur demande.

Etablissements Léon DANJOU

LILLE

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamique, thymol-eucalyptol.

Forme. — Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

Propriétés. — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine, elle agit comme antispasmodique et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

Indications. — Traitement externe de la Coqueluche, des toux spasmodiques, asthme, laryngites, coryza.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la Coqueluche.

Mode d'emploi. — La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations et en aspersions, l'employer pure.

Laboratoires LESCÈNE
à LIVAROT (Calvados)

ANGIOLYMPHE DU Dr ROUS

Prétuberculose — Tuberculose

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire, Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications. — DISPARITION et DIMINUTION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.

AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.

DIMINUTION, DEGENERESCENCE et DISPARITION des BACILLES DE KOCH et autres microorganismes pathogènes.

Posologie. — De 2 à 5 cc. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE
4, Rue Hébert — COURBEVOIE

ANIODOL

Combinaison de Triméthanal et dérivé allylique avec une glycérine spécialement distillée.

Formes. — Solution d'Aniodol à 1 0/0 ; Poudre d'Aniodol ; Aniodol interne (avec compte-gouttes) ; Savon à l'Aniodol à 2 0/0.

Mode d'emploi et Dose :

Usage Externe : Pour injections, lavages, etc. une cuillerée à bouche de Solution Aniodol à 1 0/0 par litre d'eau.

Usage Interne : Pour affections gastro-intestinales, entérite, diarrhée verte, etc., 50 à 100 gouttes par jour dans un verre d'eau.

La Poudre insoluble s'emploie au lieu et place de l'Iodoforme, seule ou incorporée à une Pommade appropriée.

L'ANIODOL

40, rue Condorcet — PARIS

ANNEAUX PESSAIRES J. P.

Le pessaire J.-P. est breveté

pour les raisons suivantes :

Indécomposable : Parce que moulé dans du caoutchouc de première qualité et vulcanisé à chaud. Ce n'est pas un revêtement peu résistant de feuilles anglaises, comme dans les anneaux similaires, mais du caoutchouc pure gomme, pris dans la masse.

Stérilisable : Avant l'emploi, il peut être stérilisé sans que le caoutchouc puisse être altéré.

Incassable : Il arrive que les anneaux similaires se cassent au placement. Cet inconvénient ne peut exister avec le pessaire J.-P., car son ressort intérieur est en spirale et, tout en étant très souple, ne peut casser.

Très souple : Sa souplesse en facilite le placement et lui fait épouser les formes de l'organe malade sans aucune gêne pour la personne qui le porte.

J. PENEY

242, Avenue Berthelot — LYON

ANTACIDOL

Compos. — Carbonate de bismuth chimiquement pur, sucre et cacao.

Action. — Agit comme saturant des acides de l'estomac et en revêtant la muqueuse d'une fine couche de bismuth.

Indications. — Calme les douleurs des hyperchlorhydriques : est spécialement indiqué dans les cas d'Ulcère de l'estomac et les Gastrorrhagies.

Forme pharmaceutique. Tablettes comprimées.

Dose. — Un comprimé toutes les 5 minutes jusqu'à soulagement. (Ces comprimés, même à doses élevées, ne constipent pas).

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tillenuls — PARIS (18^e)

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique. Gouttes. Lumbago. Sciatique. Migraines. Névralgies. Grippe. Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Laboratoire DALLOZ

13, Boulevard de la Chapelle — PARIS (10^e).

ANTHEMA

Sérum sérique antihémorragique
des docteurs Dufour et Le Hello.

Médication antihémorragique basée sur un principe entièrement nouveau. Les propriétés coagulantes de ce sérum proviennent de réactions anaphylactiques provoquées à dessin chez l'animal qui le fournit. L'anaphylaxie passive ainsi réalisée est sans inconvénient pour le malade.

Principales indications. — Etats hémorragiques, hémophilie, toutes les hémorragies inaccessibles à l'action chirurgicale ou rebelles aux moyens hémostatiques habituels, Epistaxis, Hémoptyses, Hémorragies intestinales, etc. Préventif antihémorragique avant l'intervention chirurgicale.

Mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intra-musculaire à la dose de 10^{cm3} (une ampoule). On peut, en cas de besoin, répéter les injections au bout de quelques heures ou les jours suivants.

Pas de contre-indication.

Littérature sur demande

Etablissements **POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (2^e)

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution d'Iodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire:

Acide salicylique...	3 gr. 50
Colchicine.	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner).....	1 gr. 000
Excipient Q s. p ^r 100 cm ³ .	

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe suivant les cas.

Indic. thér. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc. (Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action sur le cœur, les reins et l'estomac).

Le flacon, 20 francs

Le demi-flacon, 12 francs

**LABORATOIRES DE LA PHARMACIE DE LA
PLACE ROYALE, 2, rue du Champ-de-Mars, REIMS**

Compte Postal 234.33

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées et Menthol

Mode d'emploi — En faire brûler une petite pincée sur une soucoupe et, fermant les yeux, respirer doucement la fumée par les narines.

Indications. — Remède d'urgence dans les accès d'*Asthme*, *Emphysème*; *Coryza*, *Asthme des foins*, *Bronchites chroniques*, etc.

La boîte : 5 fr.

CIGARETTES SCHULZÉ-BENGALAIS

aux mêmes principes

La boîte : 3 fr.

Echantillons gratuits au Corps Médical et aux Malades sur recommandation du médecin traitant.

Laboratoires FAGARD

44, Rue d'Aguesseau. — BOULOGNE-sur-SEINE
Téléphone 705

ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de
Gelsemium et poudre de Dower)

Ni Quinine — Ni Antipyrine

Cachets dosés à 0,65 cgr.

Dose et mode d'emploi. — 1 cachet à distance des repas, de préférence le soir au coucher, dans un grog chaud; renouveler au besoin une heure après.

Prop. thér. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, *Coryza*, Maux de tête, Courbature, Névralgies.

Détail : 140, Faubourg St-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll PARIS (17^e)

ANTIPHLOGISTINE

Glycéroplasma minéral aseptique
à chaleur durable et constante.

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria, eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant plus de 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'il attire et engloùtit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîte fer blanc embouties de 250 gr., 500 gr., 1 kil., 2 kil. Se chauffe au bain-marie, s'étend directement sur la peau; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

B. TILLIER, Pharmacien
118, rue de la Convention — PARIS

L'ANTIRROÏDE

Huile indienne : *Balanium*, *Lentiscum*,
Myagrium, *Laurum*, *Spirea*, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibé largement avec l'huile ANTIRROÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSI-CONES ANTIRROÏDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

ANTIURIQUE DE CONTREXÉVILLE

(Complexe citro-sodique de Pipérazine)

Forme. — Granulé effervescent.

L'*Antiurique de Contrexéville* est un solvant des sables et calculs urinaux et biliaires. Il est doué de propriétés diurétiques notables et son efficacité est remarquable comme antiseptique des voies urinaires. Hypotenseur efficace, il diminue la tendance à la floculation du sérum sanguin.
Indic. thérap. — Goutte, Gravelle, Lithiase rénale, Rhumatisme, Obésité, Dermatoses.

Produits Biologiques et Physiologiques

236, Faubourg Bannier-Les Aydes, 236

ORLÉANS

ANTODYNE

(Phenoxypropanediol)

Analgésique sédatif. Sans action antithermique.

Emploi comme analgésique dans :

Névralgies, migraines, céphalées, douleurs rhumatismales, manifestations douloureuses des fièvres infectieuses, etc.

Emploi comme sédatif dans :

Chorée, asthme, coqueluche, etc.

Se prescrit en cachets de 0,50 au nombre de 1 à 6 par jour (prescription magistrale) ou sous forme de cachets d'Antodyne Billon à 0 gr 50.

Littérature sur demande.

Établissements POULENC Frères

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales.

Principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Dégagement d'acides lactique et succinique le long du tube intestinal.

Propriétés therap. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : artério-sclérose, cardiopathies artérielles, angine de poitrine, ménopause, congestions, hémorragipares, néphrites. Se présente sous forme de cachets et se prend à la dose de 1 à 3 par jour.

Prix : 7 fr. la boîte (Impôt compris)

Littérature et Echantillons :

Laboratoires CARESMEL

5 et 7, Rue Henry-Gréville — ANGERS

ANUSOL

Iodo résorcino sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires; pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Pharmacie du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS

APALUDOL AUCLAIR

Médication Quino-Arsénicale
Mangano-Strychnique

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 8 pilules par jour pendant 5 jours

4 » » 10 »

Jeunes gens : 4 » » 10 »

2 » » 20 »

Comme préventif et pendant la convalescence 2 pilules le soir pendant 20 jours par mois, autant qu'il est nécessaire.

Prop. thér. — Spécifique du *paludisme*,
Fièvres intermittentes, Grippe.

F. AUCLAIR, Docteur de l'Université (Sciences)
Pharmacien de la Faculté de Paris
Aigurande (Indre)

APLEXIL

Vaccin préventif des complications pulmonaires
de la Grippe

Utilisé :

1° Comme préventif en foyer épidémique chez toute personne saine.

2° Comme préventivo-curatif une fois la maladie déclarée.

Injecter dans le premier cas le contenu d'une ampoule dans les muscles de la hanche, et quatre jours plus tard, le contenu de la seconde ampoule dans la hanche opposée ; dans le second cas, injecter le contenu d'une ampoule dans les muscles de la hanche et, le surlendemain, celui de la seconde ampoule dans la hanche opposée.

(voir Vaccins Atoxiques Stabilisés)

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENG Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3°)

AQUINTOL

COQUELUCHE

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements. Il retrouve l'appétit et le sommeil.

Dose :

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4	cuillerées à café
Moins de 5 ans :	3 à 8	— à café
Moins de 5 et 15 ans :	4 à 8	— à dessert
Adultes :	5 à 8	— à soupe

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ARHEOL

Formule. — $C^{15} H^{26} O$.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

Prop. Thér. — Balsamique; antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dose. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois: le matin, à midi et le soir, une demi-heure avant les repas.

Prix : 10 Fr.

Laboratoires P. ASTIER

45, rue du Docteur-Blanche, PARIS (16^e)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Poudre rougeâtre, insipide, inodore, non caustique, non toxique, sèche, contenant 48 % de gâlaeol, 48 % de tannin, 4 % d'aldéhyde formique.

Mode d'emploi. — Contre *ozène*. — Matin et soir laver soigneusement l'intérieur du nez à l'eau tiède, bécille ou bécillée pour enlever croûtes et sécrétions; quatre ou six fois par jour introduire l'Arhine dans les narines en prisant ou mieux à l'aide d'une poire en caoutchouc pour insuffler les poudres.

Contre *Coryza* et *maux de gorge*. Désinfecter le nez et la gorge par les méthodes habituelles et faire priser de l'Arhine 2 ou 3 fois dans la journée et le soir au moment de se coucher. L'écoulement dans le coryza, tarit rapidement sans laisser aucune trace.

Indication. — *Ozène*, *coryza* et *maux de gorge*.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8*)

Téléphone Wagram 14-73

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent
à 40 % de mercure

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise; une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigr. Hg

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse; absence de nodosités; tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 11 fr.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, Rue du Bac — PARIS

ARSÉNIODE BURIAT

Forme. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 %.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, Chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatique-arthritique.

Mode d'emploi. — Doses moyennes. Enfants : 2 gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : 15 à 30 gouttes, 2 fois par jour.

Flacon de 30 gr. : 5 fr. 60

Laboratoire BURIAT

30, rue Pergolèse — PARIS (16^e).

Feuillets jaunes : Lymphatisme, scrofule, tuberculose, anémies, convalescences, arthritisme, artériosclérose, dermatoses.

ARSENOBENZOL

Dichlorhydrate
de dioxydiamidoarsenobenzol

Indications. — *SYPHILIS* à toutes ses périodes, Pian ou framboesia, typhus récurrent, paludisme, leucémie, angine de Vincent, etc.

On l'emploie en injections intraveineuses à doses progressives de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 en ayant soin d'alcaliniser la solution.

Peut également s'administrer en lavements ou comme topique local.

Littérature sur demande.

Etablissements POULENC Frères

92, rue Vieille-du-Temple. — PARIS

ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur

Indic. thér. — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.

Dose et mode d'emploi. — Ampoules dosées à 0,05. Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

ARTÉRIO-SÉRUM VINCARDI

Principes actifs. — Origine végétale. Silice. Iode. Sulfures d'allyle, Citrates alcalins en combinaison organique directement assimilables.

Forme. — Capsules enrobées de gluten, ne se dissolvant qu'au contact des sucs intestinaux. **Innocuité absolue**, tolérance parfaite. Pas de contre indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérosant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il dégrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypotension, scléronéphrose.

Doses. — 4 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Lab. de l'Artério-Sérum VINCARDI

P. VIGUIER, pharmacien

49, av. Borrighone et 36, av. Saint-Lambert

NICE (Alpes-Maritimes)

Chèques postaux, Marseille 105-38

ARTHRI-SEL

Traitement hydro-minéral de régime de toutes les affections arthritiques, Diurétique léger n'occasionnant jamais d'irritation rénale.

Indications. — Rhumatisme chronique, Goutte, Gravelle, Cystite, Lithiase hépatique ou rénale. Insuffisance urinaire.

Composition. — Citrate de lithine, Citrate de soude, Sulfate de soude.

Dose et mode d'emploi. — Un paquet chaque jour, dissous dans un litre d'eau. Se prend comme une eau minérale.

Chaque boîte contient 20 sachets.

J. BOILLOT & C^{ie}

22, rue Morère — PARIS

ARTHRITOSE

Médicament-type de l'Arthritisme

Composition et Propriétés. — Fluorure de sodium (*crée la nutrition ralentie*), Benzoate de lithine (*active les sécrétions biliaires et urinaires*), Urotropine (*active les conduits excréteurs*), Lysauric N. carb. solide benzoiné (*calculeux l'hyperacidité organique des arthritiques*).

Indications. — Manifestations de l'arthritisme et des états acidosiques.

Forme. — Granulés solubles dans l'eau sans effervescence sans dégagement d'acide carbonique, sans formation de tartrates qui occasionnent toujours une augmentation de l'acidité organique contraire à la cure de désintoxication.

Mode d'Emploi et Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau ordinaire, d'Evian, de Vichy, de Vittel, etc., ou dans une infusion. Matin à jeun et soir en se couchant. — En cas de crise : 3 ou 4 cuillerées à café par jour. Une cuillerée à café dans un litre d'eau de table comme boisson ordinaire des arthritiques.

Prix réglementé : 8 fr. le flacon

Remise sur commandes médicales : 40 0/0 franco de port et d'emballage.

Laboratoires "LA BIOMARINE"

DIEPPE (Seine-Inférieure)

ASCIATINE

Trigémine des " Usines du Rhône "

Analgésique (douleurs dentaires)

Hypnotique (insomnies dues à la fièvre, à la douleur, etc.)

Antinévralgique (névralgies faciales, stomacales, intercostales, sciatiques).

Comprimés dosés à 0 gr. 25 (de 1 à 3 comprimés).

Laboratoire des Produits

" USINES DU RHONE "

21, Rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

ASCOLÉINE RIVIER

Il a été démontré par l'analyse chimique qu'une cuillerée à café ou cinq comprimés (doses moyennes) d'ASCOLÉINE RIVIER équivalent à un demi litre de la meilleure huile de foie de morue.

Il a été démontré également que " L'ASCOLÉINE RIVIER " contient les Vitamines A et B.

" L'ASCOLÉINE RIVIER " se présente sous trois formes : en huile (sans goût désagréable) pour les adultes, en comprimés (véritables bonbons) pour les enfants, en ampoules injectables (action très rapide). Elle remplace l'huile de foie de morue dans tous les cas.

Toutes Pharmacies ou à défaut chez

Henri RIVIER, Pharmacien

26-28, rue Saint-Claude — PARIS

ASTHMOLYSINE

(en capsules)

Composé : Valériano-caféiné.

Effets. — Préventif et abortif des crises d'asthme.

Dose et mode d'emploi. — Une capsule par crise d'asthme.

Avantages. — Pas d'accoutumance. Pas de contre-indication. Facilité d'absorption.

La Capsule d'ASTHMOLYSINE est, en tout temps et en toutes circonstances, à la portée de l'asthmatique.

Prix au Public : 9 fr. 90 la boîte.

Littérature et Echantillons sur demande:

Laboratoire Georges MIESCH

28, boulevard de la Villette — PARIS (19)

ATOPHAN CRUET

Acide phénylquinolique², — carbonique
Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicaments.

Forme. — Cachets ou comprimés dosés à 0,5

Prop. Thér. — Goutte et rhumatismes articulaires. Manifestations arthritiques.

Dose. — 1 à 4 gr. par 24 heures dans les cas aigus. 1 gr. par 24 heures pendant 20 jours dans les cas chroniques.

Mode d'emploi. — Pendant les repas, si le malade se nourrit, et à intervalles réguliers. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Robert CRUET, Docteur en Médecine

Pharmacien de 1^{re} Classe

13, rue des Minimes — PARIS

ATOQUINOL CIBA

Composition. — Phénylcinchoninate d'allyle solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général, goutte, rhumatismes, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — *Etats aigus* : 4 à 8 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 2 à 4 cachets ou cuillerées, à café de granulé, huit ou dix jours par mois.

Prix : La boîte de 20 cachets. 6 francs

Le flacon de granulé. . 8 francs

Laboratoires CIBA O. ROLLAND

1, place Merand — LYON

AVANAZOL COUTURIEUX

Description. — Comprimés composés de Levurine Extractive, extrait de gui et acore, pour le traitement du coryza : à employer dès l'apparition des premiers symptômes.

En flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Les comprimés d'AVANAZOL provoquent une réaction de la muqueuse nasale et une phagocytose énergique (Levurine Extractive), avec disparition de la congestion (gui) et de l'irritation (acore).

Indications. — L'AVANAZOL constitue le traitement le plus efficace du coryza, à condition d'absorber, dès les premiers symptômes 18 comprimés par jour, en trois fois. Continuer à la dose de 12 à 20 comprimés par jour. On obtient ainsi l'avortement du coryza.

Laboratoire COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

AZIGOL THÉVENOT

Spécifique de l'Épilepsie

Composition. — Comprimés à base de Tartrate borotocalcique (voir Borocalcyl Thévenot), Phényléthylmalonylurée Extrait de Gelsemium, Extrait de Flecidia.

Indications. — Traitement de l'Épilepsie pour lequel l'Azigol donne des résultats absolument incomparables. Ce médicament réalise, en effet, une association renfermant de la Phényléthylmalonylurée, à faible dose, dont l'action suspensive sur les crises est fort connue : le Borotartrate de chaux qui agit comme modificateur puissant du tissu nerveux. Les extraits végétaux sont des anesthésiques qui diminuent la sensibilité périphérique et même la sensibilité de certains organes qui sont fréquemment l'origine de réflexes constituant le phénomène qui déclenche les crises. L'Azigol donne des résultats durables. Il peut, il doit être petit à petit, remplacé par le *Borocalcyl* qui contient uniquement du Borotartrate de chaux. L'Azigol ne provoque pas l'intolérance des voies digestives, ni d'éruptions cutanées. Son emploi n'est accompagné d'aucun trouble sensoriel.

Dose. — 2 à 4 Comprimés par jour, au plus. Les absorber trois quart d'heure environ avant les repas.

Echantillons sur demande

Prix de la boîte de 40 Comprimés : 12 francs

Fabrique par la
Société des Produits Pharmaceutiques THÉVENOT
21, rue des Roses — DIJON

AZUFROL

Description. — 1° Capsules kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° Pommade à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action Thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de sulfuration (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche. — PARIS

BACKERINE ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie

Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation

Forme. — Ampoules, cachets, dragées.

Indications. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas, quatre ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

Laboratoire BEAUGONIN

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

BALSAMIODOL

Composition :

Menthol, acide phénique, eucalyptol, goménol, benjoin et alcool.

Action :

Antiseptique des voies respiratoires.

Indications :

Maladies de la gorge et du nez.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations.

Pharmacie DEBŒUF

10, Rue Washington — PARIS (VIII^e)

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera Scillitine-Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

Forme. — Plus fluide et moins sucré qu'un sirop.

Caractéristiques. — CHEZ LES ADULTES, plus calmant, plus antispasmodique que le BROMOFORME, les composés forméniques et les narcotiques, CHEZ LES ENFANTS, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois. Antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — COQUELUCHE, toux spasmodiques, laryngées, toux émétisante des tuberculeux, asthme.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires L. LESCÈNE

à LIVAROT (Calvados)

BAUME DELACOUR

Gerçures des Seins — Gerçures en général

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi : Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume avec le pinceau qui accompagne le flacon et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec le pinceau et deux bouts de sein :

5 fr. (impôt compris).

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie.

19, avenue de Villiers — PARIS

BAUME RHODIA

(Salicylate de Glycol solubilisé U. R.)

Succédané propre et inodore des baumes et onguents à base de Salicylate de Méthyle.

TRAITEMENT EXTERNE DES DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES

Le *Baume Rhodia* ne provoque pas les irritations constatées avec certains éthers salicylés de la glycérine.

LABORATOIRE DES PRODUITS

« **USINES DU RHONE** »

21, Rue Jean Goujon — PARIS (VIII^e)

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

BEATOL

Prop. Thér. — Sédatif nerveux, Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications, Maladies nerveuses ou mentales.

1^o Forme : Ampoules.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 25
Bromhydrate de scopolamine	1/4 de mgr.
Soluté de valériane.....	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule injecté sous la peau.

2^o Forme : Liquide.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Valériane stabilisée Q. P.....	5 cm ³
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 015

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuill. à café dans de l'eau sucrée après le repas du soir, une heure avant le coucher.

3^o Forme : Comprimés.

Composition :

Diéthylmalonylurée.....	0 gr. 18
Intrait de valériane.....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 02

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude dans l'intervalle des repas.

Laboratoires Réunis

159, Avenue de Wagram

PARIS (17^e)

BENZO-IODHYDRINE

(Capsules de)

La Benzo-Iodhydrine n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue, et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur, diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence, des cardio et des artério-scléreux, des gouteux, des emphysemateux. — Chaque capsule de gluten correspond à 0 cg. 30 de KI.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL

36, Rue de Paris — COLOMBES (Seine)

BENZOLACTOL

Granulé soluble d'absorption très agréable

Propriétés thérap. — Antiseptique spécifique de toutes les affections du tube digestif. Par son action oxydante (MgO₂)-transfixante et destructrice, le Benzolactol possède une action microbicide gastro-intestinale.

Composition. — Combinaison de Peroxyde de Magnésium (Epegan), de Benzolate de Naphthyl, de Salicylate de Phényl en milieu sucré.

Indications. — Toutes les infections aiguës ou subaiguës du tube digestif. Fermentations et infections gastro-intestinales. Entérites, Entéro-colites mucocommembraneuses, Embarras gastriques, Langue chargée, Intoxication gastro-alimentaire, Grippe à forme gastro-intestinale, Ictère, Gastro-entérite des nourrissons, Fièvre typhoïde, Affections cutanées, Pseudo-typhoïdes, Paratyphoïdes, Infections alimentaires, etc.

Cas Chirurgicaux et Affections Contagieuses.

Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, après les repas. Laisser fondre dans la bouche.

Par les enfants (jusqu'à 3 ans), par demi-cuillerées à café, 2 à 4 par jour.

Echantillons et Littérature

Laboratoires FEVRIER & DECOIS

26 rue de Sévigné — PARIS (4^e)

BENZYLOL

Gouttes à base de Benzoate de Benzyle
Antispasmodique des muscles lisses

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 40 gouttes toutes les 3 ou 4 heures.

Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

Prop. thérap. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme : muscles bronchiques, intestin, estomac, pylore, voies biliaires, vessie, urètre, utérus et annexes.

Indications. — Asthme vrai, Coqueluche, Hoquet, Diarrhées douloureuses dues au péristaltisme exagéré de l'intestin, Constipation spasmodique, Colique hépatique ou néphrétique, Incontinence d'urine spasmodique, Dysménorrhée, Coliques utérines, Hypertension, etc.

E. HAUTDIDIER

37, rue Galilée — PARIS

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo salicylate comp.)

Liment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Compos. — Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut détecter dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prop. Thér. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciaticques, douleurs des articulations, névralgies.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré. — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

BIHÉGON

COMPOSITION ET FORME

CALOMEL et S.-NITRATE de BISMUTH chimiquement pur en un Comprimé dosé comme suit :

Calomel	0,01 centigr.
S.-Nitrate de Bismuth ...	0,50 centigr.
Lactose	0,25 centigr.

Chaque comprimé correspond, par conséquent, à 0,008 milligrammes de Hg métallique

PROPRIETES ET MODE D'ACTION

Le Calomel est à la fois le sel mercurique absorbable le plus riche en Hg et le mieux toléré.

Son usage prolongé occasionne cependant des manifestations pénibles pour le malade : diarrhées, stomatite, etc.

L'association avec le Sous-Nitrate de Bismuth remédie complètement à ces inconvénients.

L'action compensatrice du Bismuth associé au Calomel a été récemment mise en lumière et appuyée de faits cliniques évidents par le Docteur MILIAN, médecin des Hôpitaux de Paris, *Journal de Médecine et de Chirurgie*.

En réunissant ces deux médicaments sous une forme pratique, le Bihégon permet au médecin de prolonger le traitement mercuriel aussi longtemps qu'il le juge utile soit comme complément, soit comme intermède à des traitements plus actifs (arsénicaux, bismuthiques, etc..)

MODE D'EMPLOI

Un Comprimé matin et soir avant chaque repas pendant 20 jours. Arrêt 10 jours et reprise.

N.-B. — Dans certains cas, le médecin pourra prescrire jusqu'à 4 comprimés par jour.

PRIX : 12 FRANCS

La boîte contenant 40 Comprimés

Les Laboratoires PHARMAX

F.-E. VAYROLATTI, Doct. en Pharmacie

24-26, Rue Trachel — NICE (A.-M.)

BI-IODURE SOUFFRON

Iodure de potassium et Bi-Iodure de mercure
 $KI + Hg. I^2$. — Chimiquement purs. — Titrés. —
 Inaltérables.

Pas d'iodisme

Solution (Iodure de potassium, 1 gr. + Bi-Iodure
 de mercure 0,01) par cuil. à potage.

Dragées (Iodure de potassium 0 gr. 25 + Bi-Iodure
 de mercure 0,0025) chaque.

Gouttes Bi-Iodurées (simples), une goutte contient
 1 mgr. $Hg I^2$.

Ampoules Bi-Iodurées aqueuses ou huileuses,
 0,004 mgr., 0,01^e et 0,02 $Hg I^2$.

Ampoules rigoureusement titrées et stérilisées.
 Indic. thér. — Maladies de la peau, syphilis.

Etablissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres — PARIS

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires

(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules glutinisés (digestion
 intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre
 vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1^o Les causes d'arrêt d'ex-
 crétion : lithiase, compressions, ictères
 subaigus et chroniques par rétention.

2^o Les cas d'insuffisance biliaire : cholémie
 familiale, entérocolite muco-membraneuse.

Le flacon de 60 globules : 6 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

BILIFLUINE

du Docteur L. BIGNON, de Vichy
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal. Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhose sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir.

Laboratoires BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS

BILIRHÉINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Indication :

Insuffisance hépatique.

Posologie :

Deux pilules glutinisées à la fin de chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

11, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

BIOCALCOSE CHEVRETIN

Granulé organo-calcaïque

Granulé brun, soluble dans l'eau. Outre une grande quantité de chaux, contient encore du phosphore, de la potasse, de la soude, de la magnésie, du fluor, de la silice, etc., dans les proportions de l'organisme sain.

Prop. thér. — Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, croissance, rachitisme, neurasthénie, dentition, diabète, grossesse.

Dose et Mode d'emploi. — 1 à 2 cuill. à café jusqu'à 8 ans, 3 à 4 au-dessus de cet âge et chez les adultes. A prendre dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

5, rue Ballu — PARIS — Tél. Central 45-56

BIODERMYL MONAL

Formes :

Ampoules, globules glutinisées.

Composition :

Chaque ampoule de 2 cm³ contient : une solution indolore et bien tolérée de Hg I² à 1 %, soit 0 gr. 02 par ampoule.

Chaque globule contient : Hg I² pur 0.0025 ; Ki, 0.025.

Doses. — Série de 12 injections.

4 globules par jour, aux repas.

Traitement discret ; pas d'indications sur l'étiquette et le prospectus du flacon de globules

Laboratoires MONAL & Cie

20, rue de Vienne — PARIS

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel, et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

Sulfate de strychnine....	un milligr.
Cacodylate de soude.....	0 gr. 05
Nucléinate de soude.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude.	0 gr. 05
Sérum isotonique complet..	un cc. 3

par ampoule

(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive): de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20	40	60	80	100
	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Gouttes
	cont.	cont.	cont.	cont.	cont.
Sulfate de Strychnine...	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de Soude.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Polyglycérophosphates					
dansant en Acide phosphorique ...	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Acide phosphorique officinal. .	0 gr. 12
Méthylarsinate disodique... .	0 gr. 012
Sulfate de strychnine... .	un 1/2 milligr.

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire OBERLIN .

J. Tinardon, pharmacien de 1^{re} Classe
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

BIOGASTRINE

« PANSEMENT GASTRIQUE PARFAIT »

Forme. — Granulé facilement dissociable dans l'eau pure ou sucrée.

Doses. — Une ou deux cuillerées à café chaque jour, à jeun :

1° Le matin au réveil ;

2° A 17 heures, quand la chose sera possible ;

3° Le soir au coucher, trois heures après le repas.

Pas de contre-indication. Tolérance parfaite. Ne constipe jamais.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins sur demande adressées à MM.

BERTHIOT & Cie

pharmac. de 1^{re} classe, 1, boul. Henri-IV
PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques
orientaux sélectionnés

Usage médical :

1^o Culture en bouillon :

En boîtes de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 16 fr.

En boîtes de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 4 fr.

En boîtes de 6 tubes (pour le caillage
du lait).

La boîte : 4 fr.

2^o Culture sèche ; boîtes de 60 comprimés (4 à 6 par jour).

La boîte : 6 fr.

Indications. — Traitement des putré-
factions intestinales et de l'auto-intoxi-
cation digestive.

Usage chirurgical :

1^o Culture liquide, en boîtes de 6 tubes.

La boîte : 4 fr.

2^o Culture sèche en poudre.

La boîte : 4 fr.

Indications. — Pansements des plaies
infectées, escharres, vaginites, cystite
tuberculeuse, affections nasales et
laryngées, pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuill. à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Prop. Thér. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

6 fr. le flacon

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia — PARIS

BIOPHOROL

Formule. — Strychnine. Méthylarsinate disodique. Quinine Phosphoglycérate associés de : Fer - Chaux - Magnésie

Doses. — Enfants, moins de 12 ans : 1 comprimé aux deux repas.

Adultes : 2 comprimés aux deux repas.

Paludéens : 2 comprimés aux trois repas.

La dose de 4 comprimés correspond à 1 mgr. de strychnine, 5 cgr. de méthylarsinate disodique, 20 cgr. de quinine organique, 75 cgr. de poly-phosphoglycérate.

Présentation. — Comprimé à enrobage spécial facile à prendre agréable au goût, parfaitement soluble dans l'estomac.

Indications. — Spécifique de tous les désordres physiologiques provenant : a) Vices de nutrition, Anémie, Chlorose, Surmenage, Phosphaturie, Artério-sclérose, Rhumatismes, etc., b) Troubles consécutifs à une affection microbienne : Grippe, Fièvre typhoïde, Rougeole, Paludisme, etc.

Contre-Indications. — Aucune, toujours parfaitement toléré, même par les organismes les plus délicats.

Les Laboratoires NOVALIS

Dupraz-Laurençon, 1, rue Chavanne, LYON

BIOSINE LE PERDRIEL

Glycérophosphate double de chaux et fer. Ni intolérance, ni constipation, ni coloration des dents. Reconstituant énergique.

Indications. — Anémie, Chlorose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, suite de fractures, Hémorragies.

Doses. — 1 (0,30 de Glycérophosphate) à 4 mesures par jour aux repas dans eau pure ou sucrée. Chaque bouchon-mesure contient 20 cent. de principe actif.

J. LE PERDRIEL

11, Rue Milton — PARIS

BIOTOSE CIBA

Extrait vitaminé polyvalent

Composition. — Préparation sirupeuse, de saveur agréable, dont le maltose forme la base, et contenant les diastases de l'orge germinée, avec les 3 grandes classes de vitamines (facteurs hydro et liposolubles).

Action physiologique. — La BIOTOSE favorise l'assimilation des substances alimentaires et aide à la fixation du calcium. Elle sollicite et active le fonctionnement des glandes endocrines. grâce à son grand pouvoir diastasique, elle aide à la digestion des substances amylacées et active le transit intestinal (action laxative légère par stimulation glandulaire).

Indications. — Toutes les maladies de croissance : Etats de chétivité et d'hypovitalité, rachitisme, troubles digestifs, convalescence, grossesse, allaitement, tuberculose, etc., etc. — Chez l'enfant, toutes les fois qu'il ne peut être alimenté par le lait de la mère; chez l'adulte, toutes les fois qu'un régime d'aliments conservés ou stérilisés lui est imposé par les circonstances de l'état de ses voies digestives.

PRIX : Le flacon, 5 francs.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, Pharmacien
1, place Morand — LYON

BIOZOL

Puissant Reconstituant général

Composition. — Nucléinate de Soude, Glycéro-Phosphate de Chaux, Kola, Maté.

Forme. — Granulé fondant d'un goût exquis.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la Phagocytose, Réminéralisateur physiologique, Toni-cardiaque, Double l'activité vitale sous toutes ses formes : intellectuelle, motrice, végétative.

Indications. — Tous les états de déchéance organique : Anémie, Croissance, Tuberculose, Lymphatisme, Diabète, Convalescence, Neurasthénie.

Dose et Mode d'emploi. — *Adultes* : Trois cuillerées à café par jour.

Enfants : Deux à trois et demie cuillères à café par jour.

A prendre pur ou délayé dans : eau, vin, thé, lait.

Prix du Flacon : 9 francs

Laboratoire G. CAILLAUD

25, rue Drouot — PARIS

Téléphone : Central 59-92

BISMHYDRAL

Composition :

Définie et stable de chlorure mercurieux pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparé.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Millan).

Indications :

Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien par voie buccale.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité

Doses : Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Littérature et Echantillons :

E. LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III PARIS (8^e)

BISMUTH DESLEAUX

Composition. — Carbonate de bismuth chimiquement pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial assurant son adhérence parfaite à la muqueuse. Sucré et aromatisé.

Action. — Pansement bismuthé idéal de la muqueuse gastro-intestinale, le bismuth étant avant tout dans les affections de l'estomac le médicament de la douleur (Prof. Hayem). — Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate (nitrites). Supérieur aux produits de substitution (kaolin, talc), goût agréable, facilement absorbé par les malades les plus difficiles.

Indications. — Ulcères, Gastropathies, Hyperchlorhydries, Sténoses pyloriques, gastro-entérites, Oxyuriase, etc.

Posologie. — (Chaque flacon porte un couvercle-mesure dont le contenu correspond à environ 10 gr. de carbonate de bismuth chimiquement pur.) — 10 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit le matin à jeun, soit fractionnés 1/2 heure avant chaque repas, dans eau, lait ou tisane — Oxyures : Adultes, 20 gr. par jour, en 2 fois, à jeun. Enfants, 4 à 8 gr. par jour, en 2 fois, à jeun, selon l'âge, dans un verre d'eau tiède. — Une cure de 5 jours suffit habituellement, une deuxième cure peut paraître utile, une troisième est rarement nécessaire.

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Province

Pharmacie LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (8^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines) extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à Juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition (*Rachitisme*). Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (*Diarrhées, Constipation, Gastro-entérites*) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni caseotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^{me} mois : 1/2 à 1 cuillerée à café par biberon. Du 5^{me} au 6^{me} mois : 1 1/2 à 2 cuillerées à café par biberon. A partir du 7^{me} mois : 1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.

Nota. — La Blédine peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie
VILLEFRANCHE (Rhône)

B^B BOLDO GMET

Extrait total du "Boldo Fragrans"

Préparation liquidée, sans Alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuill. à café par jour. *Enfants* : 1/2 dose, à prendre par cuill. à café dans un peu d'eau ou de tisane après chacun des principaux repas.

Prop. Thér. — Cholagogue. Laxatif.

Indications. — Jaunisse, Colique hépatique, Cirrhoses, Insuffisance biliaire, Cholécystites et toutes les affections hépatiques.

Littérature et échantillons sur demande faite au service médical des

Produits GMET

27, Rue du Faub. Montmartre — PARIS (9^e)

Tél. Bergère 43.10

BOLEASE MONAL

Forme. — Globules glutinisées.

Comp. — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, toni-hépatique, anti-toxique et sédative.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. *Affections hépatiques* : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhoses. *Affections intestinales* : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, rue de Vienne — PARIS

BORICINE MEISSONNIER

Tétraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine.
Sel défini, cristallisé en rosettes, résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du borate de sodium. Infinitement supérieur à ses composants par :

- 1^o Sa pureté. — Sel cristallisé neutre, non caustique.
- 2^o Sa solubilité. — 16 0/0 à froid } dans
75 0/0 à l'ébullition } l'eau
parties égales dans la glycérine.
- 3^o Son pouvoir bactéricide. — Stérilisante à 6 0/0.
- 4^o Sa non-précipitation des alcoolides et son action sur les muqueux.

Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.

Hygiène et antiseptisme générale de la peau et des muqueuses : conjonctivites, otites, oxène, stomatites, laryngites, dermatoses, maladies des voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures.

Mode d'emploi :

En poudre : insufflations en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

1 cuillerée = 25 gr. Boricine

Laboratoires LOGEAT

30, rue de Chaillot — PARIS (16^e)

BOROCALCYL THÉVENOT

Composition. — Comprimés de Borotartrate de chaux.

Indications. — Epilepsie, Convulsions, Hyperexcitabilité, Spasmes.

D'une façon générale, le *Borocalcyl* est indiqué là où les bromures ou les préparations de valériane, etc., l'étaient il y a peu de temps encore. Le *Borocalcyl* présente cet énorme avantage d'être à la fois *beaucoup plus actif* et de ne provoquer *aucun des accidents* qui accompagnent toujours l'emploi des bromures, à dose quelque peu élevée. Le Borotartrate (Borocalcyl) s'est montré dans les laboratoires d'essai, très supérieur aux bromures de potasse ou de soude. La théorie permet d'ailleurs de prévoir cette supériorité, puisque le sodium est un excitant du système nerveux alors que le Calcium en est un sédatif net.

Dose. — 2 à 4 comprimés par jour trois quarts d'heure avant les repas.

Echantillon sur demande

Prix de la Boîte de 40 Comprimés : 7 francs

Produit fabriqué par la

Société des Produits Pharmaceutiques THÉVENOT

21, rue des Roses — DIJON

BOULES PLASTIQUES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif.

Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 43° : pas de risque d'obstruction du conduit auditif.

Boules aseptisées ne pouvant, même en cas d'affections de l'oreille, provoquer de complication. Matières premières chimiquement pures.

Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent entièrement. Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

Indications. — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades, sans avoir recours aux hypnotiques et aux soporifiques toujours dangereux.

contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

DORMIR ET TRAVAILLER AU MILIEU DU BRUIT

Mode d'emploi. — Dépouiller la boule de son revêtement d'ouate. La malaxer jusqu'à ce qu'elle soit très plastique. La placer à l'entrée de l'orifice auditif, sans la faire pénétrer profondément. Une spatule jointe à chaque boîte permet de la retirer très aisément.

BOULES QUIES, 47, Bd Victor — PARIS (15^e)

BROMÉINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes Pharmaceutiques. — Ampoules dosées à 0,02 egr. — Pilules : 0,01 egr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour. — Sirop : 0,03 par cuill. à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour. — Gouttes : X gouttes = 0,01 de Broméine crist. Dose : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire MONTAGU

49, boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules kératinisées contenant

Bromure de potassium.....	0 gr. 30
Bromure d'ammonium.....	0 gr. 20
Levurine extractive.	0 gr. 10

en fl. de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — 20 gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. à prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Prop. thér. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

PÉPIN & LEBOUcq

à COURBEVOIE (Seine)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes dont 40 = 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 20 à 50 gouttes. *Enfants* : 10 à 20 gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

BROMURES SOUFFRON

Bromure de Potassium (KBr) - Bromure de Sodium (NaBr) -

Chimiquement purs - Titrés et inaltérables

Pas de Bromisme

Solution à 2/15. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Sirop à 2/20. Une cuill. à potage contient 2 gr. KBr ou NaBr.

Dose et mode d'emploi. — De 0 gr. 25 cgr. à 4 gr. par jour et plus.

Prop. Thér. — Antinervin.

Indications. — Affections nerveuses, insomnie, chorée, épilepsie, hystérie, névrose.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

BULGARINE THÉPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares
sur milieu végétal

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre

Indic. Thér. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte), Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatoses, Furunculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du choléra.
Poudre : Rhinites, ozènes, stomatites, pansement des plaies.

Modes d'emploi. — Adultes : Sucrer deux comprimés ou boire un verre à manière de Bouillon, une demi-heure avant le repas.
Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Laboratoire des Ferments A. THÉPÉNIER
12, Rue Clapeyron — PARIS

Le Dictionnaire des Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du Médecin.

CACHETS „ ROCHE ” DE THIOCOL

1 Cachet „ Roche ” de Thiocol = 0,50 egr. Thiocol „ Roche ”.

1 gr. Thiocol „ Roche ” = 0,52 egr. gafacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Eupeptique et Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS „ ROCHE ” de Thiocol

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}
21, Place des Vosges — PARIS

CACODYLO-PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Association synergique de cacodylates et glycérophosphates très purs (voir *Phosphate vital*) dont la tolérance est toujours parfaite et l'efficacité maximum.

Formes et Doses. — (En boîtes de 10 ampoules pour injections hypodermiques) :

Cacodylo-Phosphate vital de chaux
Cacodylo-Phosphate vital de soude
ou Cacodylo-Phosphate vital de fer,

1 à 2 injections de 1 cmc par jour.

Propriétés. — Le Cacodylo-Phosphate vital à base de chaux ou à base de soude constitue un puissant arsenico-tonique. — Le Cacodylo-Phosphate vital de fer réalise la médication hémato-gène par excellence (réunion de l'arsenic cytogène, du fer hémoglobino-gène, et du Phosphate vital stimulant de la nutrition et des échanges physiologiques).

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement.

Etablissements JACQUEMAIRE
M. MIGUET, Docteur en Pharmacie
VILLEFRANCHE (Rhône)

CALCEOSE

Traitement de Recalcification (Méthode de Ferrier). La Calcéose est le seul produit recalcifant préparé suivant les indications de Ferrier.

Indications. — Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Croissance, Rachitisme, Neurasthénie.

Composition. — Sels de chaux combinés au Maltose. Cette combinaison est reconnue comme le plus assimilable des sels de chaux.

Dose et mode d'emploi. — 6 comprimés par jour (ou 6 mesures de poudre). Pour les enfants, 4 comprimés ou 4 mesures.

Chaque boîte contient 100 comprimés

J. BOILLOT & C^{ie}

22, Rue Morère — PARIS

CALCILINE

Formule : Ph. de Chaux tri.. .. .	0,35
Carbonate de Chaux	0,07
Fl. de Calcium	0,005

par Comprimé ou par demi-mesure

Forme. — Comprimés. Granulé.

Dose. — 2 comprimés ou 1 mesure, avant chaque repas. — Enfants 1/2 dose.

Propriétés. — Recalcifiant type en raison de sa composition : Phosphate, Carbonate, Fluorure de Calcium.

Indications. — Anémie, Scrofule, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose pulmonaire, osseuse, ganglionnaire, Croissance, Adénites, Maladies des Os, Diabète, Grossesse, Carie Dentaire, Convalescence.

Aucune contre indication.

Laboratoire de la "CALCILINE"

ODINOT, Pharmacien

21, rue Violet — PARIS

CALCIPHOSÉ

Composition :

Phosphate bicalcique.....	0 gr. 25
Glycérophosphate de chaux..	0 gr. 20
Carbonate de chaux.....	0 gr. 30
Hypophosphate de chaux....	0 gr. 05
Phosphates organiques	
Végétaux assimilables.....	0 gr. 10

Indications. — Tuberculose, Convalescences, Anémies, Débilisations nerveuses, Neurasthénie, Phosphaturie, Diabète, Rachitisme, Grossesse. Allaitement, Fractures, etc...

Posologie.— *Adultes* : 1 à 2 Comprimés, avant les deux principaux repas, délayés dans un peu d'eau.

Enfants : 1/2 dose d'adulte.

Pharmacie CARTILLIER

48, rue de Berri — PARIS

CAPSULES BRUEL

à l'Éther Amyl Valérianique

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux jusqu'au spasme douloureux des coliques hépatiques et néphrétiques.

C'est un précieux hypnagogue.

Dose. — 3 à 15 capsules par jour.

Brochures et échantillons :

G. BRUEL

36, Rue de Paris — COLOMBES (Seine)

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Galacol, à la dose de 0,05 egr. dissoute dans 0,20 egr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Se dissolvant lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6 Rue Abel — PARIS

CAPSULES DE MORRHUÏNE PUY

à l'extrait complet d'Huile de Foie de Morue
supériodé

Dosées à 2 milligr. d'iode combiné par capsule. Elles représentent chacune 5 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extrait complet d'huile de foie de morue obtenu dans nos laboratoires par un procédé spécial breveté, contient réellement tous les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

Doses. — Enfants de 0 à 17 ans 2 à 6 capsules; Adultes 8 ans et au-dessus 6 à 10 capsules, avant manger.

Laboratoire PUY

à GRENOBLE (Isère)

CAPSULES RAQUIN

Capsules au *Copahivate de soude*, à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac.

Avantages :

Tolérance parfaite, ni odeur, ni renvoi.

Doses :

Le *Copahivate de soude*, ou copahu physiologique, est prescrit dans le traitement de la blennorrhagie, d'origine récente ou ancienne, à la dose de 6 à 12 capsules par jour, à prendre en trois fois, le matin, au repas de midi, et le soir en se couchant.

Établissements FUMOUE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

CAPSULES SALS

Capsules Sals à l'huile de foie de morue Riche, pure.

Capsules Sals à l'huile Riche, iodée à 50 ‰.

Capsules Sals à l'huile Riche, créosotée à 10 ‰.

Capsules Sals à l'huile Riche, gaulacée à 5 ‰.

Indications. — Anémies, Bronchites, Lymphatisme, maladies infectieuses, Tuberculose.

Forme. — (Chaque boîte renferme 30 capsules de 3 grammes.)

Laboratoires du Topique Bertrand

BLANCHARD & PHILIPPE

OULLINS (Rhône).

CARBOCHLORYLS

Produits à base de tétrachlorure de carbone de double rectification, absolument pur.

CARBOCHLORYL : Asepsie, antiseptie; traitement des dermatoses. Tolérance parfaite. *Ininflammable*. Doit être substitué à l'éther, à l'alcool, à la benzine dans la plupart de leurs usages.

CARBOCHLORYL IODÉ (3 % d'iode): Tous les usages de la teinture d'iode; non irritant, *Antiseptie profonde* des téguments.

Traitement des *fistules*, des plaies infectées, de l'*érysipèle*;

Traitement des pyodermites, des mycoses, du lupus, etc.

PARACARBOCHLORYL IODÉ : Solution caoutchoutée iodée : protection des téguments de l'opéré et des mains de l'opérateur.

**SOCIÉTÉ CENTRALE DES SPÉCIALITÉS
Pharmaceutiques et Hygiéniques**

ALEZARD, Pharmacien

76, rue Réaumur, 76

PARIS

CARBOCHLORYL CAMPHRÉ

(5 %)

Antiseptique puissant, non cytolitique.
Usages en chirurgie : (Plaies âtonnes, infectées, etc.) et en dermatologie : Acnés, Eczémas, Psoriasis, etc.

Parasiticide énergique : (Pédiculase, Phthiriasse, Gale)

Carbochloryl soufré (6 % de S.) : Traitement de la Séborrhée;
Traitement de la Gale écthymateuse.

CARBOCHLORYL LANOLINÉ : Traitement de la Séborrhée sèche.

PARACARBOCHLORYL : Solution caoutchoutée forte. *Collodion ininflammable* (Toucher vaginal, rectal, palpation des chancres ou lésions contagieuses, etc.).

SOCIÉTÉ CENTRALE DES SPÉCIALITÉS
Pharmaceutiques et Hygiéniques

ALEZARD, Pharmacien

76, rue Réaumur, 76

PARIS (2^e)

CARBOLACTYL

Composition :

Ferments lactiques et pancréatiques sélectionnés, algues à mucilage, charbon de peuplier.

Indications :

Auto-Intoxications gastro-Intestinales, entérites, diarrhées, troubles de la nutrition, troubles fonctionnels du foie, dermatose.

Formes :

1° Boîte de 30 cachets ;

2° Poudre avec cuiller mesure (n'existe pas sous forme de comprimés).

Doses :

Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures pro die. — Enfants : 2 à 6 mesures pro die.

Echantillons et Littérature sur demande

19, Rue de Fieurus — PARIS (VI^e)

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de Bismuth par tablette divisée en 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes, elles seront plus rapides en résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge. — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *gastralgie*, *hypersécrétion* ; dans les *fermentations intestinales*, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PEPROUD

7, rue des Archers — LYON

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure
Principe actif du STROPHANTUS GRATUS

Présentation. — 1° SOLUTION hydroalcoolique glycinée, à deux pour mille. **XXV gouttes** = 1 mgr. Ouabaïne. A prendre par gouttes dans un peu d'eau. — 2° AMPOULES (injections intraveineuses) 1/4 mgr. Ouabaïne par cc. (en solution chlorurée isotonique).

Posologie. — Voie buccale : 1 à 3 mgr. par 24 heures (en 3 fois). Exceptionnellement jusqu'à 4 mgr. dans les cas graves. — Voie intraveineuse : 1/4 mgr. par injection.

Indications. — Tous les troubles cardiaques qui relèvent d'une perte de la tonicité (insuffisance cardiaque des hypertendus, des aortiques, etc.).

Solution : le flac., 10 fr. — Ampoules : boîte de 8, 12 fr.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, r. d'Assas, PARIS (6*) (Tél.: Fleur. 31-85)

CARDIOTANIC GRÉMY

Opothérapie cardiaque

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de *muscle cardiaque*.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Asthénie cardiaque, Palpitations, Hypertension artérielle, (voir Eutensyl), Sub-asystolie.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX*)

CARNINE LEFRANCQ

Suc de viande de bœuf crue, concentré à froid, dans le vide, en solution sucro-glycérinée.

Indications. — Reconstituant énergique, prescrit dans : *Anémie, Anorexie, Convalescences, Tuberculose, Affaiblissements, etc.*

Dose et mode d'emploi. — Une à quatre cuillerées à soupe par jour, pure ou additionnée d'une boisson froide ou tiède.

Établissements FUMOUZE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

CASCARA LIQUIDE ALEXANDRE

(Elixir laxatif contre la constipation)

Propriétés therap. — Exaltant modéré du péristaltisme intestinal. Ni drastique, ni cathartique. N'irrite pas et ne donne aucune colique. Elle jouit d'un pouvoir cholagogue considérable et cette action est d'autant plus utile pour combattre la constipation que la bile est un excitant du péristaltisme intestinal. Elle possède aussi l'heureuse propriété de réveiller la contractilité de la fibre musculaire intestinale sans l'exagérer, amenant ainsi une évacuation quasi physiologique des matières. Toutes ces qualités réunies recommandent tout particulièrement la précieuse écorce (écorce sacrée), car, pour nombreux que soient les laxatifs, il n'en est aucun qui, comme la Cascara, présente un ensemble aussi complet de qualités sans aucun des inconvénients des purgatifs ordinaires.

Posologie. — La dose habituelle est de 1 petite cuillerée à café pour les enfants, au dîner et au coucher, et de 1 à 2 cuillerées à café pour les grandes personnes. Dans les constipations rebelles, on peut aller jusqu'à la cuillerée à soupe.

Pharmacie ALEXANDRE

41, rue de Rome — PARIS

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1° 0,12 egr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2° 0,10 egr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 pilules le soir au dîner, après 15 jours espacer les doses.

Prop. Ther. Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit, aux femmes enceintes et aux nourrices.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll - PARIS (17°)

CASCARINE LEPRINCE

$C^{12} H^{16}. O^5$

Indic. thér. — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 Pilules le soir au coucher, ou aux repas si la constipation est d'origine digestive.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16°)

CÉDRYL

Spécifique antigonorrhéique

FORME :

Capsules.

COMPOSITION :

Chaque capsule contient 0 gr. 20 Cédryl $C^{15}H^{20}O$ (alcool sesquiterpénique de l'essence du *Juniperus Virginiana*).

DOSES :

De 12 à 15 capsules par jour.

ACTION THERAPEUTIQUE :

Très puissante sur la blennorrhagie aiguë qu'il jugule rapidement et dont il fait cesser en quelques jours les phénomènes douloureux. Son action est aussi grande et aussi constante sur les infections anciennes (associations microbiennes), dont il assure la guérison définitive, contrôlable par la disparition de la sécrétion matinale et des filaments de l'urine.

ACTION PHYSIOLOGIQUE.

Le Cédryl n'exerce aucune action fâcheuse sur l'estomac, sur l'intestin, sur le rein ou sur le système nerveux. Même pris à hautes doses, il n'entraîne ni troubles digestifs (régurgitations, nausées, diarrhée), ni douleurs lombaires, ni céphalées, ni vertiges. De tous les balsamiques, le Cédryl est donc le plus actif bien que entièrement inoffensif.

*Littérature et échantillons envoyés sur
demande adressée aux*

Laboratoires IMMUNOS

(Fournisseurs des Hôpitaux)

6, r. Edm.-Valentin, NARBONNE (Aude)

CÉRÉALOSE

Farine alimentaire contenant tous les phosphates organiques assimilables du blé, de l'orge et de l'avoine, ainsi que toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Aliment parfait, pour tous les âges (dentition, croissance, formation des os, anémie, convalescence, vieillesse) en raison de ses propriétés digestives et nutritives, de sa teneur en phosphates naturels assimilables et vitamines.

Indications. — Nourriture complémentaire du nourrisson, des mères et de leurs enfants, des femmes enceintes et des nourrices, des malades ou convalescents, de tous ceux qui ont besoin de phosphates et de vitamines.

Emploi. — Sous forme de bouillies au lait, la « Céréalose » est d'une saveur très agréable et très facile à digérer.

Prix de la boîte : 4 fr. 50

Laboratoires P. ASTIER

45, rue du Docteur-Blanche — PARIS

CÉRÉBROIL LEYSIN

Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables. Cornubiline — sels de terres rares traités photolytiquement.

Présentation. — Liqueur et Cachets.

Indications. — Insuffisance cérébrale, dépressions nerveuses, perte de mémoire, de volonté, apathie, irrésolution, phobies, tics, aphasie, asthénie génitale.

Propriétés. — Augmente la faculté d'attention volontaire, l'intensité de la pensée, l'énergie morale, la puissance de travail et la résistance physique. Facilite la rééducation cérébrale. Spécifique réel de la fatigue, du surmenage et des neurasthénies.

Posologie. — Un cachet ou une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas. Si le malade doit prendre du *Nitrogl Leysin*, lui indiquer de prendre le *Cérébroil Leysin* au milieu du repas. Supprimer toutes médications contenant de la strychnine ou de l'arsenic.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

CÉRÉOSSINE

Il est maintenant prouvé que :

Le Métabolisme des sels minéraux dans l'organisme est sous la dépendance de quelques glandes endocrines et que la déminéralisation est due à leur insuffisance.

Pour reminéraliser effectivement et complètement, il faut donc :

1° *Présenter à l'organisme des sels minéraux à « orientation vitale » susceptibles d'être assimilés ;*

2° *Stimuler les glandes à sécrétions internes et suppléer à leur insuffisance momentanée.*

La CÉRÉOSSINE satisfait pleinement à ces principes, elle contient :

a) De la poudre d'os frais, desséchée dans le vide.

Des phosphates extraits des graines de céréales.

Des sels minéraux divers en combinaison organique.

b) De la parathyroïdine et de la thymusine, extraits des glandes fixatrices des sels minéraux (pas de surrénale).

c) De la pancréine totale.

La CÉRÉOSSINE apporte donc :

1° *Un excès de minéraux capables d'être assimilés avec le minimum de déchet ;*

2° *Des extraits endocriniens susceptibles de provoquer la fixation dans l'organisme des sels minéraux apportés par l'alimentation et la médication ;*

3° *De la pancréine totale qui stimule les réactions de défense vis-à-vis de l'infection bacillaire.*

Posologie. — *Adultes : 2 à 3 cachets par jour ; 10 ans : 1 cachet par jour. Au besoin, délayé dans un peu d'eau, de lait ou de confiture.*

Pratiquement, la CÉRÉOSSINE assure une reminéralisation rapide et complète, et peut être employée indéfiniment sans danger, même chez l'enfant (absence de surrénale et d'adrénaline).

Le cachet de CÉRÉOSSINE coûte au malade 0 fr. 20, prix extrêmement modique, qui permet de continuer le traitement minéralisateur aussi longtemps qu'il est nécessaire. (Echantillon.)

Ed. DEHAUSSY

Docteur en Pharmacie — Licencié ès-Sciences

44, rue Inkermann — LILLE

CERVOL

(Bromhydrate double de Quinine et Caféine)

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, analgésique, antinévralgique, bactéricide. (Sans action secondaire ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur l'estomac.)

Composition. — Bi-bromhydrate de Quinine et de Caféine associé par un mode de préparation spécial à l'Acétyphénétidine et à l'Antifébrine.

Forme. — Etui de 12 cachets.

Indications. — Névralgies diverses, grippe, migraines, rhumatismes, douleurs et affections fébriles en général.

Doses. — Adultes : 2 à 4 cachets pro die.

19, Rue de Fleurus — PARIS (6°)
Echantillons et littératures sur demande

CÉTRAROSE GIGON

Composition — Solution d'Acide protocétrarique, $C_{22}H_{22}O_8$ à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse, Etats nauséux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et Doses. — 15 à 20 gouttes en une fois dans un peu d'eau sucre.

Jusqu'à 200 gouttes par 24 heures.

Laboratoires du D^r André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

CHARBON FRAUDIN

Granulé

avec ou sans naphtol.

Absorbe, neutralise et transforme les produits inutiles ou dangereux, tout en sauvegardant l'intégrité de la muqueuse gastro-intestinale, dans tous les cas où il y a douleur, inflammation ou infection de l'estomac ou de l'intestin.

Indications. — Toutes les affections de l'estomac et de l'intestin, Infections, Intoxications, Empoisonnements, etc.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour et plus par voies buccale ou rectale.

Laboratoire FRAUDIN

BOULOGNE (près Paris)

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol. Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable.

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvoi, Embarras et Fermentations intestinales.

Dose. — 1 cuill. à café soit après chaque repas, soit le soir en se couchant ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34, Boulevard de Cléchy. PARIS

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinanine, salicylate de soude et stovaine.

Dépourvue de toute toxicité.

Indic. therap. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Laboratoire A.-P. BROCADET

89, Rue du Commerce — PARIS

Téléph. Ségur 52-47

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Médicament spécifique du système nerveux, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac. — Liquide sucré, de consistance sirupeuse, aromatisé aux écorces d'oranges amères, représentant 0,40 chloral et 0,60 bromure par cuillerée de 20 gr.

1 à 6 cuillerées, à café ou à soupe, selon l'âge, dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Coqueluche, Épilepsie, Insomnies,
Menstruations douloureuses, Névralgies,
Névroses, Psychoses.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

CHENANTHOL

(Essence pure de Chenopode)

THERAPEUTIQUE des HELMINTHIASES

Composition. — Huile essentielle obtenue par distillation des sommités fleuries de *Chenopodium anthelminticum*.

Principe actif : Ascaridol ($C_{15}H_{16}O_2$).

Caractéristiques. — Effet rapide : Spécifique dans l'Ascaridiose et l'Ankylostomiose. Les Oxyures, Trichocéphales sont évacués également.

Pouvoir vermicide comparé :

B. Naphthol	1 gr. 30	élimine	26 0/0	des vers
Eucalyptol + chloroforme	—	—	46 0/0	—
Thymol	2 gr.	—	88 0/0	—
Chenanthol	1 cc. 5	—	96 0/0	—

Le Thymol n'est pleinement actif qu'à fortes doses et dans ces conditions parfois dangereux. Tandis que l'efficacité du Thymol tombe à presque moitié dès qu'on sort des doses élevées, l'efficacité de l'essence de chenopodium reste à peu près constante quand on diminue les doses.

Posologie et Mode d'Emploi. — A la dose complètement inoffensive de 1 cc. 5 pris en trois fois, le Chenanthol ne tue pas le ver, mais l'engourdit et lui fait lâcher prise ; il faut à ce moment le balayer au moyen d'une purge (sulfate de magnésie dont la supériorité a été démontrée).

Les Capsules de Chenanthol sont rigoureusement dosées en volume et non en gouttes.

Régime. — Aucun régime préparatoire. Diète de rigueur pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos comme cure radicale.

Laboratoire L. HINGLAIS

EPERNAY (Marne)

CHLORAMINE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules.

Compos. — Chloramine T 0 gr. 05,
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10,
Enrobage de gluten recouvert d'un
enduit inattaquable par le suc gas-
trique.

Indic. Thér. — Toutes infections de
l'intestin : Dysenteries, Entérites,
Paratyphoïdes, etc.

Posologie. — 2 à 6 pilules par jour au
commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel — PARIS

CHLOROBYL

Composition :

Tochlorine.....	0 gr. 05
Bile purifiée.....	0 gr. 10
Charbon.....	0 gr. 10

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérite, Dysenterie,
Affections cutanées.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés
par jour avant les repas.

Laboratoires Réunis

159, Avenue de Wagram

PARIS (17^e)

CHLORO-CALCION

Forme :

Gouttes.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* chimiquement pur, stabilisé. 40 gouttes = 1 gr. Ca Cl^2 .

Dose :

20 à 40 gouttes matin et soir dans de l'eau sucrée.

Action :

Chloro-Calcion est le *récalcifiant* physiologique type. La solution de Ca Cl^2 , directement assimilable, n'utilise pas l' H Cl du suc gastrique trop souvent déficitaire chez les tuberculeux. Il ménage donc la puissance digestive de l'estomac.

La présence en quantité suffisante de calcium dans le sang est un des facteurs essentiels de la coagulation (Carnot).

Chloro-Calcion apporte au sérum la chaux qui lui manque. C'est l'*Hémostatique de choix*.

Indications :

Récalcifiant. Lymphatisme, Prétuberculose, Croissance, Rachitisme, Carie dentaire, Allaitement, Fractures.

Hémostatique. Toutes hémorragies, hémophilie, maladies du sang, anémies et chlorose.

MICHEL, Pharmacien de 1^{re} Classe
22, Rue des Bernardins — PARIS

CHLOROFORME

LAMBIOTTE Frères

ANESTHÉSIQUE

Forme :

Ampoules de 30 et 50 gr.

La fabrication du chloroforme est des plus complexes et doit fixer d'une façon toute spéciale l'attention du fabricant.

Toutes les observations des Maîtres ont été scrupuleusement observées dans la préparation du *Chloroforme Lambiotte Frères*.

Il est chimiquement pur, dans les meilleures conditions de conservation parce qu'il répond aux quatre conditions suivantes :

- 1^o Un bon procédé de fabrication ;
- 2^o Une rectification par des appareils perfectionnés ;
- 3^o Une purification conforme au Codex ;
- 4^o Un conditionnement irréprochable.

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg, 3

PARIS

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf,
capsules dosées à 0 gr. 20

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules
par jour, deux ou trois à la fin de
chaque repas.

Prop. thér. — Opothérapie biliaire.

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques
Hépatiques, Ictère, Cholémie, Cons-
tipation, Entéro-Colites, Dyspésie,
Auto-Intoxication.

CHOLÉINE CAMUS

13, rue Pavée — PARIS (2^e)

CHOLÉITOIRES BYLA

Suppositoires de glycérine solidifiée
à base d'extrait de bile.

Dose et mode d'emploi :

Un suppositoire en cas de besoin.

Propriétés thérapeutiques :

Exonérant d'action douce et certaine
par excitation du péristaltisme intes-
tinal.

Indications :

Constipation des enfants, des malades
alités (accouchées, opérés). Constipa-
tion chronique.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

CHOLÉOBOLDINE THÉVENOT

Compos. — Pilules (enrobées au gluten) à base d'extrait de boldo et d'extrait de fiel de bœuf purifié et concentré dans le vide.

Propriétés. — Cholagogue très puissant légèrement laxatif, légèrement antiseptique.

Indications. — Rétention biliaire, coliques hépatiques, congestion du foie, insuffisance hépatique. Ce sont là des indications qui découlent immédiatement de la composition de la *Choléoboldine*. En dehors de ces cas, on la prescrit avec succès dans certains cas de constipation opiniâtre, de dermatoses liées à des troubles hépatiques.

Dose. — 2 à 3 pilules à chacun des grands repas.

Produit fabriqué

par la Société des Produits Pharmaceutiques **THEVENOT** - Dijon

PRIX : le flacon de 50 pilules 5 fr.

Echantillons sur demande.

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Régulat. du fonctionnement entéro-hépatique

Composition. — Extrait de Combretum.

Extraits biliaires. Extrait de Boldo..Boldine

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées en font un produit éminemment : Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Antiseptique, Laxatif.

Indications. — Insuffisance hépatique. Cirrhoses, Diabète, Ictères, Cholecystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse.

Dose. — Prescrire 2 à 3 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : le flacon : 8 francs

Laboratoire G. CAILLAUD

25, r. Drouot, PARIS (9^e). — Tél.: Cent. 59-92

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase
Dragées ovoïdes kératinisées dosées
à 0 gr. 25 d'extrait

Doses et mode d'emploi. — 6 à 12 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Prop. Thér. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — Spécifique de l'entérocolite muco-membraneuse.

Laboratoires DÜRET & REMY

5, Avenue des Tillouls — PARIS (18^e)

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoides
Principes définis du foie et de la bile de taureau
dissous dans l'huile végétale.

Société de Thérapeutique (Janvier 1911)

Académie de Médecine (Avril 1911)

Académie des Sciences (Juin 1911)

Forme. — Ampoules injectables de 2 cm³.

Mode d'emploi. — Injections dans la fosse retro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 % de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. 20 à 30 injections avec arrêt de 5 à 10 jours entre chaque dizaine. Léger massage après piqûre.

Prop. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique. — Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires ni équivalents, employée journellement dans les hôpitaux.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source, PARIS (16^e)

Téléph. : Aut. 06.62

CIGARETTES ESPIC

Compos. — A base de belladone, stramoine, jusquiame et phellandrie.

Mode d'emploi. — Allumer une cigarette dès le début d'une crise d'oppression et en aspirer profondément la fumée.

POUDRE ESPIC

Compos. — A base de belladone, stramoine, jusquiame, phellandrie, eucalyptus et sels minéraux.

Mode d'emploi. — En faire un petit cône dans une soucoupe, allumer et aspirer la fumée.

ROUTIER, Pharmacien

20, rue Saint-Lazare — PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

CINOL

Cinnamate de Soude Synthétique
chimiquement pur

Le plus actif, le plus maniable de tous les dérivés cinnamiques. Guérit la Tuberculose sous toutes ses formes par immunisation active spécifique.

Trois méthodes d'application du Cinol :

METHODE INTRAVEINEUSE.

La plus active : permet le traitement et assure la guérison des Tuberculoses fébriles, en évolution ; méthode des doses croissantes ; trois injections par semaine ; débiter par ampoules de *Cinol intraveineux*, 1^{re} série, continuer le traitement par les ampoules de *Cinol intraveineux*, 2^e série.

METHODE INTRAMUSCULAIRE.

S'adresse surtout aux formes de début, latentes, apyrétiques : trois injections par semaine de 1 cm³ de *Cinol intramusculaire*.

METHODE BUCCALE.

S'adresse aux cas d'imprégnation bacillaire tout à fait au début ; agit également comme préventif efficace et comme adjuvant des méthodes intraveineuse et intramusculaire : 4 à 6 pilules de Cinol par jour.

REFERENCES SCIENTIFIQUES.

Académie de médecine, Société médicale des Hôpitaux, Société de thérapeutique, Thèses de Paris, Bordeaux, Montpellier, etc.

Littérature — Echantillons

Laboratoires IMMUNOS

(Fournisseur des Hôpitaux)

6. r. Edm.-Valentin, NARBONNE (Aude)

CITROSODINE GRÉMY

Hypéracidité (douleurs gastriques); Anti-émétique (vomissements des nourrissons); Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).

Action lithotriptique et diurétique.

Action sur la viscosité du sang.

*(Pneumonies — Broncho-pneumonies
Gangrènes séniles.)*

Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 8 comprimés (2 ou 3 fois p. jour.)

Enfants : 3 à 4 comprimés

Pneumonies : 4 comprimés toutes les heures ou 8 comprimés toutes les deux heures dans un demi-verre d'eau, la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2^e ou 3^e jour qui suit la crise.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique

Généralisation
de la méthode Carrel-Dakin

Composition :

Comprimés dosés à 0 gr. 25 de chloramine sodique pure et stable.

Indications :

Gynécologie et toutes infections locales :
angines, abcès, plaies infectées,... et
comme agent prophylactique en
temps d'épidémie : grippe, fièvre
typhoïde...

Posologie :

UN comprimé par verre d'eau : pour
gargarismes, pansements humides des
plaies, lavages dans les affections de
la gorge, du nez, des oreilles...

DEUX comprimés par litre d'eau : pour
lavages de la vessie et dans toutes les
affections de l'appareil génito-uri-
naire de l'homme et de la femme.

Avantages :

Action antiseptique puissante (100 fois
plus actif que le formol), absence de
causticité, innocuité absolue.

Flacon de 60 comprimés : 6 fr.

Tube de poche : 2 fr.

Echantillons médicaux sur demande

Laboratoire

des ANTISEPTIQUES CHLORÉS

40, rue Thiers — LE HAVRE

COCAÏNE MIDY

(Chloroborates)

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.

0,05 cgr. de Chlorate de Potasse.

0,05 cgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Prop. Thér. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx ; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdales, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Détail : 140, Faub. Saint-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17°)

COCCIDAL GRÉMY

Nouvel agent antigonococcique

En tubes d'étain de 3 c. c. pour injections uréthrales. — En ampoules de 10 c. c. pour instillations uréthrales. — En ampoules de 30 c. c. pour lavages de la vessie.

Mode d'emploi. — Injections uréthrales : injecter une seule fois par jour, le contenu d'un tube en étain (l'injection se fait en introduisant directement dans le canal l'extrémité effilée du tube, percée préalablement à l'aide d'une épingle). — Instillations uréthrales : puiser le liquide directement dans l'ampoule, sans le diluer. — Lavages de la vessie : diluer le contenu de l'ampoule dans un litre d'eau distillée.

Prop. thér. — Antigonococcique puissant, non irritant, à action extrêmement rapide.

Indications. — Blennorrhagie aiguë : préventif, abortif, curatif à la période d'état. — Gonococcies ascendantes : remplace avec avantage le nitrate d'argent pour les instillations et les lavages de la vessie.

14, Rue de Clichy — PARIS (9°)

CODOFORME

Compos. — Nouveau sel bromoformique soûlé défini et stable, ce qui permet de le présenter en comprimés dosimétriques. Ceux-ci étant absorbés libèrent lentement dans l'intestin une quantité rigoureusement constante de bromoforme chimiquement pur. Combiné à la codéine avec du benzoate de soude terpiné comme excipient le Codoforme constitue une association synergique qui permet d'obtenir, sans la moindre crainte d'accident, vu les faibles doses utilisées (0 gr. 01 de codéine, 3 gouttes de bromoforme (1 centigramme 5 de poudre de Belladone par comprimé), une action sédative sur les centres tussigènes, avec analgésie de muqueuses de voies respiratoires et fluidification des sécrétions bronchiques.

Avantages. — En plus de la sécurité et la certitude d'acte de ce mode d'emploi original du bromoforme, méconnu trop méconnu parce qu'il ne pouvait être utilisé jusqu'ici qu'en préparations liquides dangereuses irritantes, les comprimés de codoforme sont agréables faciles à prendre et sans effet nauséeux. Ne se dissolvant que dans l'intestin, ils ne provoquent sur l'estomac aucune intolérance, ni fatigue, ni perte d'appétit.

Indications. — Toutes les toux rebelles, spasmodiques coqueluchoïdes. Action tout à fait spéciale sur la toux des tuberculeux dans ses différentes modalités, auxquels il permet repos et sommeil, sans fatigue stomacale. Toux d'habitude, Toux émettante, Toux spasmodique laryngée. Trachéo-bronchite. Toux catarrhale et emphysémateuse, Toux des diabétiques (médicament au sucre).

Doses. — Grands enfants au-dessus de 5 ans : 3 à 5 comprimés par 24 heures. — Adultes : Dose initiale de 4 à 5 comprimés. Dans les toux rebelles et anciennes : 1 comprimé dans la journée, 2 ou 3 dans la nuit.

Ces comprimés étant en dragées lenticulaires seront pris comme une pilule, sans sucer ni croquer, dans une gorgée de liquide ou une injection de lait et autant que possible avant les repas.

Prix du flacon de 30 comprimés 6 fr., impôt compris

Laboratoires du NÉOL

H. BOTTU Directeur

9, Rue Dupuytren — PARIS (6^e)

Téléph. Fleurons 12-12

COLARSÉ

Reconstituant général du système nerveux
et du tissu osseux.

Formes. — Cachets de 0 gr. 60. Granulé soluble.

Composition. — Anhydroxyméthylène, diphosphate de chaux et de magnésie extrait de l'embryon du blé.

Méthylarsinate disodique cinq centigrammes par cuiller à soupe de granulé ou deux centigrammes et demi par cachet.

Vitamines.

Indicat. thérap. — Convalescence des maladies infectieuses, Neurasthénie, Anémie profonde, Chloroanémies tardives, Chloro-anémie tuberculeuse, Prétuberculose, Phosphaturie, Rachitisme, Arthritisme.

Mode d'emploi :

	Cachets	Granulé
De 6 à 12 ans,	2 cach. p. jour	2 cuill. à café p. jour
De 12 à 18 ans,	3 — —	2 — à dessert —
Adultes.....	4 — —	2 — à soupe —

Laboratoire du COLARSÉ

Paul DELAMARRE, Pharmacien de 1^{re} Classe
BEAUGENCY (Loiret)

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintergreen)

Chaque capsule contient :

15 mgr. colchicine pure dissoute dans 0,20 egr. Salicylate de Méthyle naturel. (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalant à 0,25 egr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Prop. Thér. de l'Ess. de Wintergreen

Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2^e Calme la douleur. — 3^e Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire. — 4^e Légèrement diurétique. — 5^e Diaphorétique. — 6^e Diminue la fièvre. — 7^e Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8^e Action antiseptique sur le sang.

de la Colchicine

Diminue la production d'acide urique. — 2^e Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3^e Soulage la douleur. — 4^e Augmente la sécrétion biliaire. — 5^e Légèrement diurétique. — 6^e Diaphorétique. — 7^e Purgatif.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

COLLOÏDES

Les Laboratoires Clin' préparent un certain nombre de corps à l'état colloïdal utilisés en thérapeutique. Les principaux de ces Colloïdes sont : l'Electrargol (argent), l'Electrauroi (or), l'Electroplatinol (platine), l'Electropalladiol (palladium), l'Electrorhodiol (rhodium), l'Electririol (iridium), l'Electr-Hg (mercure), l'Electromartiol (fer), l'Electrocuprol (cuivre), l'Electrosélénium (sélénium), l'Electromanganol (manganèse), le Collothiol (soufre), l'Ioglysol (complexe d'iode-glycogène), l'Arrhénomartiol (complexe de fer colloïdal et d'arsenic organique), etc., etc.

Ces colloïdes sont à grains idéalement fins. Leur titre en métal ou métalloïde est le plus élevé que comporte chaque préparation. Ils sont stériles, stables, de conservation indéfinie, et soigneusement rendus isotoniques.

Les métaux colloïdaux possèdent des propriétés générales qui leur sont communes; leur injection produit une suractivité des échanges nutritifs, une importante réaction phagocytaire, une stimulation des fonctions hématopoïétiques. Ils ont le pouvoir d'exalter les moyens de défense naturels de l'organisme et favorisent la destruction et l'élimination des toxines microbiennes.

Quelques-uns ont en outre des applications particulières: l'Electr-Hg est employé dans les manifestations syphilitiques; l'Electromartiol, dans le syndrome anémique; l'Electrocuprol et l'Electrosélénium dans les tumeurs cancéreuses; le Collothiol dans le rhumatisme et certaines affections des voies respiratoires, etc.

Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

COLLOIL LEYSIN

Symbiose de Composés Polymorphes agissant comme adoucissant, calmant, cicatrisant, Régulateur de la sécrétion chlorhydrique, ramenant constamment à son taux normal la valeur d'H Cl du suc gastrique.

Présentation. — Comprimés, Liqueur, Gouttes.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Ulcus Géant, Ulcère rond, Stricture Spasmodique du Pylore, Hématémèses, Entéro-Colites Muco-Membraneuses, Gastro-succorrhées, Stase alimentaire, Affections gastriques nerveuses.

Propriétés. — Calme immédiatement les douleurs, s'oppose à l'exagération de la sécrétion chlorhydrique, cicatrise les ulcérations. Toxicité nulle.

Pesologie. — Mâcher les Comprimés, un à un, dès que paraissent les douleurs.

20 gouttes de "Liqueur" dans un peu d'eau avant chaque repas.

5 à 6 "Gouttes" deux heures après les repas.

Pour arrêter immédiatement une Hématémèse, faire absorber 30 à 50 gouttes de *Colloil Leysin* "Gouttes" dans un quart de verre d'eau froide. Toujours prescrire en premier lieu les Comprimés ; la Liqueur et les Gouttes n'étant indispensables que dans les cas graves.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Autenil 14-73

COLLO-IODE DUBOIS

(Gouttes et Dragées)

Composition.

Iodhydrates d'acides aminés.

Indications.

Pouvant remplacer l'Iode, les Iodures, les Peptones iodés, etc., sans aucune crainte d'Iodisme. — Les dragées de Collo-Iode théobromo-caféiné sont particulièrement indiquées dans l'asthme, l'emphysème, les maladies du cœur et ses complications (artério-sclérose, insuffisance rénale), les intoxications diverses, etc.

Posologie.

GOUTTES : Maximum utile chez les adultes : 60 gouttes.

DRAGEES théobromo-caféinées : 2 à 4 dragées par jour, suivant l'âge.

Laboratoires DUBOIS

35, Rue Pergolèse. — PARIS (16^e)

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

COLLOIXOLS du D^r RIQUOIR

Colloïxol Antibacillaire n° 1. — (Permanganate de calcium et thiocol fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans la Tuberculose pulmonaire, injecter 1/4 de cc. tous les 5 jours.

Colloïxol Antibacillaire n° 2. — (Permanganate de calcium, thiocol et goménol fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans les Tuberculoses externes, injecter 1 cc. pendant 12 jours, repos 10 jours et reprise.

Colloïxol Antibacillaire n° 3. — (Arrhéol, Benzol à l'alcool fixés sur du bleu de méthylène.)

Dans les Tuberculoses osseuses et génitales, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antiarthritique. — (Salicylate de soude fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans le Rhumatisme, la Goutte, la Sciatique, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antientérique. — (Chlorure de magnésium fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans l'Entérite, la Diarrhée infantile, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antistreptococcique. — (Permanganate de calcium, fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans la Salpingite, la Furunculose, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antistaphylococcique. — (Silicate de soude fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans la Sinusite, la Cystite, la Coqueluche, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antispécifique n° 1. — (Sublimé fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans la Syphilis au début, injecter 1 cc. par jour.

Colloïxol Antispécifique n° 2. — (Arrhéol fixé sur du bleu de méthylène.)

Dans la Syphilis tertiaire, injecter 1 cc. par jour.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 16,50 (impôt compris)

MAISON DES COMPLEXES COLLOIDAUX DU DOCTEUR RIQUOIR

MERMINOD & C^{ie}

49, Rue de Paradis — PARIS (10^e)

COLLUBORINE DUPUY

Traitements des affections de la Cavité
Buccale et des **maladies de la gorge**

Forme. — Collutoire stérilisé et gargarisme aseptique renfermés dans un tube.

Composition. — Borate de soude neutre per-oxygéné-Résorcine et Stovaine-Trichloréthanal.

Avantages. — Préparation de conservation indéfinie. Remplit le double rôle de Collutoire et de Gargarisme. Efficacité constante, toujours aseptique étant à l'abri de l'air, des poussières, de la lumière. *Ne peut pas être contaminé par le pinceau* comme le sont habituellement les Collutoires. Amène en trois jours la chute de la fièvre et la disparition des symptômes douloureux.

Indications. — Stomatites diverses : Erythémateuse, Aphteuse, Muguet, Mercurielle. — Angines aiguës : Catarrhale, Phlegmoneuse, Herpétique, etc. Amygdalites ? Pharyngite chronique, Syphilis bucco pharyngée.

Mode d'emploi. — A. En pressant sur le tube, imprégner de Colluborine le coton fixé à l'extrémité d'un porte tampon et badigeonner la gorge comme avec un Collutoire.

B. En pressant sur le tube, une cuill. à café dissoute dans un verre d'eau chaude donne instantanément un Gargarisme.

Laboratoire de Thérapeutique des Voies Digestives

J. LAUMONIER, Pharmacien-Directeur

225, Rue Saint-Martin — PARIS

COMBRETINE BOCQUILLON

Extrait fluide du Combretum Rambaultii.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus actif des cholagogues connus. La Combretine est au foie ce que la digitale est au cœur, avec cette différence qu'elle n'est aucunement toxique.

Indications. — 1° Dans les infections d'origine hépatique depuis l'entéro-cholite jusqu'à la fièvre jaune. — 2° Dans toutes les maladies où le foie est atteint d'une façon secondaire et dans lesquelles l'excrétion biliaire est ralentie ou arrêtée (typhus, typhoïde, dysenterie, paludisme, entérite) aussi bien que dans les affections organiques du cœur et des reins.

Pocologie. — 20 à 60 gouttes par jour à prendre en trois fois avant les repas.

La COMBRETINE se prépare également en granulés et en pilules.

Laboratoires DELATTRE

10, rue du Bac — PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

COMITOL

(Traitement de l'Épilepsie)

Composition. — Tartrate borico-potassique 0 gr. 50
+ Phényl-Éthyl-Malonylurée : Comprimés D :
0 gr. 03 ; — Comprimés C : 0 gr. 02 ; — Com-
primés B : 0 gr. 01 ; — Comprimés A : Tartrate
pur.

Avantages. — Goût agréable, efficacité absolue.
Tolérance parfaite, sans les inconvénients des
hautes doses du Luminal.

Mode d'emploi et Doses. — Donner alternative-
ment une grande boîte de C (dans les cas
graves D) et une petite boîte de B ou A. 6 Com-
primés par jour, quelle que soit la formule
employée.

DOSIS INFANTILES - 1/3 Comprimé par année d'âge et par jour.

PRIX : Petites boîtes de 60 Comprimés : A, 8 fr.;
B, 9 fr.; C, 12 fr.; D, 14 fr. — Grandes boîtes de
180 Comprimés A, 18 fr.; B, 24 fr.; C, 30 fr.;
D, 32 fr.

Pharmacie GRORICHARD

12, place Labourée — BESANÇON (Doubs).

COMPOSÉ GMET

Extrait total de Kola, Coca, Quinquina
Préparation liquide sans Alcool

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 10 cuill.
à café par jour (dans les cas graves
1 cuill. à café toutes les 2 heures) dans
eau, vin, bière, etc. avant ou entre
les repas.

Prop. Thér. — Toni-stimulant à effet
durable. Ne constipe pas.

Indications. — Anémie, Surmenage,
Grossesses, Convalescences, Grippe,
Neurasthénie, Mélancolie. Septicémie.

Littérature et échantillons sur demande au

Service Médical des Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Tél. Bergère 43.10

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, fluxeurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau entre les doigts.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

COMPRIMÉS " ROCHE "

DE THIOCOL

1 comprimé " Roche " de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol " Roche ".

1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. galacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, tuberculose, coqueluche, rachitisme, dyspepsies, entérites, etc.

Avls très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

Comprimés " Roche " de Thiocol

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS

CONDURANGO GMET

Extrait total de Condurango Gonolobus
Préparation liquide sans Alcool corres-
pondant à 2 gr. de plante par cuill.
à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et Mode d'emploi. — 1 à 4 et
6 cuill. à café par jour dans un peu
d'eau, avant ou entre les repas.

Prop. Thér. — Sédatif viscéral, Tonique
amer.

Indications. — Gastralgies, Ulcères,
Douleurs des cancéreux ou des syphi-
litiques. Douleurs gastriques réflexes.
Littérature et échantillons sur demande au

Service Médical des Produits GMET
27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)
Tél. Bergère 43.10

CORÉINE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction
d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal.

(Procédé Tallandier)

La Coréine n'est pas de l'agar-agar.

La Coréine n'est pas extraite de l'agar-agar.

C'est du mucilage pur.

Propriété unique. — Absorbe et retient 40 à 50 fois
son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple Colite ma-
queuse, Colite muco-membraneuse

La Coréine constitue un traitement remarquable,
souvent le seul, de la constipation et de cer-
taines formes diarrhéiques.

Forme. — Granulé et Paillettes.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale,
A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source. — PARIS (16^e)

Téléphone : Aut. 60-62

COSMARGYRE THÉVENOT

Compos. — Combinaison d'oxyde mercurique avec une matière organique iodée. Le médicament est présenté sous forme de comprimés dénués de saveur métallique et renfermant 0.43 de cosmargyre.

Équivalence thérap. — Le *Cosmargyre* renferme sensiblement 1/6 de son poids d'iodure mercurique (allié à un excès d'iode négligeable au point de vue thérapeutique).

Dosé. — D'après son équivalence en iodure mercurique, chaque comprimé de *cosmargyre* équivalant lui-même à une demi-cuillerée à bouche de sirop de Gibert. Le praticien se basera donc sur cette indication très simple pour prescrire le médicament.

Avantages. — Le mercure est parfaitement dissimulé dans le *Cosmargyre Thévenot*. *L'intolérance gastrique est supprimée*. On peut donc faire bénéficier de la médication spécifique les malades peu tolérants ou bien soumettre à une cure intensive un malade quelconque en ne lui imposant que le minimum d'inconvénients.

Prix du flacon de 60 comprimés 9.50, impôt compris.

Envoi d'échantillons sur demande

Fabrique par la

Société des Produits Pharmaceutiques Thévenot
DIJON

CRATAEGUS BOCQUILLON

Extrait fluide du *Crataegus Oxyacantha*

Propriétés thérapeutiques :

Cardiotonique, hypotenseur, sédatif, antinerveux. Le *Crataegus* est indiqué dans tous les troubles fonctionnels du cœur et dans les maladies organiques de cet organe (Docteur Huchard).

Indications :

Eréthisme cardiaque ; hypertension, troubles nerveux d'origine réflexe. Insomnies, irritabilité ; troubles de la ménopause.

Posologie :

Trente à cinquante gouttes par jour à prendre en deux ou trois fois avant les repas. Suivre le traitement pendant un mois ou six semaines.

Laboratoires DELATTRE

10, rue du Bac — PARIS

CRATÆGUS GMET

Extrait total du *Cratægus oxyacantha*.

Préparation liquide, SANS ALC00L correspondant 2 grammes de plante par cuillerée à café. (Voir Produits Gmet », page 265.)

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau; demi-dose pour les enfants. Suivre le traitement pendant six semaines, au moins.

Prop. thérap. — Cardio-tonique sédatif du sympathique.

Indicat. — Eréthisme cardiaque. Cardialgies. Troubles nerveux ou douloureux, d'origine réflexe. Insomnies. Irritabilité. Émotivité.

Littérature et Échantillons sur demande

Service médical des " **PRODUITS GMET** "

21, rue du Faubourg Montmartre — PARIS (9)
Télep. Bergère 43-10.



CRÉOSAL DUBOIS

(Monogaïacophosphate de Calcium

Sirap, Comprimés, Solution, Granulée, Ampoules

Composition :

Solution	50 centigr.	1 ^e Créosal par cuillerée à bouche.	
Granulé	50 — — —		à café
	(10 centigr. de Créosal sodique)	par
Ampoules	(5 — de Méthylarsinate double)	ampoule
	(de Sodium et de Strychnine)	de
	(5 — Saccharose pur)	1 centilok

Propriétés et Indicat. thérap. — Récalcifiant puissant, antibacillaire, Accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, ossseuse ou cutanée, les bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

Laboratoires LALEUF

49, av. de la Motte-Picquet — PARIS (15^e)

Téléph. : Ségur 65-01

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 %) et de créosote (96 %). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Prop. therap. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous deux formes :

° *Crésoforme-poudre*, présenté en flacons poudreux pour saupoudrage des plaies ;

° *Crésoforme-onguent*, présenté en tubes d'étain : on l'étale sur la plaie ou, s'il s'agit de fistule ou de plaie profonde, on en remplit le trajet ou la cavité.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, rue d'Edimbourg. — PARIS (8^e)

Téléphone Wagram 14-73.

CRISTOLAX

Composition. — Paraffine pure { a a
Extrait de malt sec { =

Eccoprotique doux, d'une action mécanique sur les matières et protectrice sur les muqueuses.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Constipation en général. Tout particulièrement constipation des nourrissons, des enfants, des affaiblis et des personnes âgées. Constipation post-opératoire.

Très agréable au goût, ne crée pas d'accoutumance.

Doses. — Nourrissons : 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants* : 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel que ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose. 1 cuillerée à soupe aux repas principaux.

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Constitution. — La Cryogénine est une semicarbazide dont la formule est la suivante :



Poudre cristalline blanche, inodore, presque insipide, peu soluble dans l'eau (2 p. 100 à 20°), soluble dans la glycérine (5 p. 100) et dans l'alcool (11,50 p. 100).

Propriétés. — La Cryogénine représente le médicament antipyrétique, analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux.

Posologie. — De 0 gr. 50 à 4 gr. pro die chez l'adulte.

Formes. — Poudre; Comprimés; Cachets; Pilules.

En raison de fréquentes substitutions, cause d'échecs ou d'accidents, préférer les formes spécialisées. Comprimés et cachets, dosés à 0 gr. 25 et 0 gr. 25 de cryogénine. Pilules, dosées à 0 gr. 25 de cryogénine.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

CRYPTHERMOL

Cure iodo-hydrargyrique intense dissimulée

Complément de la médication novarschikae

Composition. — ELIXIR anisé agréable : 1 cuillerée à soupe, 1 gr. KI + 0 gr. 01 Hg 1°.

COMPRIMÉS : chacun, 0 gr. 02 (Hg 1°, 2 KI) (glutinisés, pas d'intolérance gastrique).

Posologie. — ELIXIR : 2 cuillerées à soupe par jour à la fin du repas.

COMPRIMÉS : 2 à 4 par jour.

Prescrire en même temps : Nentrobore, poudre dentifrice chlorotée au ratanhia. Préviennent et guérissent gingivites et stomatites hydrarg.

Ed. DEHAUSSY

Docteur en Pharmacie — Licencié ès-Sciences

44, rue Inkermann — LILLE

CUPROCITHINE GRÉMY

Traitement chimiothérapique de la Tuberculose, par le cuivre.

Doses et mode d'emploi :

En frictions : Faire une friction par jour dans les creux de l'aisselle, du jarret, du pli du coude.

Indications :

Tuberculoses viscérales, pulmonaires, *en évolution.*

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

CURIODE

Composition : Combinaison organique d'iode et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Avantages : Entièrement assimilable, plus efficace que les iodures alcalins et jamais aucun phénomène d'intolérance ou d'iodisme. — Elimination régulière.

Propriétés : Le Curiodé est :

- a) *Vaso-Dilatateur* (Artériosclérose, hypertension, etc.)
- b) *Stimulateur des organes lymphoïdes et des sécrèses.* (Adénopathies, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie.)
- c) *Donne de la fluidité au sang et aux sécrétions.* (Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche.)
- d) *Indispensable au traitement de la Syphilis.*

Indications : 1° *Affections cardio-vasculaires.*

(Artériosclérose, Hypertension, Angine de poitrine, Péricardite.)

2° *Affections respiratoires.*

(Asthme, Emphysème, Toux spasmodiques, Coqueluche, Laryngite chronique, Bronchites anciennes.)

3° *Affections des organes lymphoïdes.*

(Adénopathies de la serotule et de la tuberculose, Gourme, Végétations adénoïdes, Goitre, Arthropathie, Hydarthroses.)

4° *Syphilis et toutes ses complications.*

Posologie : Vingt gouttes correspondent à :

1 gramme de KI ou à 0 gr. 04 d'iode métalloïdique.

Doses moyennes : 20 à 40 gouttes par jour, à prendre deux fois (aux repas).

Remarque : Quand les doses atteignent 60 gouttes, il est préférable de commencer par 10 gouttes à chaque repas (20 gouttes par jour) et d'augmenter d'une goutte par repas tous les jours, jusqu'à 30 gouttes par repas.

Repos une semaine par mois.

CURIODE ARSENIÉ

Composition : Combinaison organique d'iode, d'arsenic et d'un dérivé protéique d'origine animale.

Indications : Les mêmes que celles du Curiodé et de l'arsenic. Recommandé chez les enfants et les adultes atteints d'affections pré-tuberculeuses et d'adénopathies simples trachéo-bronchiques.

Posologie : Vingt gouttes correspondent à : 1 gramme de dure de potassium ; 0 gr. 005 d'acide arsénieux ; 0,02 de méthylarsinate de soude (arrhénal) ; 2 cuill. à café de sirop iodotannique.

Doses moyennes : Adultes, 20 à 50 gouttes par jour. Enfants 2 à 3 gouttes par année d'âge.

Mode d'emploi : A prendre en 2 fois pendant les repas. Commencer par des doses faibles et augmenter tous les jours d'une goutte par repas. — Repos une semaine par mois.

TOLÉRANCE ET INNOCUITÉ ABSOLUES

Echantillon gratuit à MM. les Docteurs

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, Avenue Parmentier — PARIS (9^e)

CYANHERMINE

Traitement de fond de la Syphilis

Formule. — Cyanure de Mercure: 0,01. Arséniate de soude: 0,01. Sérum isoton.: 2 cc.

Présentation. — Boîte de 12 ampoules de 2 cc.

Avantages et Propriétés. — Le titre de la solution garantit une tolérance absolue et met à l'abri de toute intoxication. Le Cyanure est le sel de mercure le plus riche et le plus actif. — L'Arséniate de Soude, qui lui est associé, lutte contre l'anémie syphilitique et améliore les terrains débilisés. Éliminé d'une façon parfaite par le filtre rénal, il constitue le traitement de choix des néphrites syphilitiques.

Indications. —

Dose. — 1 ampoule de CYANHERMINE tous les jours ou tous les 2 jours.

La boîte de 12 ampoules : 10 francs

Laboratoire G. CAILLAUD

25, r. Drouot, PARIS (9^e). — Tél.: Cent. 59-92

CYTOTROPINES

Associations lipoido-mono métalliques.

En ampoules : Sn Hg Fe Cu Ag

En pilules : Sn Fe Hg

Indications. — Ressortissant respectivement à chaque métal.

Littérature sur demande

Ampoules, la boîte de 8 : 8 fr. 50

Pilules, l'étui de 60 : 7 francs

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (5^e)

DÉPURATIF KROMELINCK

Essence de salsepareille rouge
composée et concentrée

Indications. — Artério-sclérose et toutes affections de l'appareil circulatoire. Affections du tube digestif productrices de toxines. Obésité.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe (pur ou dilué dans une eau légère), par jour, pendant un mois.

Salsepareille rouge iodurée
du Docteur Kromelinck

Mêmes indications — Même posologie

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol*, le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau à la manière des pomades dans toutes les dermatoses d'origine digestive et dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — Les Plastols peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres : eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impetigo, prurigo, etc.

Laboratoires DUMESNIL

10, Rue du Plâtre — PARIS

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique
à base de bioxyde de manganèse,
de bicarbonate de soude,
dechlorhydro-méthylarsinate de lithine,
d'antipyrine, de nitrate d'urane
et de santoline.

Doses. — 1 cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours; diminuer s'il y a lieu, après analyse du sucre; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
10, Rue Fromentin — PARIS

DIADERMINE

Excipient pour Pommades.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, onctueux, parfaitement homogène, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau, et pénétrant très rapidement à travers l'épiderme.

Indications. — La Diadermine doit être substituée à la vaseline, à l'axonge et à la lanoline, dans la confection des pommades médicamenteuses. Servir pour les massages, touchers, etc. Être recommandée comme crème de toilette, parfaite pour les épidermes les plus délicats.

BONETTI Frères
12, rue Vavin — PARIS (6^e)

DIAL CIBA

Hypnotique anti-nerveux

Comp. — Dial'ylmalonyluré, Hypnotique acuf et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et à dose modérée n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

Indicat. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. Etats démentiels.

Doses. — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit.

Prix : le tube de 12 comp., 3 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique

Composition et Propriétés. — Dial'ylmalonylurée plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédative, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses. Névralgies, lumbago, etc.

Doses. — Dose sédative antipyrétique : 1 à 3 comprimés par 24 heures, par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique : 1/2 à 1 comprimé au maximum.

Prix, le tube de 15 comprimés : 5 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIALYL

Dissolvant urique

Spécialement préparé par le Laboratoire Alph.

Brunot dont il est la propriété exclusive

Indications. — Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant. Diathèse urique : Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Urines rouges, Coliques néphrétiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 7 fr. le flacon

Laboratoire Alph. BRUNOT

16, Rue de Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

DIASCLEROL

Composition. — Association Sedobenzyl ($C^6 H^5 CH^2 SO^2 K$) (antispasmodique, hypotenseur) hydrate de pipérazine et salicylate de lithine en milieu citaté.

Indications. — Diathèse urique, hypertension, artério-sclérose, arthritisme, goutte, gravelle, rhumatisme, coliques hépatiques et néphrétiques, obésité, diabète, eczémas, herpès, névralgies, migraines.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent 3 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, quelques minutes avant les repas.

Le DIASCLEROL n'étant pas toxique, son emploi peut être prolongé.

Prix : 8 fr. 50

Laboratoire de l'OPOCALCIUM

Albert RANSON, docteur en pharmacie

121, avenue Gambetta — PARIS (20*)

Tél.: Roquette 30-31

DIASTÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande
interstitielle du testicule

Pilules. — Gouttes. — Ampoules.

Doses et mode d'emploi. — 5 ou 6 pilules
par jour aux repas. — 30 à 40 gouttes, deux
fois par jour aux repas, dans un peu de
vin rouge. — Une injection intramusculaire
tous les deux ou trois jours.

Prop. thér. — Invigoration générale de
l'organisme.

Indications. — Insuffisance testiculaire,
faiblesse musculaire et nerveuse, neuras-
thénie, troubles de croissance, sénilité
précoce. Lorsqu'aux signes d'insuffisance
testiculaire s'ajoutent ceux du neuro-
arthritisme, il est indiqué d'associer la
Diasténine et la *Thyrénine*.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

DIASTOGÈNE

*Le plus scientifique, le plus actif et le plus agréable
de tous les Réconstituants.*

Résultats IMMEDIATS et DURABLES

Composition. — Kola fraîche stabilisée. Nucléinate de man-
ganèse. Araines.

Modes thérapeutiques et doses :

ELIXIR très agréable : 2 verres à liqueur par jour.

GRANULÉ : 2 ans, 1 cuill. à café; 10 ans, 2 à 4; 15 ans, 5.

COMPRIMÉS : (pour diabétiques) 6 par jour.

Indications. — Toutes les fois qu'un organisme débilité a
besoin d'être énergiquement stimulé, chaque fois qu'il
convient d'augmenter les réactions de défense : États
anémiques et dépressifs. Neurasthénie. Convalescences.
Croissance. Cachexies chroniques. Lymphatisme. Tubercu-
loses. Hypotension, etc.

Stimulant de la Nutrition générale

Anti-toxique — Anti-infectieux — Tonic-cardiaque

Ed. DEHAUSSY, Docteur en Pharmacie.

Licencié ès-Sciences.

44, rue Inkermann — LILLE

DIDIAL CIBA

Hypnotique-analgésique

Comp. et Propr. — Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indications toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabès, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique, calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie dûs à la douleur ; par doses fractionnées, aux repas dans les autres cas.

Prix : le tube de 15 comprimés, 6 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

DIGALÈNE " ROCHE "

Digitale injectable

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

Posologie et Mode d'emploi :

Ampoules, Solution, Comprimés.

1 cc., ou XXX gouttes, ou 2 comprimés
= 0,15 cgr. poudre feuilles de digitale.

Doses très faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. — Enfants : 1 à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives :

Adultes : XXX⁴ à LX gouttes (voies buccale ou rectale); 2 à 4 comprimés (voie buccale); 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore. — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale); 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. (*cas désespérés*).

Prop. Thér. — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indic. Thér. — Chaque fois que le cœur faiblit.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o

21, Place des Vosges — PARIS

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque

Association Digitaline — Ouabaïne

Présentation. — Solution hydroalcoolique glycérolisée, rigoureusement titrée, telle que XV gouttes = 1/10 mgr. digitaline cristallisée 2/10 mgr ouabaïne crist.

Posologie. — A prendre par gouttes dans un peu d'eau. — Doses faibles (pour cures prolongées d'entretien) : X à XV gouttes par jour. — Doses moyennes : XXX gouttes par jour en deux fois (pendant 5 jours). — Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 3 ou 4 jours).

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Le flacon, 10 fr.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

6, r. d'Assas, PARIS (6^e) (Tél.: Fleur. 31-85)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

DIGICARDINE

Composition. — Poudre de feuilles de Digitale stabilisée, associée à la Scille et à la Théobromine.

Forme unique. — Pilules de Digicardine kératinisées. Chaque pilule contient :

Poudre de feuilles de Digitale stabilisée.....	2 centigr.5
Scille	3 centigr.
Théobromine chimiquement pure..	5 centigr.

Posologie. — Celle de la Poudre de feuilles de Digitale.

Dose Asystolique. — 0,50 centigr. à 1 gr. en 4 jours

Dose Hyposystolique. — 0,50 centigr. à 1 gr. en 10 jours.

Dose Eusystolique. — 0,25 centigr. à 0,50 centigr. par mois.

Avantages. — Seule préparation digitalique totale d'une stabilité parfaite, d'une action constante supérieure, réussissant toujours là où les autres préparations digitaliques sont impuissantes.

Grâce à l'action énergique sur l'élimination rénale, azotée de la Scille, et chlorurée de la Théobromine, la *Digicardine* rétablit dans le minimum de temps l'équilibre cardio-rénal.

Par un dosage rigoureux, les pilules de *Digicardine* permettent d'instituer une médication digitalique fractionnée ou massive suivant les nécessités thérapeutiques.

La kératinisation des pilules de *Digicardine* les protège contre l'action modificatrice des suc digestifs et permet la libération de leurs principes actifs uniquement dans l'intestin, évitant ainsi tous les troubles digestifs qu'entraînent souvent les autres préparations digitaliques.

Indications. — Tous les degrés de l'insuffisance cardiaque, partielle ou totale, les insuffisances cardio-rénales ou réno-cardiaques, les rétentions chlorurées ou azotées avec ou sans hypertension, les affections aiguës ou chroniques de l'appareil respiratoire, les maladies infectieuses, les infections cardiaques et rénales, l'éréthisme cardiaque, la cardialgie, les tachycardies et les arythmies.

Littérature et Echantillons :

Laboratoires IMMUNOS(fournisseurs des hôpitaux
6, rue Edmond-Valentin — NARBONNE

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.

Indic. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharm. — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³ = 10 cgr. poudre de feuille.

Prix : le tube de 25 comp., 5 fr. — La boîte de 5 ampoules, 6 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

DIGITALINE CRISTALLISÉE

MIALHE-PETIT

La plus fidèle

de toutes les préparations de digitale.

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0.001 digitaline cristallisée

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.

(Employée dans les hôpitaux depuis 1889.)

Dose. — Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par jour. — Sédatif : 5 à 10 gouttes. — Anti-asthénique jusqu'à 50 gouttes dans les 24 heures.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVE

Prix Orfila — Prix Desportes

Décernés par l'Académie de Médecine de Paris.

La Digitaline Native agit plus sûrement que toutes les autres préparations de Digitale. Elle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Indications. — 1^o Asystolie; 2^o Insuffisance cardiaque; 3^o Troubles du rythme cardiaque.

Formes. — *Granules* au 1/10 et au 1/4 de mill., 1^{er} fl. 6 fr. 25. — *Solution* au 1/1000 le fl. 6 fr. 25. — *Ampoules* au 1/10 et au 1/4 de mill., la boîte 7 fr. 50.

Spécifier sur les ordonnances : Granules, Solutions ou Ampoules **NATIVE**.

Echantillons :

Laboratoire NATIVE

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DIMÉTOL VICARIO

Tartrate de diméthylpipérazine

Synonyme : LYCÉTOL.

Granulé effervescent :

1 mesure = 0,25 cgr. de Dimétol pur.

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 6 mesures par jour dans un verre d'eau, de préférence à jeun ou entre les repas.

Prop. thérap. — Le plus puissant dissolvant de l'acide urique. Son urate est trois fois plus soluble que celui de pipérazine et d'urotropine. Innocuité absolue. Assimilation rapide, sans aucun trouble digestif.

Indications. — Diathèse urique : Goutte. Gravelle. Coliques néphrétiques. Arthritisme. Rhumatisme. Dermatoses.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

DIMOL



Désinfectant intestinal non toxique. **35 fois plus actif que le phénol pur.** (4 pulverettes représentant le pouvoir bactéricide de 9 grammes de phénol pur). Ne se décompose pas dans l'intestin et ne produit aucune irritation.

Indications. — Toutes les maladies bactériennes ayant pour siège l'intestin.

Pour adultes. — En flacons de 40 pulverettes (comprimés friables. **Dose :** de 2 à 4 pulverettes à prendre avec un peu d'eau, sans croquer, après les repas.

Pour enfants. — Sous forme de sirop. **Dose :** de une demié à une cuillerée à café toutes les 3 ou 4 heures, dans de l'eau ou du lait.

Laboratoires Pharmacologiques

Anglo-Français

72, r. des Aubépines, BOIS-COLOMBES (Seine)

DIORADIN

Traitement de la Tuberculose

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé : Terpène et Bromure de Radium en solution huileuse.

Présentation. — Ampoules de 1 cc., 12 amp.

Prop. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.

Indic. — Tuberculose sous toutes ses formes.

Mode d'emploi et doses. — En injections intramusculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire, des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/3, ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes 1 injection tous les 2 jours. On peut recommencer consécutives ; continuer jusqu'à la 40^e, avec commencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : 18 francs

Laboratoire G. CAILLAUD

25, r. Drouot, PARIS (9^e). — Tél.: Cent. 59-92

DIOSÉINE PRUNIER

(Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine).

Mode de Présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0,25 cgr.

Mode d'Action. — La "Dioséine Prunier" diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

G. PRUNIER & C^e (Maison Chassaing)
6, Rue de la Tâcherie — PARIS

DIURÈNE

(Extrait total d'adonis vernalis)

Formes. — Liquide. — Pilules.

Prop. Thér. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Succédané inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Laboratoires CARTERET
15, Rue d'Argenteuil — PARIS

DOLOMA

*Carbone fluo-phosphate Magnésien,
Mangano-Calcique*

Méthode des Professeurs

DUBARD & VOISENET, de Dijon.

Propriétés thérapeutiques. — Antiacide ; Antidyspeptique ; Reconstituant puissant des réserves minérales ; Névrosthénique idéal sous forme injectable, sans aucun toxique. (*Voir fiche CENOPHOS*).

Indications. — Dyspepsies, Entérites chroniques et tous États déminéralisants ; **Cancers et Tuberculoses.**

Doses et Mode d'emploi.

A : Cure antidyspeptique (entre et loin des repas).

Doloma	}	2 à 4 sachets de <i>Poudre</i> .
		ou 3 à 4 cuill. à café de Granulé .

B : Cure reminéralisante (prendre dans la même journée) :

1^{re} à chacun des 2 repas **Cenophos** 1 cuillerée à soupe d'*Elixir* ou 2 cuillerées à café de **Granulé**.

(Voir fiche **Cenophos** fixateur.)

2^{re} entre et loin des repas **Doloma** 1 sachet de *Poudre* ou 1 cuill. à café de **Granulé**.

3^{re} dans la journée **DOLOMA** injectable : Une injection par jour.

10 jours de cure ; puis s'arrêter pendant 10 jours et reprendre.

Poudre : la boîte 9 fr. 50 (impôt compris)

Granulé : 11 fr. 1c flacon (impôt compris)

Ampoules, la boîte de 10 de 2 cc. : 11 fr.

(impôt compris)

Laboratoire d'Etudes Biologiques

29, Place Bossuet — DIJON

Téléphone : 16-42.

Communication à l'Académie de Médecine, avril 1918.

2 Communications à l'Association Française pour l'Etude du Cancer, Juin 1919 - Décembre 1920.

DOZÉOL

Intrait valériane — Extr. Jusquiame
Bornéol bromé

Propriétés thérapeutiques :

Hypnotique, Analgésique, sédatif
nerveux.

Présentation :

Flacon de 40 pilules dragéifiées.

Posologie :

Hypnotique : 1 à 2 pilules par jour ;
Analgésique et sédatif nerveux : 3 à
5 pilules par jour.

Echantillons sur demande

Laboratoires DEGLAUDE

6, Rue d'Assas — PARIS (VI^e)

Tél. : FLEURUS 31-85

**Demandez-nous tous les renseignements
que vous ne trouverez pas dans
cet ouvrage.**

DRAGÉES DU D^r GELINEAU

Composition :

Bromure de potassium associé à l'Arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques :

Epilepsie. Affections nerveuses.

Posologie :

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

à SCEAUX (Seine)

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer)

Propriétés. — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de "Sirop").

Laboratoire MONTAGU

49 Boulevard de Port-Royal — PARIS

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES

« YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée) Nux vomica - Kola - Guarana

Indications et propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la Neurasthénie, de l'Hypochondrie, du surmenage intellectuel, de la dépression physique et cérébrale, amnésie, des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). — Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Laboratoire « YSE »

65, Rue Louis-Blanc — PARIS (x°)

DUODÉNASE CROS

Forme — Agent opothérapique nouveau et énergique, en pilules de 0 gr. 25, à digestion intestinale.

Indications :

1° Affections intestinales : Dyspepsies et insuffisances duodénales ; auto-intoxications et constipation par insuffisance du tractus intestinal ;

2° Affections hépatiques : Insuffisances ; perversions ; lithiases biliaires et constipation par insuffisance biliaire ;

3° Affections générales : Conséquence des troubles digestifs, hépatiques et d'auto-intoxication.

Dose. — De 4 à 8 pilules par jour.

Laboratoires DELATTRE

10, rue du Bac — PARIS

Télép. Fleurus 25-80

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique, Physiologique pur, extrait du porc vivant.

Procédé du Docteur HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie, Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

ADRESSER TOUTES DEMANDES :

Laboratoire de Physiologie du Puits d'Angle
LE PUITTS D'ANGLE, LE CHESNAY (S.-&-O.)

EAU DE SAINT-COLOMBAN BAINS-LES-BAINS (Vosges)

Compos. — Eau alcaline, oligométallique, sodique, silicatée.

Analyse. —

Sulfate de soude	0 gr. 16
Chlorure de sodium	0 gr. 163
Carbonate de chaux	0 gr. 035
Carbonate de soude	0 gr. 013
Brome	0 gr. 0005
Silice	0 gr. 121
Oxyde de fer	0 gr. 062
Arsenic (traces très sensibles)	

0 gr. 4945-

Les eaux minérales de Bains-les-Bains ont été classées au troisième rang des eaux les plus radio-actives connues (Carte et Laborde) leur radio-activité calculée en minutes milligrammes est de 1,76.

Action. — Drainage rénal. Eau hypotonique, provoque l'élimination des déchets organiques et toxiques.

Indications. — Eau de table et de régime pour la cure de diurèse : artério-sclérose, arthritisme.

Particularité. — Eau légère, sans saveur marquée, agréable à boire et d'une limpidité remarquable.

EBANYL

ÉTAIN ELECTROLY — BARDANE

Dose et mode d'emploi :

Deux à trois cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Spécifique des affections Staphylococ-
ciques, Furunculose, Acné, Anthrax,
Orgelets, etc.

Action rapide et certaine.

Echantillons sur demande

A. TRONCIN & J. HUMBERT

96, rue d'Amsterdam — PARIS

ECZÉDA

(ZnO ichtyolosalicylé.)

*Pommade sans corps gras, en tube d'en-
viron 100 gr.; très adhésive, ne coule pas,
ne tache pas.*

Mode d'emploi. — Application matin et soir.

Prop. therap. — Calme instantanément tous
les prurits. Spécifique de toutes les affec-
tions cutanées, qu'elle isole du contact de
l'air.

Indications. — Eczéma, Impétigo, Prurit anal
et vulvaire, Urticaire, etc.

G. BEYTOUT & L. CISTERNE

12, Boulevard Saint-Martin — PARIS

EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de Zn O² traité, sans odeur ni couleur, se prêtant à toutes les formes de pansements.

Propriété. — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

Indications. — En chirurgie, Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, Hygiène.

FORMES. — Poudre, pommade, Pâte, Emplâtre, Crayons, Bougies, Tampols Roche.

Lab. des PEROXYDES MEDICINAUX

12-18, Rue Lamartine — PARIS

ÉLATINE BOUIN

Dérivé du sapin de Norwège (Gemme et Goudron)
Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Doses et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuill. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. — 1 à 2 cuill. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle aux repas, à raison d'une cuill. à dessert par verre de liquide.

Indic. thér. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme); de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Le flacon : 5 fr. 50

Laboratoires FAGARD

44, Rue d'Aguesseau — BOULOGNE-PARIS

ELIXIR DE J. BONJEAN

Remède souverain contre les dérangements des voies digestives.

Ce médicament qui a pour base l'éther, est un remède précieux dans les indigestions, crampes d'estomac, mal de mer, diarrhée, vomissements nerveux, migraines.

Pris au début, il est d'un effet puissant et merveilleux dans les cas de choléra, cholérine grave et choléra des enfants.

DUSSUEL & FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie)

ÉLIXIR DUCRO

Préparation aromatique et sucrée, très agréable au goût, 20° alcool, contenant les principes des écorcés d'oranges amères et 0,10 d'hypophosphite de soude par 15 gr. d'elixir.

Asthénie, Anorexie, Convalescences : Un verre à liqueur ou une cuiller à soupe, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou après le repas.

Pneumonie et maladies infectieuses adynamiques : Une cuiller à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les heures.

Il exerce alors, plus et mieux que la potion de Todd, une action d'épargne très favorable aux malades.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

ÉLIXIR du D^r MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet.
— Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années.
(*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Pharmacie du D^r MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ÉLIXIR SPES

Iodure double d'Arsenic et de Mercure

Préparation moins alcoolique qu'un vin et physiologiquement assimilable au Sirop de Ghert.

Composition de l'Élixir. — Une cuillerée à soupe contient exactement :

I.... 0,008)	(
Hg... 0,005) correspondant à { 0,01 Bichlore Hg	
As... 0,001)	(0,003 Iodure As

Très agréable à prendre

Indications. — Syphilis et Héredo-syphilis. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni erythème, ni diarrhée.

Dosage : Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour, au moment du repas, pur ou dans un peu d'eau.

Faire mesurer gradué accompagnant le flacon

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'Élixir Spes ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure.

Capable de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix v. g. : 80 (impôt compris)

Docteur GUIRAUD Ex-Pharmacien des Hôpitaux

68, Cours d'Aquitaine — BORDEAUX

EMBRYONINE DU D^r BARRÉ

Poudre d'embryons ou germes de blé

ALIMENT-REMEDE IDEAL, d'une richesse exceptionnelle en principes minéraux, vitamines de céréales (facteur A hydrosoluble et facteur B liposoluble) et autres substances minimales.

SPECIFIQUE DU RACHITISME et de toutes les maladies par carence. Indispensable à tous les enfants débilités, soit pure, soit mélangée au quart avec les farines infantiles commerciales pour en compenser la carence en vitamines.

PREVENTIF EFFICACE des complications bacillaires de la grossesse, de l'allaitement, ou des convalescences de maladies aiguës. Diminue le danger de cohabitation avec les tuberculeux, ouverts.

BASE LA PLUS RATIONNELLE du traitement hygiénique-diététique dans toutes les tuberculoses internes et externes, de préférences aux produits carnés souvent mal supportés en raison de leurs toxines. Rend possible la cure à domicile des tuberculeux pauvres, la cure sanatoriale chronique étant définitivement à abandonner pour eux parce qu'elle ne fait que reculer l'issue fatale, d'après le Professeur Léon Bernard (Presse Médicale, 21 nov. 1932. — Double les bons effets du sanatorium, des stations maritimes, climatiques, ou d'altitude, et en maintient les heureux résultats.

DOSE ET MODE D'EMPLOI :

Adultes : 3 fortes cuillerées à café, trois fois par jour.

Enfants : 1 forte cuillerée à café par année d'âge et par jour. Délayer dans boissons chaudes : lait, thé, tilleul, café, etc.

Notice et échantillon franco sur demande

Usine EMBRYONINE BARRE
à Argentan (Orne)

EMPLATRES R. CAVAILLÈS

Caoutchoutés, adhésifs (formules de l'hôpital Saint-Louis). Oxyde de zinc. Rouge de Vidal. Vigo. Huile de Cade. Ichthyol, etc.

Coloplastre pour pansements. Emplâtre caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc, en bobines de 1, 2, 3, 5 %, etc.

Coloplastre perforé.

Gaze-emplâtre. Gaze adhésive, perméable à l'air.

Gaze anadhère. Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies. Simple. Baume du Pérou. Ichthyol. Sapolan.

Laboratoire R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (8^e)

ÉNERGÉTÈNE DE VALÉRIANE BYLA

Suc pur et inaltérable de Valériane fraîche stabilisé et dosé physiologiquement. Contient les éthers du terpinol, du valérol et du bornéol, de l'essence de Valériane ainsi que l'alcaloïde volatil et le glucoside de la plante.

Doses et Mode d'emploi.

1 à 3 cuillerées à café par jour, et de 4 à 6, suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques.

Antispasmodique. Sédatif du système nerveux. Toni-cardiaque.

Indications.

Névroses. Hystérie. Insomnies nerveuses. Neurasthénie. Migraines.

Les Etablissements BYLA

ENDOCRISINES FOURNIER

Extraits opothérapiques totaux préparés
à froid dans le vide
(voir art. *opothérapie*)

Extraits de tous organes sous les formes
cachets et ampoules

Endocrisines (voir ce mot). — Tous
organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse,
glande mammaire, surrénale, foie, rein,
thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

Forme. — 1^{re} *Cachets* à toutes doses (selon
demande médicale).

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde,
0,025 mgr., 0,10 cgr.; ovaire, 0,10 cgr.;
orchitine, 0,20 cgr.; surrénale, 0,10 cgr.;
hypophyse, 0,10 cgr.; foie, 0,50 cgr.; rein,
0,25 cgr.

Prix : La boîte, 8 fr.; 10 fr.; 12 fr.,
selon dosage

Cachets pluri-glandulaires

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme,
arriération.

2^{re} *Ampoules* :

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse.
Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale.
Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage
obstétrical.

Formuler : Endocrisines-glande injectable Fournier.

Prix : 8 fr. 50

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun *Un Centigramme* d'iode en combinaison organique.

Prop. therap. — L'*Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour; *Adultes* : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

ENTEROSEPTYL CLERAMBOURG

Composition :
 Phosphate de : Trinaphtyle P O $\left\{ \begin{array}{l} C^{10} H^7 O \\ C^{10} H^7 O \\ C^{10} H^7 O \end{array} \right.$

Forme. — Comprimés.

Propriétés — Poudre blanche, cristalline, inodore et sans saveur, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, fondant à 108°-110°.

Indic. therap. — Toutes les fois que l'intestin est le siège de fermentations, qu'il s'agisse de *Diarrhée* ou de *Constipation*. Entéro colite muco-membraneuse. Entérites, Colite, Dyspepsie gastro intestinales. — Disparition des divers troubles provoqués par les auto-intoxications : Ictère, Albuminurie hépatique, Eczéma et Dermatoses diverses. — Antiseptique de choix dans les localisations intestinales des diverses *Maladies infectieuses* : Fièvre typhoïde, Affections cholériformes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, à jeun ou 1 heure avant les repas.

Laboratoire CLERAMBOURG-DELONDRE

Fondé en 1898

4, Rue Taché — PARIS (17°)

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

antitypho-colique polyvalent
contre les infections éberthiennes, coli-bacillaires
et paratyphiques.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth, coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants.

Indications. — L'Entérovaccin antitypho-colique Lumière possède à la fois des propriétés immunisantes très actives, capables d'assurer une protection efficace contre les affections typhiques, paratyphiques et colibacillaires. Il agit également très efficacement comme vaccin curatif, en particulier chez les malades atteints de fièvre typhoïde. L'affection évolue alors très rapidement et de façon tout à fait anodine.

Mode d'emploi. — Administrer 4 pilules par jour, loin des repas.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

6, cours de la Liberté — LYON

ENTÉROZONE

(Peroxydine) Voie buccale

Solution hydro-alcoolique (45° d'alcool); d'ozone stable à la température ordinaire (1/10 en vol.) à réaction très acide — Couleur ambrée — Saveur agréable.

Prop. thér. — Oxygène actif à l'état naissant. Double pouvoir : d'une part, Antiseptique intestinal et, partant, Antithermique; d'autre part, Oxydant et Régénérateur des globules du sang.

Indic. thér. — Antisepsie des Voies digestives et des Voies respiratoires. Tous les états infectieux fébriles. Reconstituant. Régénération des globules sanguins.

Posologie et dose. — Adultes : 4 à 6 cuill. à café prises 2 par 2 dans un demi-verre d'eau sucrée, à température ordinaire, une demi-heure avant les repas. — Enfants : 1 à 3 cuill., suivant l'âge dans les mêmes conditions.

H. ROGIER

EPARSENO

Préparation 132 du Docteur Pomaret
Base Amino-Arséno-Phénol stabilisée
en milieu organo-alcalin.

Traitement intensif et simplifié de la
syphilis par injections intramuscu-
laires indolores ; ce traitement met
à l'abri de tous accidents d'ordre
toxique ou hémoclasique.

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (m^e)

EPARSENO INFANTILE

Préparation 132 du Docteur Pomaret
Base amino-arséno-phénol stabilisée
en milieu organo-alcalin.

Traitement de l'hérédo-syphilis

Les ampoules d'Eparseno pour la thé-
rapeutique infantile sont spéciale-
ment dosées à 0 gr. 05 d'Amino-
arséno-phénol par centimètre cube
et stérilisées par la chaleur ; leur
contenu est directement injectable
dans le muscle (région fessière).

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (m^e)

ÉPIDOSINE GRÉMY

Association des stimulines animales et végétales et des substances endocriniennes qui déterminent et règlent la croissance.

Rondelles de pâte de fruits.

Dose et mode d'emploi. — Une demi-rondelle à chaque repas.

Prop. therap. — Régularise et stimule la croissance.

Indications. — Arrêts ou ralentissements de croissance.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

EPOQUALINE

Sédatif et tonique utérin

Formule. — Alcoolatures, anémone, armoise et hamamelis. XX gouttes de chacune par C. à S.

Elixir très agréable au goût et de faible teneur en alcool.

Dysménorrhée, Ménopause, Phénomènes inflammatoires, Utéro annexiels et troubles généraux de la circulation.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe chaque matin à jeun pendant les 15 à 20 jours précédant les époques.

Le flacon : 6 francs

Laboratoire Gustave FRANÇOIS

16, Cours Gambetta — LYON

ERANOL

Iode colloïdal.

Compos. — Iode en suspension aqueuse et à l'état libre.

L'Eranol ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux iodures alcalins, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, etc. Il est formé non d'une nouvelle combinaison iodée mais d'iode à l'état colloïdal, d'iode libre non caustique ni toxique aux doses thérapeutiques.

Prop. thér. — Réunit aux propriétés et aux indications de l'iode celles des colloïdes métalliques.

— L'Eranol est un iode vitalisé présentant l'action empêchante antitoxinique et le pouvoir catalytique et hypothermique de tous les colloïdes chimiques de sa classe. Sa teneur en iode colloïdal est considérable, comparativement aux autres colloïdes (argent, or, etc.). Examiné à l'ultra-microscope les granules colloïdaux d'iode apparaissent très agités et très lumineux sur fond obscur (mouvement brownien très accentué).

Formes et Posologie. — 1° Gouttes en flacons pour l'usage interne (à 15 pour 1000 d'iode colloïdal) ;

2° Ampoules de 1 et de 5 cc. pour injections hypodermiques ou intraveineuses (à 10 pour 1000).

3° Comprimés à 15 milligr. d'iode colloïdal par unité.

4° Liquide en flacon spécial pour l'usage externe, à 15 pour 1000.

Mode d'emploi. — Usage interne : Au moment des repas ou immédiatement après dans un liquide quelconque : eau, vin, etc.

Adultes : 10 à 20 gouttes jusqu'à 30 et plus progressivement, 2 fois par jour ou 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants : 5 à 15 gouttes et plus, 1 ou 2 fois par jour suivant l'âge.

Usage externe. — Appliquer directement ou avec un pinceau ou un pulvérisateur.

Ampoules (Isotoniques et non douloureuses) Une injection hypodermique quotidienne pendant 12 jours et repos de 8 jours ou une tous les deux jours seulement.

Laboratoire RATIÉ

45, Rue de l'Échiquier. — PARIS

ERGOTINE BONJEAN

Extrait hydro-alcoolique d'Ergot de seigle.
Préparé selon la véritable formule
de BONJEAN.

Forme. — 1. Extrait mou.

Flacons de 30 gr. Ne se vendent pas au public.
Tubes de 2 gr.

2. DRAGÉES dosées à 15 centigr. d'ergotine :
Flacons de 30 dragées.

1/2 — de 15 —

3. Solution stérilisée. (XV gouttes représentent 15 centigr. d'ergotine) : Flacons de 30 gr. contenant 3 gr. d'ergotine.

4. Ampoules de 3 cc., pour injections :
Boîtes de 2 ampoules.

Propriétés. — Action constrictive sur les fibres musculaires lisses : Utérus, vaisseaux, tube digestif, muscles de Reissessen.

Indications. — Inertie, hémorragies et fibrome de l'utérus. Retard dans l'expulsion du placenta. Congestion utérine et leucorrhée. Hémorragies diverses (hémoptyxies, hématomèses, hémorroïdes, etc.).

Dose et mode d'emploi. — 0,60 à 1 gr. 20 par 24 heures. Dose maxima : 3 gr.

DRAGEES : 4 par jour (2 avant chaque repas).

Extrait. Prescrire :

POTION

Ergotine BONJEAN.....	1 à 4 gr.
Vin cordial.....	100 gr.
Sirop d'écorc. orang. amères....	20 gr.

SUPPOSITOIRES

Ergotine BONJEAN.....	0 gr. 50
Beurre de Cacao.....	5 gr.

LAVEMENTS

Ergotine BONJEAN.....	2 gr.
Eau.....	100 gr.

LABÉLONYE & C^{ie}

99, Rue d'Aboukir — PARIS

EUCALCIUM

Reminéralisateur mangano-calciqne.

Formule la plus active
de la médication récaleifiante

Forme. — Poudre, de goût agréable.

Composition. — Calcium, manganèse, magnésie phosphate, silicate, fluorure.

Indications. — Débilité, Anémie, Tuberculoses, Grossesse, Allaitement, Rachitisme, Croissance, Scrofulose, Lymphatisme, Convalescence, Consolidation des fractures.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, à la fin des deux principaux repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café, de 5 à 10 ans ; 1/4 de cuillerée à café au-dessous de 5 ans. Une pincée pour les tout petits enfants. Aucune contre-indication.

A. BASTIDE

Pharmacien de 1^{re} Classe.

50, boulevard de Paris — MARSEILLE

EUDYNOL

Médication dynamisante rationnelle

Compos. — Strychnine - Arsenic - Phosphore.

Formes thérap. — *Ampoules isotoniques-isovisqueuses.*

Gouttes (solution titrée stabilisée).

Perlules, solubles dans l'intestin grêle.

L'Eudynol réunit les 3 éléments énergétiques : *Strychnine, Arsenic, Phosphore*, dans des proportions optima, déterminées par son efficacité sur le quotient respiratoire : $\frac{Co^2}{O^2}$

(Lire la Notice.)

Indic. thérap. — Asthénies, Convalescences, Surmenages, Débilité, Anémies, etc.

Dépôt à LYON, 1, rue de la Martinière.

EUMICTINE

Indic. Thér. :

Antigonococcique, diurétique, antiseptique, etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorrhagie, Uréthrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Doses et Mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

EUPHRÉNINE BASTIA

Extrait fluide retiré de *Bartsia Alph.* (Serof. Euph.)

Propriétés. — Puissant Hypotenseur essentiellement végétal, non toxique.

Indications. — Spécifique idéal de l'Arteriosclérose, Athérôme, Angine de poitrine, Vertiges, Poussées congestives, Bouffées de chaleur et Migraines rebelles de la ménopause, Céphalalgies et, en général, toutes les maladies relevant de troubles circulatoires.

C'est un régulateur de la tension artérielle sur lequel on peut compter.

Remplace avantageusement l'Iodure et dans aucun cas son emploi n'est contre-indiqué.

Mode d'emploi. — De 30 à 60 gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau sucrée ou non.

Littérature et Échantillon sur demande.

Laboratoire BASTIA

61, Cours de la Liberté — LYON

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Dose et Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin.

Prop. thérap. — Diurétique, toni-cardiaque et respiratoire.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions, Bronchite chronique, maladies du cœur et des vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropésies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de la Grippe.

EUPNINE VERNADE

13, rue Pavée — PARIS (4^e)

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et Dose :

Comme sédatif : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme Hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/8 ou 1/4 de comprimés.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS

EUTENSYL GRÉMY

Hypertension artérielle

L'Eutensyl associe à l'action hypotensive de la Thyrénine (voir ce mot) l'action tonocardiaque du Cardiotanic (voir ce mot) et l'action éliminatrice du Rénotanic (voir ce mot) et de la scammonée.

Doses et Mode d'emploi. — Deux à quatre pilules par jour, une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, Hypertension artérielle, Obésité avec hypertension, Athéromateux...

14, rue de Clichy — PARIS (9^e)

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indic. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques. Aliment des faibles, des délicats, des épuisés. Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à Bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Etablissements DÉJARDIN

109, Boulevard Haussmann — PARIS (8^e)

FARINE DEXTRINÉE-MALTÉE MILO

préparée par la Société NESTLÉ

Aliment dextriné et malté, sans adjonction de lait et de sucre.

Produit diurétique pour nourrissons, enfants et adultes atteints d'affections gastro-intestinales.

Préparation facile. Simple dilution à l'eau bouillie.

*Brochure et échantillon gratuits
sur demande à la*

Société NESTLÉ

6, Avenue Portalis — PARIS (VIII^e)

FARINE LACTÉE HEUDEBERT

Compos. — La Farine Lactée HEUDEBERT est, à proprement parler, un composé homogène, où les matières grasses, les hydrates de carbone et les albuminoïdes se trouvent intimement associés.

Dose. — A partir de six mois, chez l'enfant normal, la dose moyenne est d'une cuillerée à soupe pour 150 gr. d'eau ou de lait. Dans les cas d'intolérance absolue du lait, elle peut être utilisée, dès les premiers mois, à la dose d'une, puis de deux cuillerées à café par biberon.

Indicat. — A recommander aux enfants, aux mères qui allaitent, aux dyspeptiques affaiblis, aux convalescents et aux vieillards, seule ou additionnée de Nergine.

Ne pas faire, sans absolue nécessité, de la farine lactée, un aliment exclusif; varier l'alimentation avec toute la série des farines de Céréales et de Légumineuses HEUDEBERT.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

FARINE LACTÉE NESTLÉ

à base de lait suisse

Aliment parfait pour enfants, vieillards et convalescents.

Recommandé au moment du sevrage.

Préparation facile. Dilution dans l'eau bouillie selon le mode d'emploi imprimé sur chaque boîte.

Brochure et échantillon gratuits

sur demande à la

Société NESTLÉ

6, Avenue Portalis — PARIS (VIII^e)

FARINE LACTÉE SALVY

Composition. — *Produit français*, préparé en Normandie, le pays du bon lait, et contenant de la farine de céréales, du sucre et du lait.

Dose. — La dose moyenne pour un bébé de neuf mois est d'une cuillerée à soupe par tasse à café d'eau ou de lait.

Propriétés. — Préparé spécialement pour les enfants. Facilement digestible et assimilable, même par les bébés les plus délicats.

Indications. — Alimentation parfaite des enfants pendant et après le sevrage. Également excellent aliment pour les malades, les convalescents et les vieillards.

Particularité. — Renfermée dans des boîtes scellées, mais faciles à ouvrir, la farine lactée SALVY conserve indéfiniment toutes ses qualités.

SALVY & C^{ie}

6, Rue Daubigny — PARIS

FARINES MALTÉES JAMMET

Les *Farines Maltées Jammet* sont préparées avec des grains sélectionnés, moulus et blutés de manière à conserver l'intégralité des phosphates organiques assimilables et des vitamines.

Propriétés. — D'une digestibilité parfaite due aux diastases actives que la germination développe dans les grains, elles sont facilement assimilables, très nutritives et reconstituantes.

N'étant ni dextrinisées, ni torrifiées, ni stérilisées, elles conservent au maximum d'action leur pouvoir diastasique et leurs vitamines.

Leur diversité permet de varier l'alimentation de l'adulte astreint à un régime et d'offrir à l'enfant une alimentation rationnelle et progressive lui procurant tous les éléments nécessaires à son parfait développement.

Nomenclature. — D'après leur composition et leurs propriétés, on peut les classer en quatre catégories :

1° *Farines très légères* (enfants à partir du sixième mois).

Arrow-root, Crème de Sagose, Féculose, Rizine Aristose (à base de blé et d'avoine).

2° *Farines légères* (enfants à partir du onzième mois).

Cérémaltine (*Arrow-root*, blé, maïs, orge), *Cacase, Orgéose, Gramenose* (avoine, blé, maïs, orge), *Bléose*.

3° *Farines plus substantielles* (enfants à partir du quinzième mois).

Avenose, Zéose, Castanose, Bananose, Seiglose.

4° *Farines très riches en matières azotées* (enfants à partir du dix-huitième mois).

Crème de pois, Aricose, Lentilose, Nucléose.

Indications. — Traitement diététique des malades convalescents, vieillards. Alimentation progressive et variée des enfants.

Mode d'emploi. — Elles se préparent au lait, au bouillon de céréales Jammet, de Légumocéréral, s'utilisent en bouillies, potages, purées, crèmes, gâteaux.

Etablissements JAMMET

47, rue de Miromesnil — PARIS (8°)

FARINE de MALT HEUDEBERT

Compos. — La Farine de malt HEUDEBERT, produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

Avantages. — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

Indicat. — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

Mode d'emploi. — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à café de farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

FAVOLYSINE THÉVENOT

Compos. — Liquide à base de xylol iodé et d'huile de vaseline.

Indications. — Traitement des teignes et pelades de la barbe et du cuir chevelu. Phtiriasse pubienne.

Il suffit de badigeonner la lésion (ainsi qu'une zone de 1 centimètre l'environnant) deux fois par jour pendant deux ou trois jours.

Ce liquide n'est pas irritant.

Echantillon sur demande

Prix du flacon : 5 fr. 50, impôt compris

Produit fabriqué par la Société des
Produits Pharmaceutiques THEVENOT
 DIJON

FÉLAMINÉ SANDOZ

Composition : Association fixe et inaltérable de sels biliaires retirés du fiel de bœuf et d'hexaméthylène tétramine.

Forme :

Comprimés à 0 gr. 30.

Propriétés thérapeutiques :

Opothérapie biliaire. Médicament cholagogue, désinfectant des voies biliaires et intestinales, antiseptique interne puissant.

Médicament cholagogue, désinfectant des voies biliaires et intestinales, antiseptique interne puissant.

Indications :

Cholélithiase et cholécystite (préventif et curatif).

Infections intestinales (porteurs de bacilles).

Entérites, constipation chronique.

Contre-indications.

Occlusion chronique du cholédoque. Carcinome.

Posologie :

Trois fois par jour, 1 à 3 comprimés après les repas. Avaler les tablettes sans les mâcher, avec une gorgée d'eau (eau d'Evian, etc.) ou une infusion. Suivre le traitement pendant dix à quinze jours et répéter la cure deux à trois fois par an, suivant les cas.

Produits SANDOZ

BUREAUX : 3 et 5, Rue de Metz, PARIS

DÉPOT GÉNÉR. : 125, r. de Turenne, PARIS

(Usine des Pharmaciens de France)

FELARGENT

(Argent colloïdal à 12,5 0/0 d'argent)

Le FELARGENT associe heureusement l'effet bactéricide de l'argent colloïdal au pouvoir dissolvant et décapant des sels biliaires. Ces derniers étant de bons solvants des lipoides, du mucus et des produits organiques de toutes sortes, le FELARGENT constitue un antiseptique particulièrement recommandable en : OCULISTIQUE, GYNECOLOGIE, Traitement des blennorrhagies.

Non irritant, même en solutions très concentrées, le FELARGENT doit être préféré à tous les composés argentiques jusqu'alors employés.

Présentation. — Boîte de 5 tubes contenant chacun 0 gr. 50 de FELARGENT.
Flacon de 5 grammes.

Laboratoire des Produits USINES DU RHONE

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8*)

FER BRAVAIS

Oxychlorure de Fer liquide
en gouttes concentrées


Prop. thér. — Attaqué par les acides du suc gastrique, passe dans le sang où il s'unit aux albuminoïdes pour former l'hémoglobine naturelle (véhicule de l'oxygène, ce grand nourrieler de tous les tissus).

Dose. — X à XX gouttes (une goutte par année d'âge), à chaque repas, dans de l'eau sucrée.

Indications. — Appauvrissement du sang avec toutes ses conséquences : Anémie, chlorose, débilité, etc.

Prix : 9 fr. le grand flacon (1 mois environ).

6 fr. le 1/2 flacon (15 jours environ).

Comte René de GRAUWE 

Pharmacien de 1^{re} Classe

16, Rue de Roeroy — PARIS

FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
combiné à des phosphates alcalins.

Prop. théor. — Hyperglobulise et minéralise.
Tolérance absolue par le tube digestif.
Action rapide et non constipante.

Indications. — Celles des ferrugineux et des phosphates : Anémies diverses, Prétuberculose, Chlorose, Anémie des jeunes enfants, Grossesse, Allaitement, Convalescence.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux - Cacodylate Ferrique

Indic. thérap. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc... Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques.

Doses et Mode d'emploi. — *Ferrocodile* :
Pilules à 0.025 : 4 par jour aux repas.

Ferricodile: Ampoules à 0.01. Une injection par jour pendant huit jours repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour. — PARIS (16^e)

FERROCOL

Alginoïde de fer

Composition. — Complexe colloïdal de fer et d'acide alginoïde extrait de certaines variétés d'algues laminaires des grands fonds marins.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 05 d'alginoïde de fer et 0 gr. 10 de Phosphates organo-calciques d'origine marine.

Propriétés therap. — Supérieur à tous les ferrugineux connus grâce à sa parfaite assimilation même par les estomacs les plus faibles.

Le *Ferrocol* est le seul médicament ferrugineux qui ne constipe pas ; il maintient l'intestin à parfait équilibre fonctionnel. Il ne noircit pas les dents.

Indications. — Toutes les formes d'Anémie, la Chlorose, suite de Paludisme, etc.

Doses. — *Adultes* : Quatre comprimés dans la journée. *Enfants* : De un à quatre comprimés selon l'âge.

Pas de troubles gastro-intestinaux, aucune contre-indication.

Laboratoires du **FERROCOL**
58, rue Taitbout — PARIS

FERROMALT

Extrait de Malt pur et Fer Colloïdal (0,1 0/0)

Contient les éléments nutritifs et reconstituants de l'extrait de malt (maltose, dextrine, phosphates, diastase et vitamines solubles), associés au Fer colloïdal, lequel est entièrement assimilé grâce à ses particules ténues et à son absorption lente et uniforme.

Indications. — Rachitisme, Croissance, Anémies simples, Anémies secondaires du Paludisme et de la Furonculose, Convalescence.

Dose. — Une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans de l'eau, trois fois par jour après les repas, suivant l'âge.

En flacons contenant 250 gr.

Le *Ferromalt* ne cause ni constipation, ni troubles de la digestion.

LABORATOIRES PHARMACOLOGIQUES

Anglo-Français

72, rue des Aubépines — BOIS-COLOMBES (S)

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal

Comp. et Prop. — Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, la *Ferrophytine* est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Indic. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofuleuse, Croissance défectueuse.

Médicament toujours bien toléré. (3 cachets, 2 cuillères granulés).

Doses. — Adultes : 1 gr. 50 par jour. Enfants : 0 gr. 25 à 1 gr. par jour.

Prix : La boîte de 30 cachets : 5 fr. 50

— Le flacon de granulés : 7 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

FIXINE GRÉMY

Entérites glaireuses et muco-membraneuses; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause

l'AUTO-INTOXICATION intestinale, principalement dans les maladies de la peau :

Eczémas, Furunculose, Acnés, Urticaires, Herpès, etc.

Granulé dosé à 1 gr. d'alumine lactique par cuillère à café.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café après le repas du matin, de midi et du soir. — Avaler les grains de Fixine avec une gorgée d'eau, sans les croquer.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

FLUORIDIA

Solution glycérinée de fluorure d'ammonium, parfaitement titrée, à prendre par gouttes.

Dose initiale. — 10 gouttes, quatre fois par jour, dans un peu d'eau.

Ampoules de 1 cc., pour injections hypodermiques et intraveineuses

Indications :

Tuberculose pulmonaire au début, bronchite asthmatique, tuberculose ostéo-articulaire, dyspepsie gastro-intestinale, gastro-entérite chronique, coqueluche.

GROS :

Laboratoire du FLUORIDIA

50, Rue de Lille, 50

à TOURCOING (Nord)

FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons.

Comp. et Prop. — Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal). Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

Indicat. — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition, scrofule et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Prix : 4 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, ^{Ph^{ies}}

1, Place Morand — LYON

FOSFOXYL CARRON

Nouvelle médication phosphorée

Emulsion stable d'un colloïde chimique le Phospho térébenthate sodique. $C^{10} H^{15} PhO^2 Na^2$, dans lequel la molécule de Phosphore se trouve à l'état d'extrême division en suspension dans une molécule organique (térébenthine) (état colloïdal). Réaction légèrement alcaline.

Formes. — 1° *Liqueur opaline* sans sucre, ni alcool, douée d'une odeur balsamique et menthée, d'un goût résineux et menthé, légèrement amer.

2° *Sirop opalin anisé* d'un goût très agréable.

Dosage. — Une cuillerée à dessert de chacune de ces préparations équivant à un centigramme de phosphure.

Propriétés. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale. Excitant et tonique du système nerveux central, excitant de l'assimilation et de l'appétit. Producteur d'énergie physique et mentale.

Indications. — Algies. Asthénies : Mélancolies. Adynamie, Impuissance, Épuisement nerveux, Neurasthénie. Maladies de la nutrition : Phosphaturie, Diabète, Tuberculose.

Posologie. — Dose moyenne, deux cuillerées à dessert, soit 20 centimètres cubes par jour, dans 4 ou 5 fois le volume d'eau, sucrée ou non avant les repas.

Prescrire soit *Fosfoxyl Carron*
soit *Sirop de Fosfoxyl Carron*.
afin d'éviter la substitution.

Laboratoires du FOSFOXYL
CARRON, ancien Ph^{1er} -Chimiste de la Marine
40, rue Milton — PARIS

FRANGOLÉINE AUCLAIR

Huile de Paraffine pure et franguline.

Constipation chronique. — Laxatif mécanique : action lubrifiante et péristaltique. Effet certain et régulier.

Une cuillerée à soupe le matin, au petit déjeuner. — Enfants : demi-dose.

Laboratoires F. AUCLAIR

Docteur de l'Université (Sciences).

Pharmacien de la Faculté de Paris.

AIGURANDE (Indre)

FRANGULOSE FLACH

Traitement efficace de la Constipation.

Forme. — Comprimés à avaler.

Composition. — Principes actifs totaux du Rhamnus Frangula (Bourdaine)

Indic. Thér. — Constipation, quelle qu'en soit la cause. — Sans contre indication.

Mode d'emploi. — Au repas du soir.

Dose. — 1 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires FLACH

6, Rue de la Cossonnerie — PARIS

FREINIX

Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

Propriétés therap. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume et Asthme des Foins. Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et Doses. — Une injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le Freinix peut également être employé en pulvérisations nasales dans l'asthme des foins, en particulier.

Établissements Albert BUISSON
157, rue de Sèvres — PARIS (15^e)

FRÈNE GMET

Extrait total du "Fraxinus Exelsior"

Préparation liquide, sans Alcool, correspondant à 2 gr. de plante par cuill. à café.

(Voir *Produits Gmet*, page 265.)

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 cuill. à café par jour à prendre dans un peu d'eau (la dose peut être portée à 8 ou 10 cuill.).

Prop. thér. — Diurétique, fébrifuge, laxatif, antirhumatismal.

Indications. — Rhumatisme, Goutte, Douleurs articulaires et musculaires.

Littérature et échantillons sur demande au Service Médical des

Produits GMET

25, Boulevard Montmartre — PARIS (9^e)

FRIALINE GRÉMY

Phénylformiate de benzyle et benzéneméthane.

Suppositoires.

Mode d'emploi. — 1 à 3 suppositoires par jour, à mettre dans l'anus au moment des crises douloureuses.

Prop. therap. — Calmant, non narcotique, non toxique.

Indications. — Règles douloureuses et coliques utérines de toute nature.

14, rue de Clichy — PARIS (9^e).

FUCOSINE

Traitement de la constipation chronique

Compos. — Agar-agar, extrait de Rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue. Véritable aliment du constipé; innocuité absolue.

Formes. — Paillettes (1 gr. par cuill. à café).
Poudre (1 gr. par mesure).
Cachets (1 gr. par cachet).

Posologie. — 1 à 3 grammes à chaque repas régulièrement.

Indication. — Constipation habituelle quelle qu'en soit l'origine.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, Rue Auguste-Comte — LYON

FUCUS GMET

Extrait total du "Fucus Vésiculosus"
Préparation liquide sans Alcool
(Iode naturel)

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées.

À prendre à jeun et entre les repas
dans un verre d'eau.

Propriétés therap. — Dépuratif, Anti-
strumeux.

Indications. — Obésité, Goîtres et toutes
les indications de l'iode.

Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Téléphone : Bergère 43-10

GAÏASYL

ANTISEPSIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Le GAÏASYL est une émulsion résineuse de Gaïacol
synthétique.

Composition. — Gaïacol cristallisé, Résines naturelles de
Syrax, Tolu, Benjoin, Panama, Eau de laurier-cerise,
Benzate de soude.

Aucun stupéfiant, aucun produit toxique.

Indications. — Toutes les affections des voies respira-
toires : Coryza, Laryngite, Amygdalite, Rhume, Bron-
chite, Emphysème, Asthme, Grippe, Pneumonie,
Tuberculose.

Propriétés thérapeutiques. — Le Gaïasyl facilite et
régularise les phénomènes respiratoires, juggle la toux
et empêche les vomissements, calme et redonne
confiance au malade.

Posologie. — *Adultes* : 6 cuillerées à soupe par 24 heures
Enfants au-dessous de 6 ans : 6 cuillerées à café
par 24 heures.

Laboratoire du GAÏASYL

27, Rue Saint-Hippolyte — PARIS

GALYL

Spécifique de la Syphilis

Indications :

Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du sommeil.

Formes :

Ampoules p^r injections intraveineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

Posologie :

Débuter avec 0 gr. 15 et passer progressivement à 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, suivant les malades.

Laboratoire du GALYL

12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

GARDENAL

Produit appartenant à la même famille chimique que le Véronal dont il se distingue par la présence d'un groupe phényl. Poudre blanche, insipide, très peu soluble dans l'eau.

Indications. — Hypnotique et sédatif de premier ordre, efficace dans tous les états d'excitation du système nerveux, trouve sa principale indication dans le traitement de l'*Épilepsie*. Action immédiate et des plus nettes sur les crises et les vertiges. Relèvement rapide de l'état psychique.

Mode d'emploi, Posologie. — Délivré habituellement sous forme de comprimés dosés à 0,10. Chez l'adulte : un à quatre comprimés répartis dans les 24 heures. Régler les doses chez l'enfant selon l'âge, le poids et la tolérance. Surveiller attentivement les effets. Le traitement peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire. Éviter la suppression brusque du médicament.

Littérature sur demande.

Etablissements POULENC Frères

GASTROCALCINE

Forme. — Granulé.

Composition :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
Carbonate de magnésie....	0 gr. 20
Bi-carbonate de soude....	0 gr. 20
Sucre anisé, q. s. pour...	5 gr.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, immédiatement après les principaux repas, ainsi qu'au moment des crises.

Indications. — Dyspepsies, Dilatations de l'estomac, Hyperchlorhydrie, Pyrosis.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17. rue Cadet — PARIS

GASTRO-SODINE

Deux Formules — Deux Prescriptions

1 ^{re} Bicarb. de soude...	2	} chimiquement purs et desséchés.
Phosph. de soude..	1	
Sulfate de soude...	1/2	

Prescrire " GASTRO-SODINE "

2 ^e Sulfate de soude ...	2	} chimiquement purs et desséchés.
Phosph. de soude...	1	
Bicarb. de soude...	1/2	

Prescrire " GASTRO-SODINE ", Formule 2

Forme unique. — Granulé soluble.

Dose. — 1 cuillerée à café, tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude.

Indications. — Tous les états Gastro-Intestinaux et Hépatiques.

ODINOT, Pharmacien

21, rue Violet — PARIS

GAUROL

Nouveau sel de chaux, en combinaison organique, soluble, colloïdal, injectable, indolore.

Forme. — Ampoules de 1 cc. Comprimés solubles seulement dans l'intestin.

Prop. therap. — Récalcifiant intensif, par Auto-fixation dans les tissus, du phosphate tricalcique naissant et colloïdal.

Indic. therap. — Tous les états pathologiques médicaux et chirurgicaux, où l'amaigrissement et la déminéralisation très marquée demandent à être rapidement jugulés.

Mode d'emploi. — Une ampoule par jour, en injections sous-cutanées.

Suspendre le traitement pendant dix jours, après chaque série de douze injections.

Un à trois comprimés par jour, suivant l'âge.

Laboratoires PÉPIN & LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine)

GÉLOBARINE

(Sulfate de Baryum crémeux $\text{SO}_4 \text{Ba.}$)

Produit destiné aux usages radiologiques.

S'emploie de la même manière que les sels de bismuth. Toutefois pour tenir compte de la différence d'opacité des corps, il convient d'augmenter du 1/3 la dose de *Gélobarine*.

L'absence absolue de toxicité de ce produit permet de l'employer en toute sécurité, soit par la méthode haute (repas ou bouillie), soit par la méthode basse (lavement).

Littérature sur demande.

Établissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

GÉLOGASTRINE

GRANULÉ de gélose, gélatine et Kaolin purifié. Réalisation facile de la thérapeutique par le *pansement gastrique*.

Dose et mode d'emploi :

Une cuillerée à soupe une demi-heure avant les repas, le matin au lever et le soir au coucher.

Hyperchlorhydrie, Ulcère de l'estomac.

Laboratoires LICARDY

38, Boulev. Bourdon — PARIS-NEUILLY

GÉLOTANIN

Nature. — Tannate de gélatine. Poudre blanche inodore, insipide, insoluble dans l'estomac soluble dans l'intestin, en libérant progressivement du tanin et de la gélatine au cours de son cheminement.

Préparation. — Elle a fait l'objet d'une communication de M. Choay à la Société de Pharmacie de Paris (Séance du 6 juin 1917).

Prop. thérap. — Réunit les avantages des deux composants sans provoquer d'intolérance. (Professeur Marfan).

Indications. — D'une façon générale, dans tous les cas de diarrhées.

Posologie. — 1° *Nourrissons et jeunes enfants* : Prescrire : Paquets de *Gélotanin*, une boîte. De 3 à 6 paquets de 0 gr. 25 par jour, à répartir dans le lait ou dans aliments habituels. 2° *Adultes* : Prescrire *Cachets de Gélotanin*, une boîte. De 4 à 8 cachets de 0 gr. 50 par jour, à prendre aux repas.

Laboratoire CHOAY

44, Avenue du Maine — PARIS

Téléph. Fleurus 13-07

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme et de Bergénite
Non toxique — Goût agréable

Indications. — Spécifique contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, broncho-pneumonie. Grippe pulmonaires, etc., etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc. dans un peu de lait ou simplement dans de l'est sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé et 0 gr. 30 de Bergénite.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois 10 gouttes ; de 1 à 3 ans, 8 fois 10 gouttes ; de 3 à 12 ans, 8 fois de 15 à 20 gouttes : au-dessus, 8 fois de 25 à 30 gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

Nota. — Le médecin peut prescrire sans inconvénient, la *Germose*, à des doses plus élevées ; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux heures par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre indication

Laboratoire MOREAU

7. rue d'Hauteville, PARIS

GLOBULES FUMOUE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac, et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant tous les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 25 par globule.

Globules Fumouze KI, à 0 gr. 10 par globule.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Établissements FUMOUE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

GLOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisées, digestion intestinale.

Compos. — Extraits orchitique, prostatique et de moëlle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Laboratoires MONAL & Cie

20, rue de Vienne — PARIS

GLUTINETTES d'HÉMOGLOBINE

Composition. — *Hémoglobine* : 15 cc. + *Acide Nucléinique* : 1 cc. dans un *Enrobage de Gluten*.

Avantages. — L'Hémoglobine est protégée de l'altération du suc gastrique par l'enrobage de gluten qui lui assure en outre une longue conservation.

L'Association d'acide nucléinique intensifie et complète l'action de l'Hémoglobine.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage, Convalescence, Tuberculose, Faiblesse, Allaitement.

Posologie. — *Adultes* : 6 glutinettes par jour ; deux avant chacun des repas.

Enfants : 1/2 dose d'adulte.

Laboratoires VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à 0,50 de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants; des mères pendant la période de l'allaitement; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (10^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,25 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure,

Ampoules injections dosées à 0,10 centigr. par ampoule 1 c.c.

Doses et Mode d'emploi. — Granulé ou comprimés : 1 gr. par jour en 2 fois dans un peu d'eau ; ampoules : 1 à 2 c. c. ou 3 fois par semaine.

Prop. Thér. — Réminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

GLYCOBYL

Lavement à Base de Bile, amenant instantanément une selle.

Indications. — Constipation habituelle. Paresse et obstruction de l'intestin.

Dose et mode d'emploi. — Le *Glycobylyl* s'emploie en lavements à la dose de une ou deux cuillerées à soupe dans 150 grammes d'eau tiède pour adultes.

Une ou deux cuillerées à dessert dans 50 grammes d'eau pour les enfants.

Effet rapide et sans douleur

Laboratoire BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

GLYCOCARPINE

Elément actif. — Nitrate de pilocarpine associé, à la dose de 2 mgr. par pilule, à de faibles quantités d'extraits végétaux (*hamamelis virginica* et *cimicifuga racemosa*).

Indications. — Ce médicament est d'une fidélité et d'une rapidité d'action remarquables, lorsqu'il est employé suivant ses véritables indications :

CONGESTION CÉPHALIQUE : prédisposition à l'apoplexie, congestion rétinienne et labyrinthique.

VERTIGE DES ARTERIO-SCLEREUX.

HYPERTENSION ARTERIELLE et ses conséquences.

TROUBLES CONGESTIFS de la MENO-PAUSE et de la PUBERTÉ.

FLUIDIFICATION des EXSUDATS : diphtérie, pleurésie sèche.

Mode d'emploi. — Adultes : Deux pilules AU DEBUT des trois repas.

Laboratoires DALIN

1, rue de la Martinière — LYON

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action Thér. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

GLYKOLAINE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuill. à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy

PARIS

GOBÉROL

Toilette journalière, Gynécologie, Obstétrique
Injection alcaline type, Oxygénée et isotonique
et analgésique.

Présentat. — Poudre et comprimés, *chaq. compr. pèse 5 gr*
temp. — Oxygène-Borate de soude mentholé pur. (Perborate de soude, Biborate de soude, Menthol).

Prop. — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38-40° en donnant une solution d'H⁺ O⁻ faible, mais à l'état saillant, alcaline et isotonique.

Avantages — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l'H⁺ O⁻ sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité, état saillant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Rubin évalue de 1 à 5.

Indic. — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique : Toilette journalière, Gynécologie, Leucorrhée, Vaginite, Vaginite, Prurit, etc.

Posologie — Solution normale : une cuillerée à café ou un comprimé (pour un litre d'eau chaude à 38-40°). — Solution forte : deux cuillerées à café ou deux comprimés (pour un litre d'eau chaude à 38-40°).

A. CHARMAISON

Pharmacien de 1^{re} Classe de l'Université de Paris
35, Avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND

GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée de *Melaleuca viridiflora*.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — Préconisé à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'uréthrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche ; en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons ; en pansements vaginaux dans les métrites. — L'OLÉO-GOMENOL à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme d'OLÉO-GOMENOL, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose, infections généralisées) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire) ; en instillations intravésicales (cystites).

Laboratoire du GOMÉNOL

17, Rue Ambroise-Thomas — PARIS (9^e)

GONACRINE

Chlorhydrate de Diamino-Méthyl-acridine

Matière colorante douée de remarquables propriétés comme antiseptique urinaire.

D'après Stowell, le Chlorhydrate de diamino-méthyl-acridine posséderait à l'égard du gonocoque un pouvoir bactéricide 600 fois supérieur à celui du Protargol : cette action persiste en présence de l'urine surtout si celle-ci est alcaline.

Toxicité pratiquement nulle aux doses couramment utilisées : solutions à 1/1000 pour injections, 1/4000 pour grands lavages, 2 à 3 fois par jour.

Littérature sur demande.

Etablissements **POULENC Frères**

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

GOUTTES FLUXINES

IX gouttes =

0,01 centigr. d'infusé de marron d'Inde.

IV gouttes d'alcoolat. concentré d'anémone.

IV gouttes de teinture de noix vomique.

en combinaison inaltérable.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Dix gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

J. BONTHOUX

pharmacien de 1^{re} classe

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône)

GOUTTES LIVONIENNES

DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron, créosote, baume de tolu.

Composition. — Chaque petite capsule renferme :

Créosote pure de bois de hêtre..... 0 gr. 65

Goudron purifié de Norvège..... 0 gr. 075

Baume de tolu..... 0 gr. 075

Indications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antiseptisme des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote.
Médicament préventif et curatif.

Dose et Mode d'emploi. — 4 à 8 Gouttes Livoniennes de Trouette-Perret par jour au milieu des repas.

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Établissements TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels, 15

PARIS (11^e)

GOUTTES DE LOLOTSÉ ISBERG

(Principe actif du marron d'Inde)

Forme. — Gouttes préparées avec le principe actif du marron d'Inde et avec sa molécule organique.

Indic. thér. — Varices, Hémorroïdes, Varicocèles, Phlébites, Congestions, Hémorragies, Hémoptysies.

Propriétés. — Aucune contre indication. Dans le cas de constipation, l'intestin se remet à fonctionner d'une façon normale. Vaso-constricteur périphérique du système veineux tout entier.

Mode d'emploi. — 10 à 15 gouttes à chaque repas. Pour les crises hémorroïdaires : 40 à 50 gouttes par jour, pendant 2 à 3 jours.

Echantillons sur demande

Laboratoires I. BERGER

90, Avenue du Bac

LA VARENNE SAINT-HILAIRE (Seine)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

GOUTTES NICAN

(sans sucre)

Composition. — Bromoforme et codéine purs, Aconit, belladone, drosera, grindelia, benzoate de soude, eau de laurier-cerise.
(4 gouttes \equiv 1 gr. de Bromoforme stabilisé
tes \equiv 1 gr. de Bromoforme stabilisé).

Caractéristiques. — Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite. Pas de contre-indications.

Incompatibilité. — Tabac, dont l'usage retarde la guérison.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif, décongestif, antispasmodique très puissant et fidèle.

Posologie. — A absorber loin des repas, dans de l'eau, du grog ou du lait tièdes qu'on agitera en y ajoutant les gouttes.

*** Toux des tuberculeux.** — (Calme et repos immédiats).

Grippe. — Toux spasmodique, asthme, rhume des foins, etc. (Succès immédiat, jugulation complète en quelques jours, souvent en quelques heures).

Doses initiales. — Adultes, 240 gouttes.

Enfants, 24 gouttes par année.

A prendre en 4 fois dans les 24 heures.

Diminuer progressivement après effet.

2° Coqueluche. — (Amélioration immédiate, jugulation complète en moins de 15 jours).

Doses initiales. — Adultes, 120 gouttes.

Enfants, 12 gouttes par année.

A prendre en 4 fois, après une quinte. Augmenter progressivement tous les jours de 1 goutte par année, jusqu'à effet. (La dose initiale devra ainsi être doublée le 12^e jour au plus tard.)

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si c'est nécessaire.

Se méfier des contrefaçons

Echantillons et Littérature

Laboratoires CANTIN

PALaiseau (S.-et-O.) France

GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gailacol,
au goudron pur, à la codéine

Forme. — En capsules gélatineuses légères et très digestes. *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Propriétés. — Antisepsie des voies respiratoires par l'essence de sève de pin.

Calmant idéal de la toux par la Codéine.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites à toutes les périodes, catarrhes, emphysème, tuberculose chronique.

Dose. — 6 à 8 capsules par jour, dont 3 à 4 avant chaque repas.

Laboratoire du D^r H. PHILIPPE

14, Rue du Palais-Grillet — LYON

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré de galbules de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso constricteur et tonique puissant du système veineux. — Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles et des troubles de la ménopause.

Dose moyenne. — 30 gouttes avant chacun des deux principaux repas.

LETTRY

69, Rue de Sèvres — PARIS

GRAINS LAXATIFS

CHATEL-GUYON-MIRATON

Laxatif actif aux sels naturels de la Source Miraton Châtel Guyon alliés au meilleurs laxatifs végétaux.

Action. — Rétablit les sécrétions normales du foie. — Réveille l'appétit en facilitant la digestion. Tonifie et aseptise l'intestin.

Emploi. — 1 à 2 grains dans une gorgée d'eau en se couchant. Effet certain, régulier au réveil, sans aucune irritation.

Echantillon gratuit sur demande aux

Etablissements

MIRATON CHATEL GUYON

Dépôt à PARIS, 13, boulevard Saint-Germain

GRAINS DE SANTÉ

du Docteur FRANCK

(Véritables.)

ALOËS — GOMME-GUTTE — FIEL DE BŒUF

Dose et mode d'emploi :

Un ou deux grains le soir, au commencement du repas.

Propriétés thérapeutiques :

Laxatif; cholagogue.

Indications thérapeutiques :

Constipation. Affections du foie. Atonie intestinale. — Aucune contre-indication.

A. TRONCIN & J. HUMBERT

96, rue d'Amsterdam — PARIS

GRAINS DE VALS

Podophyllin 0,015

Cascara et Bourdaine (extr.) aa 0,025

Dose et Mode d'emploi :

1 à 2 le soir au repas.

Prop. Thér. :

Laxatif, régulateur de l'intestin, ne donnant pas de coliques.

Indications :

Constipation, embarras gastrique.

Pas de contre-indications.

Laboratoires H. NOGUÉS

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6^e)

GRANULÉ GIRARD

iodotannique - glycérophosphaté

Prop. thérap. — Tonique, reconstituant et anti-déminéralisateur.

Indications. — Lymphatisme, Engorgements ganglionnaires, Scrofule, Tuberculose au 1^{er} degré, Convalescences.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou délayé dans du lait chaud.

Prix : le flacon 6 francs.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS

GUI GMET

Extrait total du „Viscum Album ”
Préparation liquide sans Alcool correspondant
à 2 gr. de plante par cuillerée à café.

Doses et Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café par jour. — *Enfants* : 1/2 dose.
À prendre par cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane, en dehors des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotenseur remarquable, Astringent hémostatique. Nervin.

Indications. — Artério-sclérose, Hémoptysies, Angine de poitrine, Anévrismes et tous les cas d'hypertension artérielle.

Littérature et échantillon sur demande au
Service Médical des

Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Téléphone : Bergère 43-10

GUIPSINE

Principes utiles du Gui

Indic. Thér. :

Régulateur du travail du cœur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause, Néphro-sclérose.

Doses et Mode d'emploi :

Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

GYNÉOSE

Composition. — Comprimés à base d'*Oxygène naissant*, de *Trioxyméthylène* et d'*Essence de Thym*.

Indications. — Gynécologie (Métrite, Leucorrhées, etc...). Soins intimes. Lavage dans les pansements, les prurits, etc...

Posologie. — Faire dissoudre un comprimé dans deux litres d'eau chaude.

Avantages. — Action antiseptique et prophylactique puissante, sans causticité.

Laboratoires BERGER

14. rue des Pyramides — PARIS

GYNOPAUSINE

Composition. — Association pluriglandulaire (thyroïde, hypophyse, ovarine) à un nouveau sel de benzyle : le *Sedobenzyle* ($C^6 H^5 CH_2 SO^3 K$) antispasmodique, sédatif et hypotenseur.

Indications. — Insuffisance ovarienne, ménopause, aménorrhée, dysmenorrhée, métrorragies, coliques salpingiennes ou utérines, métrites, dystrophies, goitre exophtalmique, insuffisance thyroïdienne, troubles de la circulation veineuse, chlorose et anémie de la puberté.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cachets par jour.

Prix : 8 fr. 80

Laboratoire de l'OPOCALCIUM

Albert RANSON, docteur en pharmacie
121, avenue Gambetta — PARIS (20^e)

Tél.: Roquette 80-31

GYNERGÈNE SANDOZ

COMPOSITION :

Ergotamine C33 H35 N5 O5, principal alcaloïde actif isolé de l'ergot de seigle.

Produit pur, cristallisé, exactement dosable.

FORME :

Ampoules : 1 centimètre cube de solution contenant 0 gr. 0005 de tartrate d'ergotamine pour injection sous-cutanée intramusculaire ou intra-utérine.

Solution : 0,1 % pour usage interne.

Comprimés : A 0 gr. 001 de tartrate d'ergotamine.

PROPRIÉTÉ THÉRAPEUTIQUES :

Le Gynergène Sandoz possède au plus haut degré toutes les propriétés de l'ergot de seigle. Effets constants.

INDICATIONS :

Obstétrique : Atonie utérine, hémorragies post-partum, endométrite puerpérale, opération césarienne,

— Gynécologie : Troubles menstruels, métrorragies, hémorragies de la ménopause, hémorragies du myome, après le curetage.

Médecine interne : Les mêmes indications que l'ergot de seigle.

POSOLOGIE :

$\frac{1}{2}$, 1 à 2 ampoules ; 15 à 30 gouttes ou 1 à 2 comprimés trois fois par jour.

Produits SANDOZ

BUREAUX : 3 et 5, Rue de Metz, PARIS

DÉPOT GÉNÉR. : 125, r. de Turenne, PARIS

(Usine des Pharmaciens de France)

HAMAMÉLINE ROYA

Préparation d'*Hamamelis* obtenue directement de la plante fraîche, contient à l'état concentré (0 gr. 20 par cuillerée à soupe), le principe actif, aromatique de la plante, « l'Essence », à l'exclusion de la matière extractive, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique et durable. Tonique des fibres lisses. Sédatif vasculaire puissant. Anticongestif.

Indications. — Toutes dilatations, congestions et inflammations veineuses, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites, Congestions, Fibromes, Métrorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Accidents congestifs de la ménopause.

Doses. — Deux à quatre cuillerées à soupe par jour, demi-heure avant de manger.

Echantillons gratuits aux médecins.

Pharmacie ALEXANDRE

41, Rue de Rome — PARIS

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'Iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis virginica*.

Indications. — Maladies du système vasculaire, Varices, Hémorroïdes, troubles de la Ménopause.

1° Gouttes concentrées renfermant 0 gr. 4 d'Iode métal. pour L gouttes d'extrait représentant son propre poids de plante.

De XXX à XL gouttes par 24 heures.

2° Elixir (Préparation très agréable au goût)
Deux à trois cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

HAMAMÉLIS GMET

Extrait total de l'Hamamélis Virginica

Préparation liquide SANS ALCOOL correspondant à 2 gr. de plante par cuillerée à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau. Action certaine.

Cas graves doubler la dose.

Prop. thér. — Vaso constricteur, décongestif.

Indications. — Tous les troubles d'origine congestive ou dûs à une dilatation veineuse anormale
Varices, Hémorroïdes, Formation, Ménopause
Tumeurs abdominales, Migraines, Vertiges
Bourdonnements, Rougeurs du nez et du visage

Efficacité remarquable.

La plus active des Préparations Pharmaceutiques

PRODUITS GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Téléph. : Bergère 43-10

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B,
Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes*. — 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours ou 40 gouttes par jour pendant les 4 premiers jours; ensuite 60 à 80 gouttes pendant 15 jours.

Enfants. — Moitié doses.

Laboratoire de l'HECTARGYRE

12, Rue du Chemin-Vert 4

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude

Indicat. — Syphilis, Paludisme, Fièvre
des Foies, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B,
Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes* : 15 ampoules pour
une cure ou 2 pilules par jour pendant
15 jours ou 60 gouttes par jour les 4
premiers jours, ensuite 80 gouttes
pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Laboratoire de l'HECTINE

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HÉLITAL

Médication dynamisante et régénératrice

Composition :

Arrhénal.	{ chimiquement pur
Nucléinate disodique	
Excipient spécial	

Forme. — Dragées d'un goût exquis.

Propriétés. — Reconstituant énergétique. Régulateur physiologique normal de la cellule organique.

Action. — Sûre et rapide et facilement réglable, grâce à une posologie nettement déterminée, qui donne immédiatement : *Appétit, Force, Poids.*

Indications. — Anémie, Convalescence, Dépression, Surmenage, Toutes fatigues, Neurasthénie, Tuberculose.

Doses. — de 2 à 6 dragées par jour aux adultes.
de 1 à 3 dragées par jour aux enfants.

Laboratoire de l'HÉLITAL

Directeur : L. SIMON, Docteur en Pharmacie

15-17, place Nationale — DIEPPE (S.-Inf.)

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale
phosphorée-strychnique

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Prop. thér. — Lymphatisme, Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux

Eugène PETIT

Pharmacien de 1^{re} Classe

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

ARGENTEUIL (Seine)

HÉMODUCTYL

PILULES à base d'Hamamelis, de Cupressus, de Maïson d'Inde, de Gui et d'Aubépine associés au Boldo et Condurango.

Dose et mode d'emploi :

Deux pilules matin, midi et soir avant les repas.

Indications :

Troubles circulatoires chez la femme (Ménopause, Dysménorrhée)
Varices et Hémorroïdes.

Hypertension et Artério-Sclérose,

Laboratoires LICARDY

38, Boulev. Bourdon — PARIS-NEUILLY

HÉMOFIXINE BRANCHU

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Nuclémate de manganèse, Lécithine de l'œuf, Oxyhémoglobine, Méthylarsinate de soude, Quassine, Zymases.

Propriétés therap. — Reconstituant. Régénérateur des globules sanguins et des éléments protoplasmiques.

Indications. — Etats anémiques, Chlorose, Convalescences, Surmenage intellectuel et physique, Neurasthénie, Phosphaturie, Diabète, Bacillose.

Posologie :

Adolescents	{	1 comprimé à midi	{	au
		1 — le soir		milieu
Adultes	{	2 comprimés à midi	{	des
		2 — le soir		repas.

Pendant 20 jours par mois. Se reposer 10 jours avant de reprendre le traitement.

Laboratoires BRANCHU

4, rue Beaurepaire — PARIS (10^e)

HEMOGLOBINE DALLOZ

Oxyhémoglobine, granulée à froid
sur sucre.

Indications. — Anémie essentielle et symptomatique. Chlorose. Convalescences, etc.

(Administration sans aucune répugnance.)

Dose. — 2 à 3 cuillerées à café aux repas.

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (10^e)

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

Opothérapie Hématique

Nature. — Hémoglobine vraie et essentiellement vivante parce que préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique, conservant sa valeur opothérapique et oxydasiqne, grâce à son incorporation, à l'état naissant, à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où sa vitalité persiste.

Action et Indications. — Les résultats hématopoïétiques considérables que donne le sirop de Deschiens dans les anémies, la chlorose, la débilité, la tuberculose, le paludisme, les convalescences, les suites obstétricales, etc., s'expliquent par la triple action de ce médicament qui agit à la fois : opothérapiquement, puis par les oxydases du sang et les vitamines qu'il renferme, enfin par le fer vital qu'il contient, non en quantité infinitésimale, mais à doses comparables à celles indiquées dans les formulaires pour les ferrugineux usuels.

Posologie. — Préparation prescrite par plus de 30.000 médecins du monde entier, admise dans les Hôpitaux de Paris, contient environ 2 gr. 50 d'hémoglobine naissante et vivante par cuillerée à soupe, soit 1 centigramme de fer vitalisé.

1 cuillerée à soupe à chaque repas, doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

Littérature — Echantillons

DESCHIENS, Docteur en-pharmacie
9, rue Paul-Baudry — PARIS (8^e)

HÉMOSTYL du D^r ROUSSEL

Agent d'hématopoïèse

(Voir en outre page suivante 183)

Sérum hémopolétique frais de cheval, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hémétique.

Action. — 1^o Hématopolétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906); 2^o Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperleucocytaire général et local.

Formes pharm. — 1^o Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur; 2^o Boîte de 45 comprimés de Sang hémopoïétique total desséché; 3^o Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hémopolétique total liquide. 4^o Ovules.

Prix en France : 9 fr. 75

Indications et posologie dans les Anémies. — Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature : Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

Mode d'emploi. — Un ou deux flacons-ampoules de 10 cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou 6 à 8 comprimés, ou 2 à 3 cuillerées à potage de Sirop.

Littérature et Echantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

21, Rue d'Aumale — PARIS

(Téléphone : Trudaine 66-41)

HÉMOSTYL du D^r ROUSSEL

Agent d'hémostase

(Voir en outre page 182)

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

Action :

Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoïétique.

Formes pharmaceutiques :

- 1^o Boîtes de six flacons-ampoules.
- 2^o Boîte de quarante-cinq comprimés.
- 3^o Flacon de sirop. 4^o Ovules : usage gynécologique.

Prix en France : 9 fr. 75

Le sérum liquide (flac.-ampoules), seul, est hémostatique.

Indications :

Syndrômes toxi-hémorragiques, hémophilie. Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

Posologie dans les hémorragies :

Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphtérique). Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois flac.-ampoules. Utiliser, en outre, si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.).

Littérature et Echantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

21, Rue d'Amale — PARIS

(Téléphone : Trudaine 66-41)

HÉMOTONINE

Complexe : Fer et Strychnine en combinaison avec l'Arsenic et le Phosphore organiques.

Forme. — Ampoules de 1 cc. pour injections hypodermiques.

Propriétés. — Reconstituant et stimulant organique et sanguin complet indolore.

Indications. — Etats anémiques : Asthénie, Débilisation organique, Neurasthénie, Anémie palustre, etc.

Mode d'emploi. — Une ampoule par jour, par séries de 12 à 24 injections hypodermiques.

Etablissements Albert BUISSON

157, rue de Sèvres — PARIS

HÉPATO-BYL

Opothérapie entérique, hépatique et biliaire
en ovo des glutinisés

Dose. — 4 à 8 ovo des par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas (avec un demi-verre d'eau destiné à faire pression sur le pylore et à entraîner le tout dans l'intestin) ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Médication sans similaires ni équivalents.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source — PARIS (16^e). — Tél. Aut. 0662

HÉPATOTANIC GRÉMY

Opothérapie hépatique

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de parenchyme hépatique.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Remplace l'huile de foie de morue, cirrhoses alcooliques, syphilitiques, ictères infectieux, diabète par anhépatie, goutte, tuberculose.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylénététramine; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'eurotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites. Prostatites. Gonococcies. Bacteriuries. Pyélites. Pyélonéphrites. Colibacilloses, etc. Phosphaturies. Urines ammoniacales. Caliques hépatiques et néphrétiques. Cholécystites. Diathèse urique. — Échantillons. Littérature.

Dépôt Paris : Pharmacie P. LOISEAU

7, rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET, ABLON (Seine-et-Oise).

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid
Provenant du cheval vigoureux et reposé
Supérieur au suc musculaire des bovidés

Par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer ;

Par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Tænia.

Assimilation parfaite

Aucun inconvénient digestif

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales.
Tout état d'affaiblissement et de Consommation. Maladies de l'estomac et des intestins.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, chemin de Combe-Blanche — LYON

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc...

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes* : Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.
Enfants : Moitié doses.

Laboratoire de l'HISTOGÉNOL

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

HOLOS

Opothérapie osseuse

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moëlle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Réminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Dosage. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne).

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne chargé d'absorber les ferments et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment par réaction lente en Oxygène-Naissant.

la présence de ce dernier assure : la désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Formes. — Estomac : comprimés, cachets, granulés. — Intestin : pilules kératinisées, gélucapsules, prise-bébé.

Laborat. des Peroxydes médicaux

19-18, rue Lamartine — PARIS

HORMOLAXINE

Opothérapie intestinale.

Composition. — Rééducateur physiologique de l'intestin, à base d'*HORMONES CŒCALES*.

Indications. — L'*Hormolaxine* est le remède spécifique de la CONSTIPATION et de l'insuffisance d'évacuation intestinale, dont la cause est un fonctionnement défectueux du cœcum « *Spasme du cœcum, atonie du cœcum, inflammation chronique du cœcum, Typhlite, Pérityphlite, Appendicite chronique.* »

Propriétés. — Régulateur de la fonction intestinale à laquelle il rend son énergie naturelle.

Doses et Mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café avant le repas du soir, dans un demi-verre d'eau froide.

DARRASSE Frères

13, rue Pavée — PARIS

HUILAXINE "GILLOT"

Composition. — Huile de Paraffine bi-rectifiée, absolument sans goût et sans odeur. Viscosité maxima.

Indications. — Constipation opiniâtre, Appendicite, Colites, Hémorroïdes.

Propriétés. — Lubrifiant de l'intestin. Action mécanique.

Dose. — 1 cuill. à bouche le matin, avant le petit déjeuner; 1 cuill. le soir en se couchant.

Laboratoire GILLOT

59, Rue de Châteaudun — PARIS

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 30, 45 et 60 grammes.

GIVAUDAN-LAVIROTTE

56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

HUILES DURET

Huile grise au guaiacoloid :

Mercure purifié.....	0,10
Guaiacoloid	0,20
Palmitine Q. S. pour 1 cc.	
1 cc. = 0 gr. 10 d'Hg.	

Huile au calomel au guaiacoloid :

Calomel à la vapeur... ..	0,05
(exempt de sublimé.)	
Guaiacoloid	0,20
Palmitine Q. S. pour 1 cc.	
1 cc. = 0 gr. 0,05 de calomel.	

Impriétés. — Supérieures aux produits similaires par réorption certaine.

Effet sûr. — Indolence. — Homogénéité. — Stérilité.

Indications. — *Huile grise :* Traitement de fond de la syphilis
Huile calomel : Le roi des mercuriaux. Traitement abortif et traitement curatif des manifestations cutanées ou nerveuses de la syphilis.

Laboratoires DELATTRE

10, rue du Bac - PARIS

Téléph. Fleurus 25-80.

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 % cc³. (Codex 1908.)

Se servir de préférence de la Seringue spéciale du Dr Barthélemy, à 15 divisions; chaque division correspond exactement à un centigr. de mercure métallique.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube

Pour éviter les accidents buccaux chez les syphilitiques prescrire le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Injectons mercurielles solubles,
hypertoniques indolores
intra-musculaires de VIGIER

AMPOULES AU BENZOATE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

Solution aqueuse saccharosée à 0 gr 01.
et à 0 gr. 02 de Benzoate d'Hg par cent. cube

AMPOULES AU BI-IODURE DE MERCURE INDOLORES VIGIER

Solution aqueuse saccharosée à 0 gr.01.
et à 0 gr. 02 d'iodure d'Hg par cent. cube

HUILE AU BI-IODURE DE MERCURE VIGIER

à 1 % stérilisée, inodore.

SUPPOSITOIRES D'HUILE GRISE VIGIER à 1, 2, 3, 4 cgr. de Hg

Pharmacie CHARLARD-VIGIER et
HUERRE, Docteur ès-sciences

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

HUILE RICHE

Huile de Foie de Morue de RICHE,
garantie faite avec des **FOIES FRAIS**
sans mauvais goût ni odeur désagréable.

Cette huile de foie de morue, qui provient des **Pêcheries de Terre-Neuve**, est préparée au jour le jour à l'aide de « **FOIES FRAIS** » n'ayant subi aucune altération; ceux-ci recueillis chaque jour auprès des morutiers, sont traités le jour même; d'où l'obtention d'une huile peu teintée et à peu près insipide.

Produit d'une composition constante, d'efficacité certaine et depuis longtemps éprouvé.

Indications. — Anémies, Bronchites, Lymphatisme, maladies infectieuses, Tuberculose.

Forme. — Litres, demi-litres et quart de litres.

Laboratoires du Topique Bertrand

BLANCHARD & PHILIPPE

OULLINS (Rhône).

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique

Composition. — Perborate de Soude, Borate de Soude, Bicarbonate de Soude, Chlorure de Sodium, essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'Oxygène naissant. Donne une solution isotonique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire, pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 Sachets : 6 francs

Laboratoire G. CAILLAUD

25, rue Drouot — PARIS

Téléphone : Central 59-92

HYPERGAL GRÉMY

Traitement de l'hypogalactorrhée

Doses et mode d'emploi :

Prendre de quatre à cinq pilules
par jour en dehors des repas.

Indications :

Retard de la montée laiteuse.
Insuffisance de la sécrétion lactée.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

HYPNEURAL COS

C 19 H 23 O 4 Az 4 Na

Veronalate Sodé d'antipyrine

Découvert en 1915 par H. Labbé

Forme. — Cachets et comprimés. Boîtes de 10.
Demi-boîtes de 10.

Propriétés. — Analgésique pris dans un liquide
froid. — Hypnotique pris dans un liquide chaud
(tisane, etc.).

Indications. — Insomnie essentielle ou due à
douleur. Douleurs rhumatismales (lumbago,
sciatique, névralgies diverses). Surtout douleurs
entraînant l'insomnie. L'Hypneural Cos permet
de doser l'action analgésique et de la graduer
au besoin jusqu'au sommeil.

Doses et mode d'emploi. — 2 cachets ou comprimés 3 fois
par jour. Dans les insomnies graves, aiguës, jusqu'à 6 cachets
ou comprimés le 1^{er} soir (2 à 5 heures, 2 à 8 h., et si nécessaire
2 à 11 h., par exemple); puis doses décroissantes jusqu'à
1 seul le soir suivants. Dans l'insomnie habituelle, épileptique,
doses décroissantes jusqu'à obtention de l'effet
désiré. Pas de toxicité à craindre. Pas d'accoutumance.

LABÉLONYE & C^{ie}

99, rue d'Aboukir — PARIS

HYPODERMOZONE

(Peroxydine injectable)

Ampoules de 2 cc. d'ozone stable à la température ordinaire. (*Voir fiche Entérozone*) pour usage hypodermique.

Prop. thér. — Bactéricide puissant. Antiseptique intestinal. Antithermique. Oxydant et régénérateur des globules sanguins. Cicatrisation rapide des plaies rebelles.

Fosologie et dose. — Doit être employée dans les cas graves à raison d'une injection de 2 cc. chaque matin. Il est bon de faire boire en même temps au malade de l'*Entérozone* pour compléter le traitement.

H. ROGIER

9, rue de la Terrasse — PARIS (17^e)

HYPOPHOSPHITES CHURCHILL

Sels de phosphore complètement assimilables, parce que non oxydés.

Sirops et Ampoules (Voir la fiche Ampoules Churchill).

Sirop Churchill. — Sirop d'hypophosphite de chaux 0 gr. 20 par dose, dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Siro Churchill. — Sirop d'hypophosphite de soude : 0 gr. 20 par dose, mêmes indications mais en cas d'hypertension artérielle et d'âge avancé.

Si Churchill. — Sirop d'hypophosphite de fer 0 gr. 10 par dose, dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée.

Sirop Churchill — Sirop d'hypophosphite composé dans la proportion des bases minérales de l'organisme avec méthylarsinate de strychnine : 1 mgr. par dose. Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Et tous autres sels : Manganèse, potasse, magnésie, ammoniac, etc.

Us pour adultes — Une à deux cuillerées à soupe dans un peu d'eau après les deux principaux repas.

Le flacon..... 8 francs

(Prix réglementé)

Sur la signature Churchill et la marque de fabrique de la

Pharmacie SWANN

13, Rue Castiglione -- PARIS

IMMUNIZOLS GRÉMY

Vaccins microbiens curatifs
atoxiques

A l'heure actuelle, on ne discute plus la vaccinothérapie : c'est une méthode thérapeutique rationnelle et qui a fait ses preuves. Mais, pour obtenir des vaccins vraiment efficaces, les plus grands soins doivent être apportés à leur préparation : choix et entretien des souches vaccinales, culture, récolte, stérilisation, contrôle, toutes ces opérations nécessitent une vaste installation créée *ad hoc*. C'est ce que nous avons réalisé dans nos Laboratoires qui occupent tout un immeuble (à Courbevoie, 9, rue de Metz), uniquement consacré à la fabrication des *Immunizols* et installé avec tous les perfectionnements désirables.

Un certain nombre d'*Immunizols* sont destinés à l'usage hypodermique seul, d'autres sont à double mode d'administration : voie sous-cutanée et voie buccale.

Les vaccins destinés à l'usage hypodermique sont délivrés de telle manière que la dose initiale soit de 1/2 c. c. (on ne doit jamais dépasser cette dose à la première injection) et la dose maxima de 2 c. c.

Les *Immunizols* destinés à l'absorption buccale sont présentés sous forme de comprimés, que l'on prend à la dose journalière de 8 à 10 comprimés, ce fractionnement assurant une bonne tolérance du vaccin.

Toutes les fois que l'on emploie un *Immunizol* à double mode d'administration (voie sous-cutanée et voie buccale), on peut avoir recours à un traitement mixte : dans les cas où, pour une raison quelconque, le médecin ne peut pratiquer une longue série d'injections, il pourra, après avoir fait 4 ou 5 injections, utiliser l'*Immunizol* en comprimés, destiné à l'absorption buccale.

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant cinq centig. Iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'Iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris.

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications internes sans Iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goître. — Fibrome. — Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : 20 à 60 gouttes par jour.
Pour les enfants : 5 à 20 gouttes par jour.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (4^e).

IODAMELIS LOGEAI

Véritable combinaison définie, en gouttes concentrées, d'*Hamamelidine* et d'*Iodo-Iodure de Potassium*, découverte par M. Logeais et exaltant par cette association l'activité pharmacodynamique du produit.

Propriétés. — Par son *Hamamelidine*, spécifique veineux chez les hypertendus veineux, cyanotiques variqueux, par son *Iodo-Iodure de K*, spécifique cardio-artériel chez les artério-scléreux uricémiques, hypervisqueux, l'*Iodamelis* est le plus puissant modificateur de la circulation et domine toute la thérapeutique cardio-vasculaire.

Indications. — Affections cardio-vasculaires et à point de départ circulatoire, troubles de la puberté et de la ménopause.

Pesologie. — En se rappelant que :

(0,20 Hamamelidine.

1 gr. = 1 gttes = (0,03 Iode

(0,26 Iodure de K.

on prescrira de X à XXV gouttes 2 fois par jour, avant les repas, dans un peu d'eau de Vichy. Demi-dose pour les enfants.

Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.

Laboratoires LOGEAI

30, rue de Chaillot — PARIS (16^e)

IODARSENIC GUIRAUD
ou
GOUTTES PAIDOPHILES

do Docteur GUIRAUD.

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Sérofulose, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathies, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impétigo, Psoriasis, Urticaires...) Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Prescription. — Enf. de 6 mois à 2 ans	2 à 10	gouttes par jour
— 2 ans à 8 ans	4 à 20	—
— 8 ans à 15 ans	4 à 30	—
Adultes	10 à 40	—

à prendre en se conformant à la notice, dans un peu d'eau ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Laboratoire

60, cours d'Aquitaine — BORDEAUX

IODASELLE DELAMARRE

Combinaison iodo-phosphatée avec l'extrait de soya.
d'un goût exquis et parfaitement toléré.

Indic. thérapeut. Lymphatisme, Lympho-sérofugose, Tuberculoses externes, Engorgements ganglionnaires, Rachitisme, toutes maladies par carence, Anémie, Chloroanémie, Aménorrhée, Affections chroniques du système nerveux, Myélites, Tubés, Chorée.

Méditation logée ne provoquant pas d'accidents d'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — L'*Iodazelle* se prend pure et avec un peu d'eau à la fin des repas.

Doses recommandées :

De 3 à 4 ans : 2 cuillères à café par jour

De 4 à 10 ans : 3 cuillères à café par jour.

De 10 à 15 ans : 2 cuillères à dessert par jour.

Au-dessus de 15 ans : 2 cuillères à soupe par jour.

Laboratoires du COLARSE

Paul DELAMARRE

Pharmacies de 1^{re} Classe

BEAUGENCY (Loiret)

IODASEPTINE CORTIAL

Iodo — Benzo — Méthyl — Formine

Comp. — Corps cristallisé, dialysable, injectable, atoxique : aucune réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Indicat. — Infections chroniques : Rhumatismes ; Tuberculose ; Syphilis ; Scléroses.

Tuberc. — T. à marche lente, même à foyers ouverts, mais particulièrement dans les formes bronchitiques, emphysémateuses. Jamais d'hémoptysie. Communications scientifiques, courbes de température et d'expectorations.

Rhumat. — Toutes les formes chroniques (déformants, de Poncet, etc.).

Ampoules. — Solut. à 10 0/0 : 5 cc. (0,50 ctg.) pour adultes ; 2 cc. (0,20 ctg.) pour enfants. — Une à trois par jour — Voie veineuse (tr. lente). Intra-musculaire (tr. profonde).

Gouttes : Un ctg. ch. correspond à 2,5 gouttes de teinture d'iode. — **Comprimés** : Deux dosages : 0,50 et 0,20 ctg. — Doses des iodures.

Laboratoires CORTIAL

125, rue de Turenne — PARIS

IODE ORGANIQUE BOISSY

(C₆ H₁₂ N₄ - C₂ H₅ I)

Comprimés solubles de 10 centigrs.

Propriétés. — *L'Iode organique Boissy* (Iodéthyl-hexaméthylènetétramine) est un corps cristallisé, d'un blanc pur, renfermant 43 0/0 d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, légèrement amères. N'exerce aucune action sur l'estomac et ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'iode naissant, puissamment antioxygène et antiseptique. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

Indications. — Plus actif que l'iode et les iodures, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre : Hypertension, Angine de Poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, Syphilis tertiaire, Maladies infectieuses : Grippe, etc.

Doses moyennes. — 1 à 8 comprimés par jour

Laboratoires BOISSY

32 bis, boul. d'Argenson, NEUILLY-sur-SEINE

IODÉINE MONTAGU

(Bi-iodure de Codéine)

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique ; facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes Pharmaceutiques :

Sirop. — 0,04 cgr. d'Iodéine par cuill. à soupe.

Dose : 1 à 3 cuill. par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 d'Iodéine crist.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

IODEYL FOURNIER

Combinaison iodo-organique d'iode et peptone pure

Forme. — Globules : 0,01 cgr. iode métalloïdique combiné par globule.

Dose. — 3 à 6 globules par jour, à prendre aux repas.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures : Adénopathies chroniques, Emphysème, Asthme, Artério-Sclérose, Syphilis.

En flacon de 60 globules : 5 fr. 50 le flac.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

IODO-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine :
0 gr. 30 ; huile d'olives : 3 cm'.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis. Traitement ordinaire : 15 à 20 ampoules, dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules :
10 francs

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirop iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre ; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases ; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 % de l'iode total au lieu de 0 à 8 %) ; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 30 gouttes par jour
adultes : 40 à 60 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.

PÉPIN & LÉBOUCQ

à COURBEVOIE (Seine)

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, 5 gouttes représentent un centigramme d'iode; 20 gouttes agissent comme un gramme d'iodure alcalin.

Doses et mode d'emploi. — Vingt gouttes en deux ou trois fois dans la journée, dans un peu d'eau pure ou sucrée.

Prop. thér. — Élimine l'acide urique et les toxines du sang. Active la sécrétion des bronches. Produit une suractivité leucocytaire et un réveil des fonctions glandulaires. Agit comme diurétique, tonique et dépuratif. Spécifique puissant contre la grippe.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Arthritisme, Asthme, Emphysème, Grippe, Auto-intoxication, etc.

E. HAUTOIDIER

37, Rue Galilée — PARIS

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de pepton de viande de bœuf.

Gouttes dont 20 = 1 gr. d'iodure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — 10 à 40 gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition; artério-sclérose; obésité; polysarcie; dégénérescence graisseuse; intoxications chroniques; asthme; emphysème; rhumatisme; arthritisme; goutte; tertiarisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

IODOSTARINE " ROCHE "

Acide diiodo 6-7 élaïdique ou taririque diiodé du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 220), 47,56 % d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

Indic. Thér. :

Remplace KI aux mêmes doses.

Posologie et Mode d'emploi :

Iodostarine " Roche " cachets, dosés à 0,25 cgr. Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas.

Iodostarine " Roche " comprimés, dosés à 0,125 mgr. Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas ; enfants : 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

Iodostarine " Roche " granulé, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas ; enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B. — On prend l'Iodostarine " Roche " de préférence à la fin des repas.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

iodo-THYROÏDINE CATILLON

Forme :

Tablettes de Catillon à 0, 25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications :

Obésité, Goître, Myxoedème, Dermatoses.

Doses :

1 à 2 contre Myxoedème; 2 à 8 contre Obésité, Goître, Herpétisme, Ostéogénèse.

Laboratoire CATILLON

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

IODURASE

Description. — Capsules kératinisées contenant :

Iodure de potassium par...	0 gr. 50
Levurine extractive.....	0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure mais sans iodisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facile à prendre.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goître, l'obésité, le saturnisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

IODURES CROS

Potassium — Sodium

Forme. — En pilules inaltérables, exactement titrées à 0 gr. 25 d'iodure chimiquement pur. L'enrobage spécial favorise la digestion intestinale et supprime toute irritation stomacale.

Pas d'iodisme à redouter.

Indications. — Artério-sclérose, Asthme, Emphyseme pulmonaire, Goutte, Gravelle, Obésité, Rhumatisme, Scrofule et, en général, dans toutes les affections diathésiques.

Dose. — 2 à 4 pilules par jour, pour atteindre 8 à 10, progressivement.

(Il existe également des pilules de bi-iodure CROS dans lesquelles l'iodure de potassium et le bi-iodure d'Hg. sont combinés.

Laboratoires DELATTRE

10, rue du Bac — PARIS

Télép. Fleurus 25-80.

IODURE PHILIPPE

Forme. — En pilules héralinisées; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — Plus de 20 ans de pratique et de succès.

Prêre de prescrire :

(à 0,50

Pilules Philippe à l'iodure de potassium (à 0,20

(à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les Pilules Philippe à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium à 0,20

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goître, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur H. PHILIPPE

11, rue Palais Grillet — LYON

IODURES SOUFFRON

Iodure de potassium (KI). Iodure de Sodium (NaI)
Chimiquement purs - Titrés - Inaltérables
Pas d'Iodisme

Solution à 1/15°. Une cuill. à potage contient
1 gr. KI ou NaI.

Sirop à 1/20°. Une cuill. à potage contient
1 gr. KI ou NaI.

Dragées à 0 gr. 25 chaque KI ou NaI. Kératinisées ou non.

Gouttes à 1/5°. Une goutte contient 0,01 cgr.
KI ou NaI.

Dose et Mode d'emploi. — De 0,15 à 1 gr.
par jour et plus.

Prop. Thér. — Vaso-dilatateur, Hypotenseur,
Artério-sclérose, Hypertension, Syphilis
Scléroses viscérales, Asthme, etc.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

Ce n'est pas nous que vous devez
remercier, si cet ouvrage vous rend
service, ce sont les Spécialistes qui
en font les frais. Et vous ne pouvez
mieux le faire qu'en prescrivant leurs
produits.

JÉCOL

à base de Kinkélibah (Combretacées)

*Régulateur des trois fonctions essentielles
hépatique, rénale, intestinale.*

Composition. — Kinkélibah (*Extrait mou-
aqueux*), Boldo, Evonymine.

Forme. — Cachets minuscules disposés dans
des tubes de verre.

Indications. — Le *Jécol* possède une action
directe et spécifique sur l'épithélium du
foie, des reins et de l'intestin d'où ses pro-
priétés cholagogues, diurétiques et laxa-
tives et secondairement ses qualités toni-
stimulantes, dépuratives et antitoxiques, —
utilisées avec succès non seulement dans
les maladies du foie, mais encore dans de
multiples affections rénales et gastro-
intestinales, dans les toxiinfections, les
autointoxications et les diathèses.

Dose. — *Traitement prophylactique (cure de
Jécol).*

a) Cas habituels (Insuffisance et congestion
hépatiques et constipation chronique.) Un
cachet à la fin du repas du soir pendant
une semaine sur deux ou trois.

b) Cas graves (Maladie du foie caractérisée).
Deux à quatre cachets par jour à la fin des
repas pendant deux à trois semaines, dans
l'intervalle des accès.

Traitement curatif :

a) Cas moyens (maladies du foie non toxi-
infectieuses). Deux à quatre cachets par
jour dans un liquide quelconque, de pré-
férence une eau minérale alcaline.

b) Cas graves (surtout maladies des Pays
chauds).

Quatre à six cachets par jour et plus.

Contre-indications. Néant.

Boîte de 30 cachets.

Entretien médical et littérature sur demande adressée à

Laboratoire du JÉCOL

36, Rue Rivay — LEVALLOIS-PERRET (Seine)

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

(Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, livré en boîtes de 20 paquets de 10 gr.

Doses et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (mode d'emploi sur prospectus).

Prop. thérap. — La KAOLINASE constitue le médicament de choix pour le *piétrage* de l'estomac (Prof. Hayem, *A. M.*, 13-5-1920.)

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc., etc.

Échantillons gratuits.

PHARMACIE RATIONNELLE

4, rue Faubourg-Poissonnière — PARIS (10°).

KERLOL

Expérimenté avec succès dans les hôpitaux, analysé par le Docteur BARRAL, prof. à la Faculté de Médecine de Lyon.

Composition. — Polyphénate sodique de fer chloré.

Forme. — Liquide, Poudre, Pommade, Suppositoires.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, astringent, hémostatique.

Doses et mode d'emploi :

Ulcères, Varices, Plaies : Compresse au KERLOL liquide dilué au tiers.

Hémorroïdes internes : Un suppositoire au KERLOL matin et soir.

Hémorroïdes externes : Pommade au KERLOL n° 3.

LERCK

pharmacien à SAINT-ETIENNE (Loire)

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu

Indications :

Fièvre des Foins, Coryza aigu.

Forme :

Comprimés.

Posologie :

Adultes. — 3 comprimés par jour.

Enfants. — Moitié doses.

Laboratoire de la KINECTINE

12, Rue du Chemin-Vert

à VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine)

KIPSOL

(en pilules)

Cacao pulv. et tannates actifs d'alcaloïdes.

(Avantages curatifs des préparations belladonnées et opiacées à l'exclusion de leurs inconvénients.)

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures.
— Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

Prop. Thér. — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

Indications. — Préservatif et curatif des rhumes.

BERTAUT-BLANCARD Frères

64, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tannocaféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Prop. thér. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, Dépression mentale, Adynamie cardiaque, Troubles fonctionnels cardiaques, Grippe, Convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, Asthénie, Surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 6 francs

Laboratoires P. ASTIER

45, Rue du Docteur Blanche — PARIS (16^e)

KYMOSINE ROGIER

(Anciennement Pegnine)

A base de Ferment lab et sucre de lait purifié. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cm³ de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon, 8 fr.

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour adultes et enfants : une cuillère-mesure par verre de lait. Nourrissons : une demi-cuillère-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans une à deux cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacon de 40 comprimés.

Action thérapeutique. — La *lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées, diarrhées vertes des nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS,

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés

Doses et Mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Prop. Thér. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, entérites, diarrhées, dermatoses.

LACTOBACILLINE

13, Rue Pavée — PARIS

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Compos. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Prop. thér. — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

Doses. — 2 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants, un comprimé suffit.

Se vend par boîtes de six tubes de six comprimés

Prix au public : 6 fr.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, Rue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux Formes. — Liquide et Gelée.

Liquide : Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée : Contient 90 0/0 de Lansoyl liquide et 10 0/0 de sucs de fruits et d'Agar Agar. Goût, odeur et aspect agréables. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

Enfants : Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

ROBERTS & Co, Pharmaciens
5, rue de la Paix — PARIS

LANTOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre en ampoules de 3 cc., par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thér. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

“ LAUCODRAGETTES ”

La « **Laucodragette** » est une présentation nouvelle de tous les médicaments délivrés habituellement sous forme de cachet ou de comprimé. Son enrobage spécial (dépôt international 24.027) supprime toute saveur désagréable, stimule la sécrétion des glandes salivaires et gastriques augmentant ainsi la rapidité d'action du médicament.

Sa solubilité parfaite dans l'estomac évite toute sensation pénible de brûlure.

La « **Laucodragette** » s'avale comme un cachet, sans être brisée, même sans ingestion de liquide.

Emploi habituel et selon prescriptions médicales.

NOMS ET DOSAGES

des médicaments existant actuellement
sous forme de

« LAUCODRAGETTES »

Aspirine	0,50
Salol	0,50
Formine (Urotropine française) ...	0,50
Pyramidon	0,15
—	0,30
—	0,50
Antipyrine	0,50
Chl. Quinine	0,20
—	0,25
—	0,40
—	0,50

PRESCRIRE : « *Laucodragettes* », (nom du médicament et dosage).

Les Laboratoires NOVALIS

DUPRAZ-LAURENÇON, pharmaciens

1, Rue Chavanne — LYON

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales.

Puissance antiseptique absolue (solution 3 ‰)

Dose. — Suivant les indications.

Formes actives. — SAVON LAURENOL (antiseptie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (aseptie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur ni mercure.

Laboratoires. BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

LAXAGARINE

Composition. — Agar-agar sans addition d'aucun principe médicamenteux.

Indications. — Constipation chronique habituelle.

Dose. — a) Paillettes : 1 à 4 cuill. à café à chaque repas.

Dose. — b) Cachets : 1 à 4 cachets à chaque repas.

LAXAGARINE BELLADONÉE

Composition. — Association de l'agar-agar avec la belladone.

Indications. — Constipation par spasme intestinal.

Dose. — a) Paillettes : 1 à 2 cuill. à café à chaque repas.

Dose. — b) 1 à 2 cachets à chaque repas.

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18°)

LAXAMALT

Combinaison à parties égales d'huile de paraffine et d'Extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût agréable.

Dose et mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour les *nourrissons*, deux cuillerées à soupe pour les *enfants*, trois pour les *adultes*, réparties dans le courant de la journée

Indicat. — CONSTIPATION, en général. *Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin* Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Laboratoires LICARDY

38, Boulev. Bourdon — PARIS-NEUILLY

LAXATIF ORGEAT

Forme. — Le *laxatif orgeat* est une poudre finement granulée, mise, stérilisée, dans de petits sachets dosés (2 gr. 1/2). Délayé dans un peu d'eau il donne une véritable émulsion (loch) douce et agréable au goût.

Dose et mode d'emploi. — Prendre une dose le matin à jeun. Déjeuner immédiatement après en absorbant de préférence : thé, lait, café ou chocolat. La régularité et l'entretien des fonctions digestives et intestinales sont assurés avec une dose par semaine.

Indications. — Très apprécié par l'enfance, il agit doucement à la façon d'un véritable régulateur de l'estomac et des intestins sans engendrer de constipation. Convient également aux adultes.

Le sachet 0 fr. 75.

Echantillon sur demande.

Dépôt : A. GÉRAUDEL, Pharmacien
36, Rue Rivay — LEVALLOIS-PERRET

LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

Mode d'emploi. — Une ou deux cuill. à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

Prop. Thér. — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antiseptie intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aiguës, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Prix du Flacon : 7 fr.

A. GIRARD

48, Rue d'Alésia — PARIS (14^e)

LEBNOL

Synops. — Ferment lactique *titré et stabilisé*. Un comprimé de Lebnol équivaut à 5 cc de culture fraîche.

Indic. thérap. — Le Lebnol a donné des résultats remarquables par leur constance et leur activité dans le traitement des infections des voies digestives. Il agit remarquablement dans l'entérite. C'est un adjuvant de la thérapeutique de certaines néphrites toxiques où il agit en empêchant la formation de nouvelles toxines d'origine fermentative. Le Lebnol est également précieux dans le traitement de certains états hépatiques, Congestion, atrophie ; dans ces cas, la rapidité de son action n'est pas bien expliquée.

Doses. — Adultes : 3 à 6 par jour ; Enfants : 2 à 4 par jour ; Nourrisson : 1 par jour.

N.B. — La longue conservation de ce produit en fait un médicament des plus utiles pour la médecine coloniale.

Littérature et échantillons sur demandes adressées directement aux Usines Thevenot.

Prix : la boîte de 48 comprimés en tubes, 6 fr.

Ce produit est fabriqué par la Société des

Produits Pharmaceutiques THEVENOT — DIJON

pour **M. GIRARD**, Pharmacien

217, rue Lafayette — PARIS

LÉCITHOSINE ROBIN

Lécithine naturelle ex-ovo
Granulé. — Pilules

Dose et mode d'emploi :

Granulé 1 à 3 cuillers-mesure.

Pilules 2 à 3 par jour.

Indications :

Neurasthénie, Phosphaturie, Tuberculose, Rachitisme, Diabète.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy

PARIS

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extraît sec de levure de bière en flacon de 50 comprimés.

Action Thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis à vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

LIENTINE GRÉMY

Traitement de la constipation

Sels biliaires, extraits intestinaux, évonymine, cascara, bourdaine, vaccin intestinal.

Doses et mode d'emploi :

Quatre pilules par jour ; deux avant chaque repas.

Indications :

Constipation de toute nature.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de cervelle de mouton

Ampoules de 2 cc. contenant 0,20 d'extrait.
Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés therap. — Agit par lipoides phosphorés qu'elle contient : cholestérine, lécithine, etc.,
Antitoxique, sédative, anticonvulsivante et tonique.

Indications. — Etats dépressifs, Neurasthénie, Mélancolie, Epilepsie, Hystérie, Paralyse générale.

Doses. — Une injection tous les jours pendant 10 à 12 jours ou deux dragées avant chaque principal repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

5, rue Ballu — PARIS

Téléph. : Central 45-56

LIPOCITHINE

Composé organique à base de cholestérine et de Lécithine à saturation dans l'huile d'olive stérilisée.

Indications thérapeutiques. — Toutes les formes de la **Tuberculose** et particulièrement la tuberculose pulmonaire, Lymphatisme, Rachitisme, Anémies de toute origine. Convalescence de maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — Adultes : tous les jours, une ampoule de 2 ou 5 cc. en injection intra-musculaire (intra-fessière).

Enfants de 8 à 12 ans : tous les deux jours, une ampoule de 2 cc. — Enfants de 12 à 16 ans : Tous les jours une ampoule de 2 cc.

Laboratoire DOUETTEAU Frères

20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (8*)

LIPOCYTOL GRÉMY

Modification du terrain tuberculeux dans l'intervalle des poussées évolutives.

Thérapeutique de restauration organique destinée à rétablir l'équilibre lipoïdique et à restaurer la déminéralisation de l'organisme.

Doses et mode d'emploi. — Huit à dix pilules par jour en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Prétuberculose, scrofule, lymphatisme, tuberculose ganglionnaire, tuberculoses osseuses, tuberculose pulmonaire chronique, en dehors des poussées évolutives

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX*)

LIPOFÉINE

Médicament eupnélique.

Comp. et Prop. — Obtenue par combinaison de l'éther éthyldiiodobrassicique (lipoiodine) avec la caféine. La *Lipoféine* active le travail du cœur, abaisse la tension artérielle; elle fluidifie les sécrétions bronchiques, facilite l'expectoration, dissipe la dyspnée et régularise le rythme respiratoire.

Indic. — Etats dyspnéiques en général, plus particulièrement asthme et emphysème, catarrhes, bronchites et laryngites chroniq.

Doses. 1 à 4 comprimés par jour. Chaque comprimé contient 0 gr. 12 d'iode et 0 gr. 05 de caféine. Période de traitement de 15 à 25 jours.

Prix : Le tube de 15 comprimés 7 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph^{lm}

1, Place Morand — LYON

LIPOGYRE CIBA

(Lipoiodine Hg)

Médicament iodo-mercuriel

Comp. et Prop. — Combinaison iodo-mercurielle obtenue à l'aide de l'éther éthyldiiodobrassicique (lipoiodine), et réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure avec exaltation de l'activité thérapeutique de chacun de ces composants. Préparation se recommandant par sa bonne tolérance.

Indicat. — La syphilis dans ses diverses manifestations et particulièrement dans ses accidents tertiaires et secundo-tertiaires.

Posologie et Forme pharmaz. — 1 à 8 comprimés par jour à prendre aux repas. Chaque comprimé contient 0 gr. 15 d'iode et 0 gr. 02 d'Hg.

Prix : Le tube de 20 comprimés 5 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, Ph^{lm}

1, Place Morand — LYON

LIPOÏDES H. I.

Lipophosphatides de tous les organes.

Formes :

1^{re} Ampoules huileuses pour injections hypodermiques.

2^{re} Pilules kératinisées.

Adrénol Cortex, Adrénol Total,
Androcrinol, Cardiocrinol,
Cérébrocrinol, Entérocrinol,
Gastrocrinol, Gynocrinol, Gynolutéol,
Hémocrinol, Hépatocrinol, Hypophysol,
Mammol, Néphrocrinol, Pancréol,
Placentocrinol, Prostatocrinol,
Pulmocrinol, Splénocrinol,
Thymocrinol, Thyrol A.

Indications :

Chaque lipoïde constitue un aliment et un excitant, spécifique de l'organe dont il provient.

LÎPOIDES ASSOCIÉS

Polycrinol : Thyrol — Adrénol total et Hypophysol.

Andro-Polycrinol : Androcrinol — Thyrol — Adrénol total et Hypophysol (infantilisme chez garçons, insuffisances pluriglandulaires masculines).

Gyno-Polycrinol : Gynocrinol — Thyrol — Adrénol total et Hypophysol (infantilisme chez filles, insuffisance pluriglandulaires féminines).

AFATYL

Médication iodée sensibilisée.

(Association d'iode et de lipoïde thyroïdien).
(Arthritisme, Obésité thyroïdienne, Rhumatisme chronique, Artériosclérose).

Laboratoire de Biologie Appliquée
H. CARRION & C^{ie}

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie
54. Faub. Saint-Honoré, PARIS (8^e)

LIPOIODINE CIBA

Iode organique assimilable

Comp. et Prop. — Ether éthyl-diiodo-brassicidique, corps contenant 41,1 % d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipiodine remplace avantageusement ces deux médicaments à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indicat. — Celles de l'iode et des iodures : Artério-Sclérose, Hypertension artérielle. — Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goutte, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — Adultes : 1 à 7 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Prix. — Le tube de 20 comprimés : 5 fr. 50.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

LISERONINE DAVYSONN

Traitement végétal des Affections rhumatismales
Indications. — Goutte, Gravelle, Rhumatismes > goutteux.

Mode d'emploi. — Le matin, à jeun, 2 à 3 cuillerées à soupe dans un demi-verre d'une infusion. Toutes les 48 heures en cas de persistance de l'accès.

Autres formes : Baume Davysonn antigoutteux.

Mode d'emploi. — Onctions légères sur les parties endolories.

Pilules préventives du D^r Davysonn. Complément du traitement par la *Liseronine*.

Mode d'emploi. — Pendant un mois, au printemps et un mois à l'automne, deux pilules avant le déjeuner et deux avant le dîner.

Poudre alcaline antidyspeptique.

Mode d'emploi. — Un paquet par jour dans un litre d'eau.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France.)

MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914.
(Paris-Médical, 25 avril 1914.)

VICARIO, Nouvel emploi pour usage interne. *(Journal de Pharm. et de Chim., 16 février 1914.)*

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.

La LISTOSE se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée)

GELÉE (consistante et sucrée)

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe
matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café
matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites,
etc. Pendant la grossesse et après les opérations
intestinales.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

LUATOL

Tartro-bismuthate de sodium

et de potassium soluble

Thérapeutique bismuthique de la syphilis par la voie intramusculaire, préconisée chez les malades arséno et mercurio résistants.

Délivré en ampoules de 1 cm³ contenant 0 gr. 10 de produit actif.

Le Luatol est également délivré sous la forme de suspension huileuse.

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/2 à 1 %.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 %.

Le Lusoforme est un savon alcalin liquide contenant 20 % de formol et stérilisé à l'autoclave.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

MAGNÉSIE LOURDE de DUREL

Magnésie anglaise calcinée

Cette Magnésie présente les avantages suivants : Elle ne possède aucun goût et se mêle facilement à tous les liquides.

Elle est éminemment active et ne provoque jamais de coliques.

Elle agit, suivant la dose, comme un simple laxatif ou comme un purgatif énergique.

Elle ne provoque pas l'accoutumance ni la paresse consécutive intestinale, de sorte qu'elle peut être employée indéfiniment.

Cette qualité la rend précieuse dans toutes les affections hépatiques où son emploi journalier permet l'élimination régulière de la bile.

Pesologie. — Une cuillerée à café le soir.

Laboratoire DUREL

7, boulevard Denain — PARIS

MALT WANDER OU GLOMA

Extrait de Malt *sen*

Composition. — Matières azotées 3, 87 %, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine) 89, 17 %, Substances minérales 1, 56 %, Eau 3, 40 %, (Acide phosphorique en pourcent des substances minérales 9 %).

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal, nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescences, Dyspepsie, Entérocœlie chronique par insuffisance antitoxique, Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

Malt Wander à l'Iodure de Fer

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0, 12 grs. de pure Iodure de fer.

Indications. — Répond aux indications du fer et de l'iode. Chez les lymphatiques, les chloro-anémiques, les adénoïdiens dans le traitement interne des dermatoses remplace avec avantage et agréablement l'huile de foie de morue. L'extrait de malt évite les inconvénients de la médication ferrugineuse et de l'iodurisme.

Malt Wander au Pyrophosphate de fer

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0, 40 grs de pyrophosphate de fer.

Indications. — Réunit les propriétés nutritives et digestives du malt aux propriétés du fer sur le sang et du pyrophosphate sur les nerfs. Le malt facilite l'assimilation de ces derniers; son action légèrement laxative, corrige, entre autre celle, un peu constipante du fer.

Anémie, surmenage intellectuel et physique, convalescences.

Malt Wander à l'Hémoglobine

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 2 grs. de sang à pure intégral.

Indications. — Augmente la richesse du sang en fer, et son pouvoir de fixation de l'oxygène. Très soluble, aisément assimilable, ne constipe pas et n'irrite pas les voies digestives.

Malt Wander au Carbonate de Gaiacol

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,35 gra. de Carbonate de gaiacol.

Indications. — Médication des bronchites et pneumopathies diverses, en particulier de la tuberculose. Réponds aux nombreuses indications de la créosote, sans en avoir ni sur les voies digestives, ni sur la circulation pulmonaire, les inconvénients redoutés.

Malt Wander aux Glycérophosphates

Composition. — 1 cuillerée = 0,40 gra. de Glycérophosphates combinés, de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippe, bronchites, typhoïdes, etc.) Surmenage, déminéralisation anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

Malt Wander au Phosphate de Chaux

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,15 gra. de chlorhydrophosphates de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.) Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Dose. — *Enfants* : 1-3 cuillerées à café 3-4 fois par jour.
Adultes : 1-3 . — soupe 3-4 — —

au début des repas pur ou dissous dans eau, lait ou infusion.

Etablissements WANDER

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 25 %, Céréales 40 %, Sels minéraux 2 %, H_2O 3 %, Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer. Retirer du feu avant le premier bouillon.

Etablissements WANDER

58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

MANGAÏNE

Peroxyde de Manganèse,
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,14 de Peroxyde de Manganèse.

Propriétés therap. :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indicat. therap. :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Pharmacie SCHMIT

71, Rue Sainte-Anne — PARIS

MARINOL

Reconstituant marin inusité, de Goût Agréable.

Préparé. — Eau de mer captée au large, stérilisée à froid; Iodalgol (Iode organique); Phosphates calciques en solution organique; Algues marines iodifères avec leurs nucléines azotées; Méthylarsinate disodique.

1 ccm (une cuill. à café) contiennent exactement 1 cgr. d'Iode et 1/4 de mgr. de méthylarsinate en combinaison physiologique.

Si alcool, ni huile. Pas d'intolérance. Pas d'iodisme. Entièrement assimilable en été comme en hiver. Convient à tous les âges. Médication de durée illimitée. Goût très agréable. Meilleur succédané de l'huile de foie de morue, dont il a la même origine marine.

Propriétés. — Reconstituant, Tonique, Dépurateur.

Indications. — Toutes manifestations de l'Anémie, du Lymphatisme, du Rachitisme et de la Scrofule. Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire et osseuse. Mal de Pott. Bronchites. Asthme. Convalescences. Neurasthénie. Maladies consomptives. Dyscrasies. Troubles de la croissance, etc.

Mode d'emploi et Doses. — Avant ou après les repas, pur ou dans un peu d'eau. Grandes personnes: 2 à 3 cuill. à soupe. Enfants: 2 à 3 cuill. à dessert. Nourrissons: 1 à 3 cuill. à café.

Prix réglementé: 8 fr. le flacon (sans impôt)

Vendre par commandes médicales: 40 % franco de port et d'emballage.

Laboratoires "LA BIOMARINE"

à DIEPPE (Seine-Inférieure)

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du médecin.

MÉDICATION ANTISYPHILITIQUE DISSIMULÉE

CURE IODO-HYDRARGYRIQUE INTENSE DISSIMULÉE

Composition et Posologie. — Elixir au goût agréable; 1 cuillerée à soupe contient 1 gr. de Ka et 0 gr. 01 de Hg 2.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe en 24 heures.

Composition et Posologie. — Pilules glutinées. Chaque pilule contient 0 gr. 20 de KI et 0 gr. 002 de Hg 2.

Doses. — 4 à 10 pilules en 24 heures.

Propriétés et Avantages. — Apporter, en même temps que mercure, l'iode alcalin si couramment employé en période tertiaire et si souvent indispensable pour combattre certains accidents secondaires (céphalée, algies multiples). Fera par la forme pilulaire, avec enrobage glutiné, attaqué seulement dans l'intestin, de ménager les estomacs délicats; constitue en outre une forme commode pour le voyage. — Assure enfin, par son aspect extérieur, pleine discrétion au malade.

Prescrire en même temps : *Neurobora*, poudre dentale chloralée au ratanhia. Préviens et guérit stomatites et gingivites hydrargyriques.

Laboratoires Ed. DENAUSSEY

Docteur en pharmacie, licencié-ès-sciences

44, rue Inkermann — LILLE

(Echantillons et Littérature)

TRAITEMENT ARSÉNO-MERCURIEL D'ENTRETIEN

Composition et Posologie. — Sirop à goût agréable 1 cuillerée à soupe contient 0 gr. 005 d'iodeure mercurique et 0 gr. 005 de tri-iodeure d'arsenic. — Doses : 2 à 4 cuillerées à soupe en 24 heures.

Pilules glutinées : Chaque pilule contient 0 gr. 005 d'iodeure mercurique et 0 gr. 005 de tri-iodeure d'arsenic. — Doses : 2 à 4 pilules en 24 heures.

Propriétés et Avantages. — Apporte, en même temps que mercure, nécessaire au traitement d'entretien, le médicament arsenical reconstituant, utile aux organismes fatigués par cure d'attaque intense qu'ils viennent de subir. Fera par la forme pilulaire avec enrobage glutineux, de ménager les estomacs délicats et constitue, en outre, une forme commode pour le voyage. — Assure enfin, par son aspect extérieur, pleine discrétion au malade.

Prescrire en même temps : *Neurobora*, poudre dentale chloralée au ratanhia. Préviens et guérit stomatites et gingivites hydrargyriques.

Laboratoires Ed. DENAUSSEY

Docteur en Pharmacie licencié-ès-sciences

44, rue Inkermann — LILLE

(Echantillons et Littérature)

MÉNOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Deux indications :

Maladies veineuses ; troubles congestifs de la fonction ovarienne.

Posologie :

Deux dragées à chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

11, Place des Vosges — PARIS (IV^e)

MÉSOFORME

BACTÉRICIDE PUISSANT

MÉSODORISANT - ANTISEPTIQUE - DÉSINFECTANT

non caustique — non irritant — non toxique

(Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution saponifiée de thymol et de paraldéhyde, avec adjonction de sels alcalins, supprimant toute causticité.

Indications. — *Gynécologie* : Hygiène de la femme. Leucorrhée. Métrite. Salpingite. Accouchements. — *Laryngologie* : Angines. Amygdalites. Abcès. — *Stomatologie* : Gencivites. Carie.

Mode d'emploi. — *Action prophylactique* : 1 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie, chaude. — *Accouchements et Gynécologie* : 1 ou 2 cuill. à dessert pour 2 litres d'eau bouillie chaude. — *Laryngologie* : 2 cuill. à dessert pour 1 litre d'eau bouillie, chaude. *Stomatologie* : 3 gouttes dans un verre d'eau.

Littérature et Echantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (11^e)

MESOTHORIUM BUISSON

Solution de Bromure de Mésothorium pour injections hypodermiques, intra-veineuses ou interstitielles.

1^{re} *Solution faible (concentration A) : dosée à 1/4 de milligramme par c. c. Injecter de 1 à 3 c. c. par jour pendant une à deux semaines. Indications : artério-sclérose, états asthéniques et anémiques, pré-tuberculose.*

2^e *Solution moyenne (concentration B) : dosée à un microgramme par c. c. Indications : Rhumatismes, goutte, manifestations blennorragiques (orchite, rhumatisme sciatique, anévrismes graves, leucémie, cancers. Injecter de 1 à 3 cc. par jour pendant 10 à 12 jours.*

3^e *Solution forte (concentration C) : dosée à 2 microgrammes par c. c. S'emploie en injections interstitielles dans les cancers accessibles.*

Stimulation puissante de l'organisme et de l'hématopoïèse. Décharges d'acide urique. Antinfectieux. Action antigénique.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

MÉTARSENOBENZOL SACA

(914 Français)

Fournisseur de l'Etat et de
l'Assistance Publique

—O—

INJECTIONS INTRAVEINEUSES

parfaitement tolérées

même aux doses les plus élevées

de 0 gr. 10 à 1 gr. 05

—O—

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES

en solution directement injectable

indolore

de 0 gr. 01 à 0 gr. 50

—O—

Concessionnaire

A. MILLET

4, rue Ambroise-Thomas — PARIS (9^e)

Tél. : BERGERE 58-43

Echantillons sur simple demande

MÉTRITOLS

Comprimés effervescents, alcalins, astringents
antiseptiques

Composition.

Acide picrique, thymol, bicarbonate et borate de soude, formaldéhyde. Parfum agréable des essences alpestres.

Propriétés thérapeutiques.

Donnent des résultats merveilleux dans les leucorrhées de toute nature.

Mode d'emploi.

Injectons vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bœck très bas.

Laboratoire LEES

PARIS — 124, Rue du Bac, 124 — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

MICRANYL GRÉMY

Traitement de la migraine

Fondé sur l'action désensibilisante de la peptone, combinée à l'action de la Thyrénine et de l'Hépatotanic (voir ces mots).

Doses et mode d'emploi :

Trois pilules, une demi-heure à une heure avant chaque repas.

Indications :

Migraines arthritique, thyroïdienne, menstruelle, de la ménopause, des constipés, des hépatiques.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

MICTASOL

(Spécifique du Prostatisme.)

Régulateur des fonctions urinaires.

Forme. — Comprimés. — Chaque comprimé contient : Camphre monobromé, 0,02; Hexaméthyltétramine, 0,05; Noix de Sterculia purpurea pulv., 0,25; Sucre vanillé, Q. S.

Propriétés therap. — Décongestif extrêmement puissant. — Antiseptique énergique. — Sédatif certain et immédiat. — Tolérance parfaite et innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indicat. therap. — Blennorrhagies. — Uréthrites. — Cystites. — Pyélo-néphrites. — Uretérites. — Congestions rénales (avec ou sans albuminurie). — Hypertrophie de la prostate.

Mode d'emploi. — Croquer 6 comprimés par jour : Matin; midi; soir. — PRIX : 8 francs le Flacon.

Laboratoires JOCYL

COUDERC, Pharmacien de 1^{re} Classe

BOZIS, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris, Succes^r
39, Rue Saint-Georges — PARIS.

Tél. Trudaine 63-50.

MIGRAINOL

Composition :

Sels de quinine solubles, salipyrine, amido-théine.

Forme :

Cachets (exclusivement).

Propriétés thérapeutiques :

Antinévralgique, Antithermique, Antirhumastismal.

Ne fatigue pas l'estomac ; n'influence pas le rein.

Posologie :

Un à trois cachets par 24 heures.

La boîte de 12 cachets : 5 francs

Laboratoire Gustave FRANÇOIS

16, Cours Gambetta — LYON

MOKAVÈNE

Graines exotiques torréfiées

Imitation parfaite du café sans action sur le cœur.

Dose. — 1 cuillère à café par tasse d'eau bouillante.

Prix : 6 fr. la boîte de 500 grammes

Comte René de GRAUWE 

Pharmacien de 1^{re} Classe

16, Rue de Rocroy — PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN

Forme et Composition. — Liqueur non alcoolique à base de glycérine pure contenant : iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse, Quinine) en tout 0,15 cgr. par cuiller à soupe. Phosphate de soude : 0,15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien tolérée en toutes saisons.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, lymphatisme, tuberculose convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures de guerre.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfants* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur pur après les repas ou étendue d'eau au début des principaux repas.

Prix réglementé net : 6 fr. 50 la bout. de 600 cmc.

Laboratoires J. DUHÈME

105, Rue de Normandie — COURBEVOIE (S.)

MUCOSODINE

Inflammation des muqueuses

Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Composition. — Bicarbonate de soude, Perborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Dégage de l'oxygène naissant. Donne une solution : Antiseptique, Isotonique, Alcaline. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites Rhume des Foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale. Gargarismes. Bains de bouche, irrigation.

Le Flacon : 4 fr. 50

Laboratoire G. CAILLAUD

25, rue Drouot — PARIS

Téléph. : Cent. 59-92

MUSCULOSINE BYLA

Suc musculaire total, hyperactivé par les oxydases globulaires, les hormones spléniques, le manganol et les vitamines cardiohépatomusculaires.

Dose et Mode d'emploi. — Par cuillérées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours *froide* ou *tiède*.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire, Toninutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

MUTANDINE GRÉMY

*Modification du tempérament
arthritique*

Doses et mode d'emploi :

Prendre quatre à six pilules par jour.

Indications :

Toutes les manifestations de l'arthritisme : cutanées, nerveuses, respiratoires, digestives, hépatiques, rénales, articulaires.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

MUTHANOL

Hydroxyde de bismuth radifère porphyrisé

Indications. — **SYPHILIS** à toutes ses périodes.

Mode d'emploi. — Chaque ampoule renferme 0,15 ctg. de bismuth radio-actif.

Une ampoule tous les deux jours ou deux ampoules tous les cinq jours.

Cas rebelles : Deux ampoules tous les deux jours.

Toujours intra-musculaire.

Prix de la boîte de 10 ampoules : 25 fr.

Littérature sur demande

Laboratoire du MUTHANOL

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (10^e)

Détail : STOULS, Pharmacien

156, avenue Victor-Hugo — PARIS (16^e)

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Provoque la phagocytose. — Prévient et guérit la plupart des maladies infectieuses de l'homme.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuill. par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuill. par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc...

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

NAIODINE

NaI injectable, stabilisé par procédé spécial, en ampoules de 2 cc. contenant 0,01 cgr. de sel hyperactif par cc.

Propriétés. — Réalise l'analgésie générale atoxique de toute douleur spasmodique, névralgique et inflammatoire par imprégnation iodique de la cellule nerveuse.

Succédané des stupéfiants, la Nafodine s'en distingue par son atoxicité absolue et sa tolérance parfaite.

Indications. — Tout syndrome douloureux aigu ou chronique : dyspnées, emphysème, bourdonnements, zona, lumbago, sciaticques, névralgies faciales et intercostales, iritis, névrites, rhumatisme articulaire aigu, arthrite chronique, etc.

Posologie. — Injection indolore dans un groupe musculaire quelconque de 2 à 8 ampoules par jour, faites séparément :

Traitement d'attaque : 4 à 8 ampoules par jour.

Traitement d'entretien : 2 ampoules par jour.

Aucune incompatibilité ni contre-indication selon l'âge ou l'état du malade.

Laboratoires LOGEAS

30, rue de Chaillot — PARIS (16^e)

NARCYL GRÉMY

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl (chlorhydrate d'éthyl-narcéine synthétique).

Doses :

ADULTES : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.

ENFANTS : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.

— 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.

— 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

NARSENOL

Novarsenobenzol destiné à être administré par voie buccale, sous forme de comprimés dosés à 0 gr,10.

Grâce à un enrobage spécial, le médicament conserve intégralement son activité et ne se dissout que dans l'intestin.

La dose moyenne est de 1 à 4 comprimés par jour, qu'on avale comme des pilules, sans les diviser.

Principales applications. — Anémie perniciense, angine de Vincent, dermatoses, paludisme, pian, entérite rebelle, fièvre récurrente, spirochétose, amibiase, grippe etc.

Littérature sur demande.

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

NÉOARSITE

Forme. — 1° *Ampoules isovisqueuses, isotoniques.*

2° *Pilules solubles dans l'intestin grêle.*

Prop. thérap. — Exprime 2 formes thérapeutiques, très usitées désormais, de la liqueur de Fowler dont la valeur pharmacodynamique incontestable a été consacrée par tous les Codex.

Ces deux formes récentes, et hautement appréciées, n'ont aucun des inconvénients reprochés aux cacodylates et aux méthylarsinates, elles mettent en évidence l'efficacité remarquable de la liqueur de Fowler, dans le rôle de récupération des éléments de réserve et d'épargne si fréquemment déficitaires dans l'organisme.

Indic. thérap. — Amaigrissement, débilité, asthénie, convalescences, asthme, adénies, etc.

Société des Marques Biologiques

Dépôt à Paris : 11, rue Joseph-Bara

NEO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique
(Syn. Arrhénal)

Indic. thér. — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise. *Ampoules* à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

NEOBY

TROUETTE-PERRET

Iodo-bismuthate vanadique

En ampoules de 2 cc. contenant 0,10 etg. de sel actif par cc., en suspension huileuse stérilisée à 20 %.

Faire des injections intramusculaires profondes dans la région fessière haute et paramédiane, avec une aiguille de 0ⁿ07 de longueur, et 10/10^e de % de diamètre.

Propriétés. — Spirillicide très puissant, d'une richesse bismuthique optima (20 0/0 de Bi Métal), le NEOBY est encore un reconstituant globulaire sanguin, par le vanadium qu'il renferme et qui joue le rôle d'activateur des combustions organiques.

Pas de dépression comme dans l'emploi de la médication bismuthique.

Indolore, rapidement absorbable, et sans toxicité.

Fluidité et homogénéité parfaites

Tolérance indiscutable.

Un traitement au NEOBY, bien conduit, entraîne la négativité de la réaction de Bordet-Wassermann.

Indications. — Syphilis à ses différentes périodes ; manifestations nerveuses de la syphilis et de la parasymphilis ; syphilis arséno ou mercurorésistantes, hérédosyphilis.

Posologie. — *Syphilis primaire et secondaire* : 2 cc. tous les trois jours. — Cure totale : 3 gr. de sel actif, ou 30 cc. de NEOBY Trouette-Perret.

Syphilis nerveuse : 1 à 2 injections de 1 cc. pour élever la tolérance, puis série de 10 injections à 2 cc. tous les deux jours.

ENFANTS : 1/10 de la dose totale des adultes (3 gr.) par deux années d'âge, soit 0 gr. 30.

Commencer par 1/2 cent. cube tous les 4 ou 5 jours. Surveiller la tolérance,

NEOBY

Hg.

TROUETTE-PERRET

Médication antisyphilitique « per os » : Pilules d'iodo-bismuthate vanadique et mercure.

Cure d'entretien : Une pilule par jour avant les repas.

Littérature spéciale envoyée sur demande, aux Etablissements **TROUETTE-PERRET**, 15, rue des Immeubles-Industriels - PARIS, XI^e arr. — Tél. Diderot 10-35.

NEO-DMEGON

(Vaccin antigonococcique curatif)

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires pratiquées tous les deux jours, à toutes les périodes de la blennorrhagie; se montre efficace contre tous les accidents dus au gonocoque : orchites, rhumatisme blennorrhagique, conjonctivite purulente, vulvo-vaginite des petites filles, *affections gynécologiques*, localisations viscérales. (Voir vaccins atoxiques stabilisés).

Littérature sur demande.

Etablissements POULENC Frères

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS

NEO-DMESTA

(Vaccin antistaphylococcique curatif)

Utilisé avec succès dans toutes les affections dues au staphylocoque; furoncles, anthrax, acné, sycosis, ostéomyélite, etc.

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les deux jours.

Aucune contre-indication; ne provoque pas de réaction,

(Voir vaccins atoxiques stabilisés)

Littérature sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

NEO-DMETYS

(Vaccin curatif et préventif de la coqueluche préparé au moyen de cultures du bacille de Bordet.)

Résultats très favorables, tant sur les quintes que sur l'état général; ne provoque aucune réaction.

S'emploie en injections sous-cutanées ou intramusculaires, tous les jours ou tous les deux jours.

(Voir vaccins atoxiques stabilisés)

Etablissements **POULENC Frères**

92, Rue Vicille-du-Temple — PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

NÉOL

Constitution. — Préparation aqueuse peroxysulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophyllactique, kératoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid, Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques, Métrites, Angines, Pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (*Néol 1 partie, eau 4 parties*) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrite et Endométrite) : *Néol pur*. — Pansements (Brûlures, Plaies diverses) : *Eau néolée*. — Gargarismes : *Deux cuill. à soupe par verre d'eau*. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe par injection de deux litres d'eau*.

Prix : le grand flacon de 375 gr. 6 fr. 50 (impôt compris).
— le petit flacon de 200 gr. 4 fr. —

NÉOLIDES

Compos. — Néolides = Néol solide; se différencient du produit liquide par leur réaction alcaline spécialement adaptée à l'antisepsie gynécologique, ce qui en limite l'emploi aux lavages et injections vaginales exclusivement.

Propriétés. — Par leur constitution percarbonatée source d'oxygène naissant, ils ne peuvent être irritants ou toxiques comme les produits à base de formol, alun, etc. Ils remplacent économiquement le Néol liquide, et ont toutes les indications et qualités du Permanganate de Potasse sans tacher. Discretement parfumés, leur emploi est pratique et agréable. Pour le médecin, c'est l'antiseptique scientifique et rationnel.

Prescrire pour soins intimes et hygiéniques 1 Néolide par litre; pour Métrite, Leucorrhées, etc. : 2 Néolides par litre. Bien recommander de dissoudre d'abord le comprimé dans une petite quantité d'eau, mais bouillante ou très chaude.

Prix : la boîte de 60 comprimés 7 fr. 50 net.

Laboratoires du NÉOL

9, Rue Dupuytren — PARIS (6^e)

Téléph. Fleurus : 13-12

LA NÉOLYSE

indic. thérap. — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens insolubles.

Observ. — L'instruction profane est rédigée de manière à dissimuler la nature exacte de l'affection : le mot « cancer » ne s'y rencontre pas.

Propri. thérap. — « La Néolyse » est établie d'après les observations du professeur Robin et les arguments cliniques Richet, Delbet et J. Regnault (*Acad. Médéc.*, avril 1918.)

Guérison des papillomes et cancers superficiels ; résultats encourageants dans les cancers inopérables.

Formes et doses usuelles. — Cachets, 3 par jour pendant 20 jours. Les 60 cachets de 0,50 : 12 fr.
Injection : Piqure indolore. Aucune réaction.

La boîte de 4 ampoules de 2 cc. : 8 fr.

Compresses néolysées pour pansements, action efficace. Agissent comme excitateur de la vitalité cellulaire.

Ph^{ie} STOULS, 156, av. Vict.-Hugo, PARIS (16^e)

Laboratoire de LA NÉOLYSE

55, boulevard de Strasbourg, à PARIS (10^e)

NÉOPLALYSINES du D^r RIQUOIR

Néoplalysine n° 1. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал fixés sur du bleu de méthylène.)

Cancer de la peau, Sarcome, Ulcère de l'estomac.

Néoplalysine n° 2. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал, extrait mammaire fixés sur du bleu de méthylène.)

Hémorragies des fibromes, Cancers du sein et de l'utérus.

Néoplalysine n° 3. — (Sublimé, trypsine, arrhéнал, extrait thyroïdien fixés sur du bleu de méthylène.)

Cancer du tube digestif.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 16,50 (impôt compris)

SOCIÉTÉ DES COMPLEXES COLLOÏDAUX DU DOCTEUR RIQUOIR

MERMINOD & C^{ie}

49, Rue de Paradis — PARIS (9^e)

NEO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié
(Nucléinate de Strychnine défini
et Cacodylate de Soude)

Indic. Thér. — Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc.

Mode d'emploi. — Tous les jours une ampoule, deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire.

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

NEO-TRÉPOL

Traitement de la syphilis par les sels de Bismuth. Médication intra-musculaire en ampoules stérilisées.

Spirillicide à base de bismuth précipité dosé à environ 96 % de Bi, en milieu isotonique.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation,

S'adresser aux

Laboratoires CHENAL & DOUILHET

22, r. de la Sorbonne, PARIS (v^e)

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — La Nergine apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques ; neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde, surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi. — Pour le nourrisson, délayé dans un peu de lait, à la dose d'une cuillerée à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour dans une infusion tiède ou mélangé aux aliments habituels.

NEURÈNE

En 1904 et 1905, les Prof. Pouchet et Chevallier montrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs. En 1905, le Prof. Brissonnet découvre l'éther de bornyl (dit Bornéol soluble ou Neurène).

Principe actif de la Valériane. Sans odeur

Solution contenant 0 gr. 10 de Bornéol soluble par cuill. à café. Une cuill. à café de Neurène contient la partie active de 150 gr. de racine sèche de Valériane.

Doses. — Adultes : 3 à 5 cuill. à café par jour. — Enfants : 1 à 3 cuill. à café par jour, selon l'âge.

Mode d'emploi. — Chaque cuill. à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée froide et aromatisée à la fleur d'oranger.

Prop. Thér. — Régulateur et tonique des centres nerveux.

Indications. — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Spasmes, Insomnies nerveuses...

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e). — Tél. Aut. : 06-62

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche et de Véronal pur solubilisé. Renferme 0 gr. 15 de Véronal par comprimé ou cuill. à café de solution.

A) **Dose et Mode d'emploi.** — 1^o Sédatif : 1 cuill. à café ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée. — 2^o Hypnotique : De 1 à 4 cuill. à café le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B) **Prop. Thér.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Epilepsie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladies de Basedow, Tics, Délirs toxiques, Palpitations, Surmenage, Prurit, etc.

Contre indication : Néant. — Prix : 7 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER

2, Rue du Débarcadère — PARIS

" NEUROBORE "

Composition et Forme. — Solution titrée inaltérable de Tartrate borico-potassique pur, 1 gr. par cuillerée à café.

Prop. thérap. — Résultats remarquables dans l'épilepsie, dans tous les cas d'excitation nerveuse tels que : Agitation, insomnie, troubles névropathiques, etc.

Il remplace donc avantageusement les bromures; la valériane, associée ou non au véronal, et ne possède aucun de leurs inconvénients (acné, troubles gastro-intestinaux, vertiges, dépression cardiaque, etc...)

Mode d'Emploi. — 3 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau

Laboratoire E. BACHELARD

8, rue Desnouettes — PARIS

Télép. Saxe 80-11.

NEUROSINE PRUNIER

(Phospho Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier)

Prop. Thér. — Reconstituant du système nerveux.

Mode de Présentation. — La "Neurosine Prunier" est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuill. à café par jour de granulé; 2 à 3 cachets par jour; 2 à 3 cuill. à bouche par jour de sirop. Chaque cuill. à café de granulé, chaque cachet et chaque cuill. à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de Chaux (Procédé G. Prunier).

G. PRUNIER & C^{ie}, (Maison Chassaing)

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

NEUROTANIC GRÉMY

Opothérapie nerveuse

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique d'encéphale.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée en dehors des repas.

Indications. — Dépression nerveuse, surmenage intellectuel, insomnies, neurasthénie.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir ou Granulé à base d'extrait total de glande oreohéique et interstitielle, de Nucleinate de soude, de Méthylarsinate disodique, et de glycéro-phosphate de soude.

Doses et Mode d'emploi. — *Elixir* : 1 verre à liqueur après chaque repas pour les adultes, 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants. *Granulé* : 1 cuillerée à bouche avant chaque repas pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants.

Propr. thérap. — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Insuffisances génitales.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire — PARIS

NEUROVOÏNE GRÉMY

*Traitement opothérapique
de la Neurasthénie*

Doses et mode d'emploi :

Prendre de quatre à 6 pilules par jour.

Indications :

Surmenage intellectuel et physique, dépression, neurasthénie, convalescence.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

NÉVRALGOL BROSSARD

Analgésiques - Antithermiques - Fébrifuges

Indications. — Névralgies faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatique. Grippe. Rhumatismes. Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes, à distance des repas.

Prix: 5 fr. 50 la boîte de 12 cachets, impôt compris.
— 2 fr. 90 — 6 — —

Laboratoires SOENEN & BROSSARD
1, Rue des Cordouans — LA ROCHELLE
Echantillons sur demande des Docteurs.

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

À base de Glycérophosphates de soude, de potasse et de magnésie. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dosa. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle des éléments mêmes de l'organisme : Soude = Plasma sanguin ; Potasse = Tissus nerveux ; Magnésie = Substance grise.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc.

Aucune contre-indication

Laboratoire FREYSSINGE

6, Rue Abel — PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco; doit être employé "INTUS & EXTRA" — action physiologique à l'intérieur, sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale à l'extérieur; sur les terminaisons des nerfs de la sensibilité générale.

Indications. — Prurit, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 10 Extrait de Guaco).
2 à 5 pilules à chacun des deux repas.

Sirop Nisaméline "TROUETTE-PERRET" (0 gr. 20 Extrait de Guaco).
1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc.

Pommade Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline "TROUETTE-PERRET".

Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : NISAMÉLINE "TROUETTE-PERRET" pour avoir le véritable Guaco.

Etablissements TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels — PARIS (11^e)

NITROYL LEYSIN

pour Administration per os

Dissolvant physiologique et éliminateur réel des acides urique et oxalique et de leurs composés

Présentation. — Liqueur et Cachets.

Indications. — Rhumatismes aigus et chroniques, articulaires et musculaires. Doit toujours être prescrit aux malades traités par les injections de *Nitroyl Lepsin* Injectable.

Propriétés. — Solubilise les concrétions, dissout et élimine réellement les urates et oxalates, ainsi que leurs acides de combinaison.

Posologie. — 1 cachet ou une cuillerée à café avant chacun des trois repas du matin, de midi et du soir avec un demi-verre d'eau ordinaire. Supprimer les eaux minérales.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

NITROYL LEYSIN INJECTABLE

Symbiose catalytique des Sels de Terres Rares traités photolytiquement pour Injections hypodermiques et intramusculaires. Rigoureusement exempte d'alcaloïdes anesthésiques.

Présentation. — Ampoules stérilisées entourées chacune d'un condensateur à charge statique variable.

Indications. — La plupart des accidents arthritiques : Rhumatismes aigus, chroniques, déformants, articulaires, musculaires. Limitations des mouvements articulaires, ankyloses, arthrites, sciatiques, lumbagos, névralgies faciales, douleurs intercostales.

Propriétés. — Provoque une dispersion moléculaire immédiate des concrétions, laquelle se traduit par une disparition extrêmement rapide des phénomènes morbides et par une liberté relative presque immédiate des mouvements, dans les cas de limitation de ces derniers. Les névralgies faciales rebelles cèdent ordinairement en une vingtaine d'applications.

Posologie. — En général, proportionner le nombre d'injections de une ampoule chacune au volume de l'articulation ; 4 à 6 dans les arthrites de la hanche ; 4 dans le creux cotyloïde dans les arthrites coxo-fémorales ; 4 également pour l'épaule, genou, malléoles ; 3 pour le coude, le poignet ; 1 à 2 pour les articulations digitales.

Toujours le plus près possible de l'interligne articulaire. Éviter de laisser s'écouler² plus de 24 heures entre chaque application. L'injection est pratiquement indolore. Cependant, pour les sujets très sensibles, la faire précéder de 1/2 cc. de solution à 2 0/0 de Novocaïne.

Sciatique. — Chaque jour, 2 à 3 injections le plus près possible du point d'émergence, 2 dans le creux cotyloïde, 1 ou 2 sur le trajet. Il existe des ampoules de Nitroyl spéciales pour la sciatique ; ne devant pas être utilisées pour d'autres affections.

La médication est inoffensive. Des doses de trente injections chaque jour peuvent être administrées sans inconvénient.

Pendant la durée du traitement, toujours prescrire le *Nitroyl Leysin* ordinaire, soit en Liqueur, soit en Cachets, à la dose de 3 cachets ou de 3 cuillerées à café à prendre avant les repas du matin, de midi et du soir. Continuer cette médication environ un mois après la fin du traitement par les piqûres.

Prix sans engagements.

En Pharmacie : 55 francs.

Au Corps Médical : 40 francs

Formuler : 1 boîte Ampoules *Nitroyl Leysin Injectable*.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi :

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Granulés : 2 à 3 cuill. à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (9^e)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

NOVARGYRE

(Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore)

Comp. es. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaine : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm. cube.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intra-musculaires tous les deux jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire huit à douze injections et laisser reposer le malade pendant une ou deux semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS

NOVARSENOBENZOL

Dioxydiaminoarsenobenzol-méthylène
sulfoxylate de soude

Mêmes indications que l'Arsenobenzol

S'emploie principalement dans la syphilis en injections intra-veineuses, à doses progressives de 0 gr. 15 à 1 gr. 05. Soluble dans l'eau distillée; il n'y a pas lieu d'alcaliniser les solutions.

Peut également être utilisé en injections intramusculaires, en lavements et comme topique local (Angine de Vincent, etc.).

Littérature sur demande

Établissements POULENC Frères
92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

NUCLEARISITOL ROBIN

Association de la combinaison végétale nucléophosphatée avec le méthylarsinate Nucléophosphate de chaux et de soude méthylarsiné.

Comprimés. — Ampoules injectables.

Doses et Mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Prop. Thér. — Antituberculeux, Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

NUCLEATOL ROBIN

Combinaison de Nucléophosphates d'origine végétale

Granulé : Nucléophosphate de chaux et de soude.

Injectable : Nucléophosphate de soude pur.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas, ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Prop. thér. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou les colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc.; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

NUCLÉO-FER GIRARD

Forme. — Pilules de 0 gr. 10 de Nucléinate de fer, exemptes de produits provenant de la désintégration du noyau nucléinique (créatinine et bases xanthiques).

Propr. thérap. — Les expériences faites par le Docteur Dor et poursuivies dans les Hôpitaux de Paris ont prouvé :

1^o qu'il accroît en quelques jours, de 30 à 90 % la teneur des globules en hémoglobine.

2^o que le Nucléo-Fer était de tous les ferrugineux, le mieux supporté par les estomacs de chlorotiques.

Indications. — Anémie et plus spécialement l'Anémie nerveuse.

Prix : le flacon de 80 pilules, 5 fr.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia — PARIS

NUJOL

Huile de Vaseline

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

Indications. — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

Dosage. — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : D'une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Préparé par les

Laboratoires du NUJOL

Standard Oil Co., (NEW JERSEY)

Chez tous les pharmaciens ou directm. chez l'agent de vente: A. W. B. SCOTT, ph.-drogu., 18, rue du Mont-Thabor, PARIS.

NUTROMALT

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H²O 2 %.

Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Doses. — Nourrissons de 1 mois : 4 1/2 cuillerées à café par 2-3 décollitres de lait. Doses variables suivant l'âge.

Etablissements WANDER

58, rue de Charonne — PARIS (11^e)

NYCTAL

Comprimés

Compos. — Bromdiéthylacétylurée.

Action. — Réunit l'action hypnotique des produits du groupe "Véronal" et l'action sédative des bromures.

Indications. — Toutes les insomnies; affections nerveuses et mentales.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dosés à 0,35 de Bromdiéthylacétylurée.

Doses. — Action sédative : 1 comprimé toutes les 4 heures.

Action hypnotique : 2 à 3 comprimés le soir dans une infusion chaude.

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18^e)

OCRÉINE GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire.

Diagnostic facile et sûr de tous les troubles
menstruels (1).

Quelles que soient leur nature, leur intensité, leur fréquence, les troubles menstruels ont pour seules causes soit l'insuffisance ovarienne, soit l'insuffisance thyroïdienne. Ils cèdent à l'administration opportune de l'OCRéine ou de la THyrénine.

Le diagnostic entre l'une et l'autre insuffisance dépend uniquement de la fréquence, de l'abondance et de la durée de l'écoulement.

Troubles Menstruels	CAUSES	TRAITEMENT
<i>Règles rares.....</i>	Insuffisance ovarienne	OCRÉINE GRÉMY Deux à cinq pilules tous les jours pendant les huit jours qui précèdent les règles et pendant tout le temps que dure l'écoulement sanguin. Gouttes d'OCRéine : Dix gouttes correspondant à une pilule.
<i>Règles peu abondantes.....</i>	Id.	
<i>Règles douloureuses</i>	Id.	
<i>Acts d'oppression, palpitations, bouffées de chaleur.....</i>	Id.	
<i>Règles fréquentes...</i>	Insuffisance thyroïdienne	THYRÉNINE GRÉMY Une pilule par jour pendant deux jours, puis alternativement une et deux, puis deux pilules par jour. Le traitement commencera huit jours après la fin des dernières règles et se prolongera jusqu'à la fin de la période menstruelle suivante. Recommencer huit jours après jusqu'à cessation des troubles (Tablettes : doses doubles).
<i>Règles abondantes.</i>	Id.	
<i>Règles de trop longue durée.....</i>	Id.	
<i>Migraines, céphalées transitoires, frissons, douleurs rhumatismales.....</i>	Id.	
<i>Aménorrhée</i> <i>Hypocéphalisme transitoire</i> <i>Sténie,</i> <i>Dysménorrhée chronique.</i>	Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées.	THYROCRÉINE GRÉMY Deux à six pilules par jour pendant vingt jours par mois ; y associer suivant les cas deux à quatre pilules d'OCRéine, ou une à deux pilules de THyrénine.

(1) Nous ne comprenons sous cette dénomination que les troubles de la période cataméniale en dehors de tout état pathologique, c'est-à-dire en exceptant tous les cas où une tumeur ou une infection en sont la cause première.

ŒNOPHOS

Acides hydro-éthylène-phosphoriques
Reminéralisation phospho-dolomitique

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET, de Dijon.

Prop. thér. — Neurotonique. Reconstituant énergétique; *fixateur électif* de la Magnésie et de la Chaux (*voir fiche DOLOMA*). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose*.

Doses et mode d'emploi. — A chaque repas: 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café de *Granulé*.

Pour la cure reminéralisante, *voir DOLOMA*.

Granulé : le flacon, 11 fr. (impôt compris).

Elixir : le flacon 15 fr. (impôt compris).

Laboratoire d'Etudes Biologiques

29, Place Bossuet — DIJON

Téléphone : 16-42

OLEO-IODE DUBOIS

Huile iodée à 50 %

Composition. — Un centimètre cube d'OLEO-IODE contient 50 centigr. d'iode, sous forme d'éthers gras iodés.

Indications. — Par sa forte teneur en Iode et sa mise en liberté lente et progressive, l'OLEO-IODE permet une action continue, et la constitution d'une réserve médicamenteuse qui n'est assimilée que peu à peu.

Il convient tout particulièrement dans les rhumatismes déformants et articulaires, l'arié-rio-sclérose, la syphilis tertiaire et toutes ses manifestations, la tuberculose, etc., où l'action thérapeutique est incomparable.

Posologie. — Capsules : 2 à 5 par jour aux repas. — Ampoules : 1, 2 et 5 cc. ; tolérance parfaite de doses répétées.

Laboratoires DUBOIS

35, Rue Pergolèse — PARIS (16^e)

OLÉOLAXINE

Composition :

Huile de paraffine chimiquement pure préparée pour l'usage interne et aromatisée à l'essence d'anis.

Action :

Mécanique et lubrifiante.

Indications :

Constipation chronique habituelle.

Dose :

Une à deux cuill. le matin à jeun et le soir en se couchant.

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18^e)

OPHTALMINE

Indic. thérap. — Antisepsie oculaire.

Cataracte, Conjonctivites, Presbytie prématurée, etc.

Doses et Mode d'emploi. — Pommade, deux applications par jour.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour

PARIS (XVI^{me})

OPOCALCIUM du D^r GUERSANT

Polyopothérapie - Reminéralisation

Composition. — Extrait sec des glandes à sécrétion interne : Parathyroïde, surrénale, thymus; poudre d'os frais, sels calciques, fluorure de calcium, silice, manganèse, magnésic.

Formes. — Cachets, comprimés et granulés.

Opocalcium arsénié : Chaque cachet est dosé à un centigr. de méthylarsinate disodique.

Prop. thérap. — La déminéralisation est toujours due à la déficience des glandes endocrines : Parathyroïde, surrénale, thymus. Ces glandes régissent le métabolisme dans l'économie de tous les minéraux. Par leur action, l'*Opocalcium* assure la reminéralisation totale.

Pour réaliser une méthode thérapeutique rationnelle, les minéraux associés aux extraits de glandes sont d'origine organique, par conséquent à orientation vitale; leur fixation est par conséquent assurée : Os frais et sels calciques (rendus assimilables selon la formule Ferrier).

Indications. Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Débilité, Anémie, Croissance, Convalescence, Lymphatisme, Rachitisme, Fractures, Carie dentaire.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 3 cachets ou 4 à 6 comprimés ou 3 cuillerées à dessert de granulé par jour.

Enfants : Jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés par jour, ou 3 cuillerées à café de granulé; jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Laboratoire de l'OPOCALCIUM

Albert RANSON

Docteur en Pharmacie

121, Avenue Gambetta — PARIS (20^e)

(Télép. : Roquette 80-31)

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

du Docteur FRAYSSE

Thyroïdose (Ovaire et thyroïde). Dose : 2 pastilles par jour.
Insuffisance ovarienne et thyroïdienne. Troubles de la puberté et de la ménopause. Troubles de croissance.

Encéphalose (Testicule, Substance grise du cerveau et de la moelle) (4 pastilles par jour).

Dépression nerveuse sous toutes ses formes. Affaiblissement sénile.

Placentodose (Placenta, Mammaire). — Insuffisance lactée. Tumeurs et congestion interne (2 cuillerées à soupe par jour de granulés).

Splénodose (Rate, Foie, Thyroïde) granulés. — Tuberculose. Anémie. Fièvres paludéennes. Insuffisance hyanique et splénique (2 cuillerées à soupe par jour).

NOTA. — Le Laboratoire du Docteur Fraysse prépare tous les produits d'opothérapie simple sous forme de granulés ou de comprimés.

Demandez le Catalogue et des échantillons.

Laboratoire de Chimie Biologique

Docteur FRAYSSE, directeur

Ex-Interne des Hôpitaux — Licencié ès-Sciences.

Pharmacien de 1^{re} Classe.

130, rue d'Aboukir — PARIS

Téléphone Louvre 18-50

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

OPOTHÉRAPIE BYLA

EXTRAITS ORGANIQUES BYLA

1^o Forme Solide — Cachets " OPO "

Procédé Breveté

contenant dans le même pain azyne, deux comprimés concentriques, renfermant l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le Lipéide correspondant.

Se désintégrant immédiatement dans le Liquide stomacal.

Se conservent indéfiniment, grâce à la suppression des Actions Lipasiques de contact.

Prescrire :

Opo-Ovarine Byla à 0,10, 0,20, 0,30, etc.

Opo-Hypophysine Byla à 0,10, 0,15, 0,25, etc.

Opo-Pluriglandulaires, 12 assoc. différents.

Opo-Panglandulaires, Hommes, Femmes, Enfants, etc...

La boîte de 24 Cachets : 6, 8 et 10 francs

2^o Forme Liquide. — **EXOS**

Sucs Tissulaires totaux inaltérables, préparés par Exolyse des Organes

Prescrire :

Exo-Ovarine Byla, etc...

Exo-Thyroïdine Byla, etc...

Exo-Pluriglandulaires, 12 associat. différents

Exo-Panglandulaires : Hommes, Femmes, Enfants, etc...

Pitullobine Byla : Gynécologie

Adrénopituine Byla : Antiasthmatique

Les Etablissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

OPOTHÉRAPIE CHAIX

Le **Laboratoire CHAIX** prépare tous les Extraits glandulaires sous les trois formes usuelles :

« Injectable » ; « Cachets » et « Tablettes » et, sur demande médicale, tous les Extraits associés.

PRODUITS SPÉCIAUX

Colloïdogénine, du docteur Bayle (ampoules et sirop). Tuberculose (pulmonaire, ganglionnaire, osseuse).

Succomusculine (Voir paragraphe spécial).

Splénomédulla (extrait splénique et médullaire) ampoules et sirop. Paludisme et anémie consécutive.

Ostéomyéline (extr. de moelle osseuse). Chloro-anémie. Leucémie.

Placentase. Galactagène.

Glycérohépatéine. Insuffisance hépatique. Diathèse urique.

Glycéropneumine. Affections pulmonaires.

Sphygmotopique. Hémorrhoides.

COMPRIMÉS PHYSIOLOGIQUES

Pepsine — Pancréatine — Diastase
Ptyaline — Trypsine — Entérokinase

PILULES

d'Extrait biliaire (Choléase CHAIX)
d'Entérokinone, de Glycogène.

Laboratoire CHAIX

CAZIN & C^{ie}, *Pharmaciens de 1^{re} Classe, Succ^{rs}.*

10, rue de l'Orne — PARIS (15^e)

Téléphone Ségur 12-55.

OPOTHÉRAPIE CHOAY

1° OPOTHÉRAPIE UNIGLANDULAIRE :

Extraits totaux CHOAY

Poudres obtenues par dessiccation rapide des tissus glandulaires, dans le vide profond et à froid. Équivalent aux organes frais dont elles ne diffèrent que par simple élimination d'eau. (CHOAY, *Des extraits opothérapiques*, Vigot, éditeur, Paris).

Le thérapeute dispose de tous extraits : Bile, Cérébral, Corps Jaune, Entérique, Gastrique, Hématique, Hépatique, Hypophysaire (glandes totales, lobes antérieurs ou lobes postérieurs), Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocardique, Orchitique, Ovarien, Pancréatique, Entéro-Pancréatique, Parathyroïdien, Placentaire, Prostatique, Pulmique, Rénal, Sérum sanguin, Splénique, Surrénal (glande totale ou substance corticale), Thymique, Thyroïdien.

Prescrire : (A) *Voie digestive* Comprimés, ou cachets, ou pilules CHOAY, à l'extrait (indiquer la sorte).

Doses : Adultes de 2 à 8 par jour aux repas. Enfants de 10 ans, la moitié; de 5 ans le tiers; de 2 ans 1/2, le quart des doses d'adultes.

(B) *Voie injectable* : Ampoules CHOAY à l'extrait (indiquer la sorte).

Doses : Généralement une ampoule de 1 cc. tous les deux jours, sauf dans certains cas spéciaux (obstétrique, gynécologie, etc.).

2° OPOTHÉRAPIES ASSOCIÉES :

Syncrines CHOAY

Les troubles des glandes endocrines sont presque toujours complexes par synergie des sécrétions internes.

Pour combattre ces troubles le praticien dispose d'extraits opothérapiques associés, les Syncrines, dont les formules correspondent aux cas les plus fréquents de Syndromes pluriglandulaires.

Prescrire : Comprimés, ou cachets, ou ampoules Syncrine CHOAY, formule n°

Syncrines CHOAY : N° 1, Pluriglandulaire — N° 2, Surréno-Hypophysaire — N° 3, Thyro-Surréno-Hypophysaire — N° 4, Thyro-Ovarienne — N° 4 bis, Surréno-Ovarienne — N° 5, Thyro-Orchitique — N° 5 bis, Surréno-Orchitique — N° 6, Hypophyso-Orchitique — N° 6 bis, Hypophyso-Ovarienne — N° 7 Thyro-Hypophyso-Ovarienne — N° 7 bis, Thyro-Hypophyso-Orchitique — N° 8, Peptosthénie (glandes digestives). — N° 10, Placenta-Mammaire.

Doses : *Voies digestives*, 2 cachets ou comprimés par jour, aux repas. — *Voie injectable*, généralement une ampoule tous les deux jours.

Laboratoire CHOAY

44, Avenue du Maine — PARIS (Télg. FLEURS 12-47)

OPOTHÉRAPIE COIRRE

Comprimés Zévor

Pulpe d'organes frais desséchée ;
Pulpe d'organes frais desséchée
en Comprimés de 0 gr. 50

Capsulaires ; Hypophysaires ;

Thyroïdiens ; Placentaires ;

Digestifs ; Entériques ;

Mammaires ; Ovariques ;

Reiniques ; Hépatiques ;

Pancréatiques ; Orchitiques.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse, 5
PARIS (VI^e)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉ-
CIALITÉS PHARMACEUTIQUES"
vous rend des services, engagez les
Pharmaciens Spécialistes à y souscrire,
ce qui nous permettra de le perfec-
tionner et d'en augmenter le tirage.

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide

Endocrisines (voir ce mot). — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, rein, thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

Forme. — 1^o *Cachets* à toutes doses (sur demande médicale).

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr. ; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; rein, 0,25 cgr.

Prix : La boîte, 8 fr. ; 10 fr. ; 12 fr.

selon dosage

Cachets pluri glandulaires

M, sexe masculin.

F, sexe féminin.

Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

2^o *Ampoules* :

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse. Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale. Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage obstétrical.

Formuler : Endocrisines-glande injectable Fournier.

Prix : 8 fr. 50

Laboratoires FOURNIER Frères
26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

OPOTHÉRAPIE " MONCOUR "

(Voir : Sphérulines « Moncour » et Parathyrocalcéine)

Extraits totaux d'organes sélectionnés, préparés à froid, dans le vide profond.

Formes. — 1° SPHERULINES à tous extraits d'organes. Rigoureusement dosées. Absolument inaltérables et toujours solubles grâce à leurs enrobages spéciaux.

2° Cachets aux mêmes doses que les SPHERULINES, ou, sur demande, à toutes doses.

Doses (Voir : Sphérulines). — Suivant les préparations : 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30. — Sphérulines parathyroïdiennes : 0 gr. 001. — Bonbons Thyroïdiens : 0 gr. 01.

Mode d'emploi. — *Toutes les Sphérulines (monergiques et synergiques) se prescrivent : 1 à 6 par jour ; sauf Sphérulines hépatiques et rénales : 1 à 16 par jour.*

SPHERULINES et cachets SYNERGIQUES « Moncour » bi et pluriglandulaires, à toutes associations opothérapiques :

Thyro-Ovariennes Thyro-Orchitiques, Hypophyso-Ovariennes, Surréno-Hypophysaires, Surréno-Ovariennes, etc., etc.).

Sur demande, toutes préparations ou associations opothérapiques spéciales en SPHERULINES ou Cachets.

Produits Opothérapiques MONCOUR

49, av. Victor-Hugo ; 2 et 20, rue Thiers

BOULOGNE-PARIS

Téléphone : BOULOGNE 114

OPOTHÉRAPIE VIGIER & HUERRE

Docteur ès-sciences

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Préparations renfermant les organes en nature, sans qu'ils aient subi aucune modification chimique ou thermique susceptible de détruire tout ou partie de la substance active.

Capsules ovariennes. — Dosage 0,20 cgr. de substance ovarienne pure.

Capsules orchitiques. — Dosage 0,20 cgr.

Capsules de corps thyroïde. — Dosage 0,10 cgr. et 0,05 cgr.

Capsules surrénales. — Dosage 0,25 cgr.

Capsules de thymus. — Dosage 0,30 cgr.

Capsules pancréatiques. — Dosage 0,50 cgr.

Capsules prostatiques. — Dosage 0,20 cgr.

Capsules hépatiques. — Dosage 0,30 cgr.

Capsules galactogènes. — Dosage 0,30 cgr. de placenta.

Ces capsules s'ordonnent à la dose de 2 à 4 par jour, au moment des repas.

OPOZONES LUMIÈRE

Constitution. — Préparations opothérapiques, à base de glandes fraîches, obtenues par un procédé, entièrement nouveau, présenté par MM. A. Lumière et Chevrotier, à la Société de Thérapeutique de Paris (23 octobre 1912), fondé sur les propriétés absorbantes de certains sels inertes. Ces préparations renferment intacts tous les éléments chimiques et biologiques de la glande. Ils sont glutinisés et dragéifiés, ce qui facilite leur conservation et permet d'éviter l'action trop hâtive des sucs digestifs.

Les Laboratoires Lumière préparent des Opozones à base de tous organes. Chaque Opozone correspond à son poids de glande fraîche (0 gr. 20).

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

OPOZYMASES

Les Opozymases représentent une forme *rationnelle et nouvelle de l'opothérapie gastro-intestinale*.

Forme Pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Comprimés blancs à base d'*Hormones gastriques et parotidiennes* solubles dans les sécrétions stomacales.

Comprimés roses à base d'*Hormones Coecales, pancréatiques et hépatiques* solubles seulement dans le suc intestinal.

Cette méthode permet donc de faire agir synergiquement les enzymes de la digestion dans leur propre milieu et par conséquent dans les conditions d'activité les meilleures.

Les Opozymases sont riches en *Vitamines et Hormo-stimulines spécifiques*. Ce sont de puissants Catalyseurs que l'on emploiera avec succès dans toutes les affections des organes digestifs et du Foie par déficience ou excès des sécrétions *endo* ou *exocrines*.

Posologie. — *Adultes et Enfants* : Deux comprimés à chacun des principaux repas ; un blanc quelques minutes avant le repas, un rose au milieu du repas. Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Ce traitement ne comporte aucune contre-indication.

Spécimen sur demande à MM. les Médecins

Société Française d'Opothérapie

58, rue Taitbout — PARIS (9^e)

OPTARSEGOL

Orthotripropyldiarsinophenolparasulfonate
Hydrargyro-potassique

Forme :

Ampoules de 2 cm³.

Indications :

Tuberculose, et plus particulièrement forme fébrile.

Posologie :

Une ampoule tous les deux jours, par série de quatre, repos de huit jours ; faire ainsi trois séries, puis repos de un mois.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, Rue de Marly — RUEIL (S.-et-O.)

OREXYL

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, récalcifiant, eupeptique.

Forme et compos. — Granulé à base essentielle de persulfates alcalins, de métavanadate de sodium et de glycérophosphate de chaux, en présence des différents fluorures

Indications therap. — Dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme. — Convalescence, croissance défectueuse, neurasthénie, surmenage, tuberculose, bronchite, anémie, grossesse.

Posologie. — Enfants de 5 à 12 ans : 1 cuill. à café 20 minutes avant le repas de midi et du soir, soit pur, soit dissous dans un peu d'eau. — Adultes : 1 cuill. à dessert avant le repas de midi et du soir.

M. LOUISGRAND

Pharmacien à VILLEFRANCHE (Rhône)

OSTÉO-HÉPATINE

Opothérapie osseuse additionnée de 10 % d'extrait hépatique (moelle et os frais de veau).

Dose. — Tablettes friables. — Adultes : 3 à 5 tablettes par jour. — Enfants : 1 à 3 tablettes par jour, entières ou pulvérisées.

Propriétés. — Reminéralisant, récalcifiant organique toujours actif et puissamment actif. Se différencie des sels minéraux par une activité indiscutable, cliniquement établie.

"La reminéralisation doit être faite à l'aide de l'opothérapie osseuse en soutenant l'activité hépatique". Travaux des professeurs A. Robin et Teissier (de Lyon).

Indications. — Tuberculose, Maladies osseuses et nerveuses, Grossesse, Allaitement, Croissance, Dentition, Rachitisme, etc.

Préparation sans similaires ni équivalents.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e)

Téléph. Ant. : 06-62

OSTRÉINE BUISSON

Chaux organique silico-fluorée
(partie centrale de l'écaille d'huître)
et phosphates assimilables

Recalcifiant et reminéralisateur biologique global.

Indications. — Tuberculose et pré-tuberculose, Rachitisme, troubles de croissance du squelette, Retard de consolidation des fractures, Retards de dentition, Grossesse et allaitement, Phosphaturie, Déminéralisation des déchéances organiques.

Formes. — Cachets, poudre, granulé, comprimés.

Dose. — 1 cachet, 1 comprimé, 1 mesure de poudre ou une cuill. à café de granulé au milieu de chaque repas.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

OUABAÏNE ARNAUD

L'Ouabaïne, véritable tonique du myocarde, ne remplace pas, mais complète heureusement la Digitaline. »

(Académie de médecine, 20 mars 1917.)

Ampoules à 1/4 milligr. La boîte de 6 : 12 fr.

Soluté ou solution au millième d'Ouabaïne Arnaud. Le flacon : 9 fr.

Comprimés à 1/10 de milligr. La boîte de 30 : 7 fr.

Indications. — Insuffisance du ventricule gauche : des Aortiques, des Cardio-Rénaux, des Hypertendus, avec ou sans artério-sclérose.

Insuffisance du ventricule droit : des Lésions mitrales ou tricuspidiennes, des Péricardites et symphyses du péricarde, de l'Emphysème, de l'Asthme, Myocardites d'origine infectieuse.

Bien spécifier sur l'ordonnance

Ouabaïne Arnaud.

Echantillons :

Laboratoire NATIVELLE

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

OUATAPLASMES

du D^r Ed. LANGLEBERT

Pansement humide complet

Instantané, aseptique, émollient

Indications. — Furoncles, Anthrax, Absès, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies Contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans Peau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se sinapiser en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

ETABLISSEMENTS SABATIER

10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (16^e)

OVO-LÉCITHINE BILLON

Prop. thér. — L'Ovo-Lécithine agit comme un stimulant des fonctions de nutrition et d'assimilation; elle favorise l'hématopoïèse, empêche la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie contractile du cœur et des muscles, etc.

Formes et doses. — Dragées à 0 gr. 05, 4 à 6 par jour (enfants 2 à 3); granulés à 0 gr. 10 par cuill. à café, 2 à 3 par jour (enfants 1 à 2); injections intra-musculaires une par jour.

Indications. — Neurasthénie, dépression nerveuse, chlorose, anémies de toute nature, lymphatisme, cachexie sénile, période de convalescence des états infectieux.

Littérature sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

OVOMALTINE

Composition. — Matières protéiques 14,2 %, Maltose 62,8 %, Dextrines 7,8 %. Corps gras 8,2 %, Cendres 3,7 %, Phosphore organique 1,18 %, H²O 12 %. Diastases.

Forme. — Poudre irrégulière.

Indications. — *Aliment de force* pour tout organisme affaibli par le surmenage, la maladie ou la vieillesse. *Aliment remède et de régime* dans les affections gastro-intestinales. *Galactagogue* préparant et facilitant l'allaitement.

Doses. — *Enfants-Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par 20 à 25 centilitres de lait, de lait coupé d'eau, de thé, de café, etc.

Préparer sans cuisson

Ne convient pas aux Nourrissons

Etablissements WANDER

58, rue de Charonne — PARIS (11^e)

OVULES CHAUMEL

Les Ovules à la Glycérine solidifiée, et aux principaux médicaments, constituent le mode de pansements vaginaux le plus commode.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel Emménagogues (Aplol, Cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichthyol.

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (Iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tanin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Vaginites. — Ovules Chaumel ichthyol.

Etablissements FUMOUE

78, Faubourg Saint-Denis — PARIS

OVULES DERMA

Breveté S. G. D. G.

Ces ovules, au moment de la fabrication, sont stérilisés par la chaleur, en même temps qu'ils sont coulés dans des moules. — Par un procédé spécial, il se forme autour de cet ovule un épiderme non adhérent qui l'enveloppe entièrement et en assure l'asepsie complète. Cette enveloppe se détache de l'ovule aussi facilement que le blanc se détache du jaune de l'œuf coagulé. Ces ovules se préparent à tous les médicaments usuels et sont vendus au même prix que les ovules ordinaires.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

OVULES " ROCHE "

au Thigénol à 30 %

(Voir également page " Thigénol ")

Prop. thér. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules " Roche "* la sédation complète des douleurs, et après quelques temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indic. thér. — Vaginite, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métorrhée, etc., etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Compos. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint, Obésité, Fibrôme, Goître et tous les états dûs à l'insuffisance Thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 dragées par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 12 fr. le flacon de 50 dragées

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Dragées dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Indications. — Troubles de la menstruation, Retentissements pathologiques de l'ovariotomie, Irrégularités, Insuffisance, Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : Le flacon de 50 dragées : 12 fr.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Compos. — Le « Pain Essentiel » est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéines du lait solubilisées.

Présentation. — En baguettes de 10 gr., représentant la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire. Chaque boîte renferme 48 baguettes.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indic. thérap. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 à 4 baguettes par repas.

Donne d'excellentes panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les Pains Spéciaux HEUDEBERT ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes. — « Pain Essentiel », avec ou sans chlorure. (Voir article spécial.)

Dyspeptie, Entérite. — Biscottes de pain grillé, Grossins. Longues. Croquettes sucrées.

Consipation. — Pain complet ou de Châtel-Gnyon.

Obésité. — Grossins. Pain de Brides.

Diabète. — Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 % d'hydrocarbonés). Pain d'Alençon (régime sévère, 15 à 20 0/0). Spécial diabétique (régime normal, 35 0/0).

Adénitisme. — Pain hypocalcisé. Pain de Vitel.

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, Spécifique total des *Maladies du Foie* et des Affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glycérimé : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique, ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase Biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholestémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite muco-membraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 2 à 12 pilules par jour, ou 1 à 6 cuillerées à dessert de 10 gr. par jour, au début des repas.

Demi-dose pour les enfants.

Echantillon, Littérature

Laboratoire de la PANBILINE

ANNONAY (Ardèche)

PANCALCINE

Médicament reminéralisateur et reconstituant
par excellence.

Formes. — Cachets (adultes), Poudre (enfants), Granulé (enfants et adultes).

Composition des cachets. — Glycérophosphate de chaux, Phosphate tricalcique, Carbonate de chaux précipité, Carbonate de magnésie, Silicate de chaux, Finorure de calcium, Tannin à l'alcool, Poudre de colombo, Pancréatine, Poudre de noix vomiques.

Composition de la poudre et du granulé. — Même composition, moins : Tannin, Poudres de colombo et noix vomiques.

Poser :

Adultes, 1 cachet au milieu des deux principaux repas, ou granulé, 1 mesure.

Enfants, 1 cuillerée à mentarde dans un liquide ou de la confiture, deux fois par jour.

Indications. — Bronchite chronique et états lymphatiques, Troubles de la croissance et de la dentition, Consolidation des fractures, Faiblesse générale et surmenage.

Laboratoire de la PANCALCINE

Louis PAPET, ex-interne des Hôpitaux de Paris

59, boulevard Pasteur, — PARIS (XV^e)

PANCRÉATOTANIC GRÉMY

Opothérapie pancréatique

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de glande pancréatique.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Diarrhées par insuffisance pancréatique. Diabète pancréatique. Insuffisance pancréatique des lithiasiques. Vomissements cycliques de l'enfance.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif; 2° Par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées, Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion; Coliques hépatiques, ictère ou Jaunisse, Angi cholites, Cholécystites, etc.

Mode d'emploi. — Le *Pangestyl* se prend : Un ou deux cachets, à la fin des repas ou au moment des malaises, dans une infusion chaude : Café, tilleul, thé, menthe, camomille.

Laboratoire Georges TINARD

134, Boulevard Péreire — PARIS (17^e)

PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 2 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaire, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dès la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxœdème, l'infantilisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

" PANHÉMOL "

Réconstituant opothérapique intégral du Sang.
Le plus riche en HÉMOGLOBINE et Principes actifs totaux du SERUM et des GLOBULES.

Formes. — Sirop. Comprimés.

Composition. — Seule préparation à base de Sang total **séché**, concentré dans le vide, à basse température, dès la sortie des vaisseaux.

Chaque cuillerée à soupe de Sirop contient, sauf l'eau de constitution, tous les éléments de 20 cc. de Sang, dont 2 gr. 60 d'Hémoglobine, et 0 gr. 01 de fer, directement assimilable.

Chaque comprimé contient tous les éléments de 2 cc. 5 de SANG et 0 gr. 05 de Glycérophosphate de soude cristallisé.

Indications. — Tous les **ÉTATS ANÉMIQUES** dont le " Panhémol " est le véritable spécifique, **CONVALESCENCES, TUBERCULOSES, HÉMORRAGIES, PALUDISME, APPAIBLISSEMENT GÉNÉRAL et TOUTES DÉCHÉANCES ORGANIQUES.**

PRIX : 10 francs le flacon de 300 cc. de Sirop ou la boîte de 100 Comprimés, représentant dix jours de traitement.

Laboratoires R. BOUYSSOU et Cie
90, avenue des Ternes — PARIS (XVII^e)

PANLACTO MIDY

Culture pure des 3 bacilles lactiques : bacille Bulgare, bacille Bifidus, bacille Paralactique à l'état vivant et actif.

Comprimés dosés à : Bacilles bulgares..... 0,02
 Bacilles bifidi... .. 0,02
 Bacilles paralactiques 0,02

Mode d'emploi. — 3 à 8 comprimés par jour, soit à la fin du repas, soit au petit déjeuner et dans un verre d'eau lactosée (5 grammes) le soir avant de se coucher.

Prop. therap. — Détruit toutes les fermentations microbiennes, antiseptise et tonifie les intestins.

Indic. — Affections intestinales : diarrhées infantiles, gastro-entérites, entéro-colites, etc.

Vente au détail : 140, Faubourg-St-Honoré, PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

PANTOPON " ROCHE "

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon "Roche"
 = 0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
 = 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
 = 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi. — Voie buccale :

PANTOPON " ROCHE " SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon "Roche" par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.
 Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON " ROCHE " COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0.01 ctg. de Pantopon "Roche").

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.
 Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

Voie hypodermique :

PANTOPON " ROCHE " AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon "Roche").

Boîtes de 6 et 12 Ampoules

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.
 Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

PAPAÏNE

de TROUETTE PERRET

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du Carica Papaya, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications :

Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Elixir "TROUETTE-PERRET" à la Papaïne :

Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets "TROUETTE-PERRET" à la Papaïne.

Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés "TROUETTE-PERRET" à la Papaïne.

Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.

Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.

À souvent réussi après échec de toute autre médication.

Bien formuler : *Elixir - Sirop - Cachets - Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Etablissements TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels, 15

PARIS (11^e)

PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure
sans saveur.

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

Indications :

Constipation opiniâtre, Colites, Enté-
rocolites, Appendicites.

Littérature et Echantillons :

Pharmacie HAMEL

LE MANS

à PARIS : Laboratoires BRUNEAU & C

17 bis, rue de Berri

Téléphone : Elysées 61-46

PARATHYROCALCINE "MONCOUR"

REMINÉRALISATION

Fixation des SELS de CALCIUM
par l'utilisation, comme *MORDANT*,
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, seps-
fule, convalescence, croissance, fractures,
affections osseuses, art dentaire, et, en
général, toutes affections avec déminérali-
sation.

*Notre Extrait total Parathyroïdien, élément
essentiel de la médication, est préparé avec
des glandes soumises à un contrôle histo-
logique régulier.*

Cachets : 1 à 3 par jour.

Comprimés : 2 à 6 —

Produits Opothérapiques " MONCOUR "

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Prop. thérap. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Dosologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Dose prise par jour)	Enfants de moins de 1 an. :	X à XXX gouttes
		— de 1 à 5 ans. :	XX à LX gouttes
		— 5 ans et au-dessus :	XX à cent gouttes
		Adultes. :	XXX à cent gouttes

THIRIET & C^{ie}

26 et 28, Rue des Ponts — NANCY

PASTILLES CITON

Pastilles à la menthe contre la constipation. Aussi agréables à prendre qu'une pastille de menthe et agissant sans douleur.

Indications thérapeutiques :

Toutes constipations passagères ou invétérées.

Prix : 3 francs la boîte

Echantillons (une ou plusieurs boîtes), gratuitement à la disposition de MM. les Docteurs.

Georges STAMBACH

rue Schlumberger, à COLMAR (Alsace)

PASTILLES LAXATIVES

CHATEL GUYON MIRATON

Laxatif doux aux sels Naturels de la Source Miraton, Châtel-Guyon, alliés à l'Encélatine.

Action. — Action réparatrice sur la fibre lisse de l'intestin, réveil de la fonction digestive, retour des sécrétions, biliaires surtout.

Emploi. — Une ou deux pastilles suçées en se couchant soulagent l'intestin sans action fâcheuse sur le tube digestif, sans retentissement sur le cœur et les reins.

Echantillon gratuit sur demande

aux Établissements MIRATON, Châtel-Guyon

Dépôt à Paris : 13, boul. Saint-Germain

PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques.

Injectons intra-veineuses :

Pélospanines A ampoules de 2 cc

Pélospanines B ampoules de 4 cc

Injectons intra-musculaires :

Pélospanines C, ampoules de 2 cc
(associat. lipoidique)

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boul^d de l'Hôpital — PARIS (5^e)

PEPTO-FER du D^r JAILLET

à base de Chloropeptonate de Fer

Elixir aromatisé

très agréable à prendre

Propriétés. — Tonique, digestif, re-constituant, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

Indications. — Traitement des Anémies, de la Chlorose.

Dose et mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur immédiatement après les deux principaux repas.

Société des Produits SCHAFFNER

13, Rue Pavée, 13

PARIS

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment

Liqueur très agréable contenant le suc de Kola fraîche.

Dose et Mode d'emploi :

1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications :

Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique et curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine. Somnolence, frissons, lourdeur après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Dose. — Deux Comprimés une heure avant chaque repas.

Laboratoires DURET & REMY

5, avenue des Tilleuls — PARIS (XVIII)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer

Gouttes concentrées, Elixir, Vin.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 10 à 30 gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas ; Enfants : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Prop. thér. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

PEPTONE VASSAL

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf
 Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour, dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Etablissements Léon DANJOU -- LILLE

PÉRISTALTINE CIBA

Composition et Propriétés. — Extrait du *Rhamnus Purshiana* (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm³ 1/2).

Ne produit pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation chronique. Atonie intestinale. Atonie post-opératoire. (Injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention).

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés, 1 à 2 ampoules. — Enfants : 1/2 à 1 1/2 comprimés, 1 ampoule — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

Prix :

Le tube de 20 comprimés..... 2 fr. 50
 La boîte de 5 ampoules..... 10 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

PERLES TAPHOSOTE

LAMBIOTTE Frères

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tanno-phosphate de créosote.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : 5 perles par jour à n'importe quel moment de la journée.

Enfants : 1 à 2 perles par jour jusqu'à l'âge de 6 ans. 2 à 3 perles par jour de 6 à 12 ans. 3 à 4 perles par jour de 12 à 16 ans.

Ces doses sont suffisantes. On peut les augmenter de moitié sans inconvénient.

Dans les bronchites chroniques, traiter pendant 10 jours, cesser pendant 5 jours, puis recommencer le traitement jusqu'à complète guérison, en l'interrompant tous les 10 jours pour le reprendre 5 jours après.

Indications :

Maladies des voies respiratoires, affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques. Aucune contre-indication.

Prop. théér. :

Asséchant bronchique, bactéricide, dynamogène, sclérogène et modérateur des échanges respiratoires.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8^e)

Téléphone Wagram 14-73

PERSODINE LUMIÈRE

Constitution. — Préparation stable de persulfates alcalins purs, obtenue par procédés spéciaux dans les Laboratoires Lumière.

Propriétés. — Préparation eupeptique exerçant une stimulation générale sur les fonctions de la nutrition. Elle excite l'appétit, facilite la digestion et l'assimilation, et provoque aussi l'augmentation rapide de l'embonpoint et du poids.

Indications. — Inappétence (Arnozan), Anorexie (Huehard), Tuberculoses pulmonaires et osseuses (Hobbs), Rachitisme, Dyspepsie (Robin), excepté dans les formes hyperchlorhydriques.

Emploi et doses. — Donner 2 fois par jour, une demi-heure avant les principaux repas, dans un quart de verre d'eau pure :

Adultes : 3 comprimés de Persodine Lumière.

Enfants : 1 à 2 comprimés.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER Pharmacien

. 9, cours de la Liberté — LYON

PHLYCTOL

Spécifique contre les *brûlures*, le Phlyctol n'est ni toxique, ni irritant, et possède des propriétés analgésiques qui font disparaître la douleur dès l'application des premières compresses. C'est un cicatrisant de premier ordre, et, à ce titre, il donne aussi d'excellents résultats dans le traitement des engelures et des crevasses.

Formes. — Bidons de 60 gr., de 125 gr., de 250 gr., de 500 gr. et de 1.000 gr.

Laboratoires **ROBERT & CARRIÈRE**

37, Rue de Bourgogne — PARIS

Téléphone : SÉCUR 29-49 ; FLEURUS 13-09

PHOSOFORME

Acide éthylphosphorique

Forme. — Solution.

Prop. therap. — Acide phosphorique nouveau, assimilable, tolérance gastrique absolue, toxicité nulle, correcteur des troubles de la nutrition.

Indic. therap. — Etats dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Gravelle. — Convalescences : Grippe, etc. — Tuberculose. — Phosphaturie. — Hypoacidité urinaire. — Asthénie.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 3 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de vin blanc ou rouge, sucré ou non, à prendre au cours des repas.

Laboratoires
de Biologie et Physiologie appliquées

D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

PHOSOTE LAMBIOTTE Frères

Phosphate de créosote chimiquement pur et complètement assimilable, livré en boîtes de 7 ampoules de 1 c. c.

Les piqûres sont absolument indolores si elles sont faites profondément et en plein muscle.

Dose et mode d'emploi :

Injection intra-musculaire dans la région fessière de préférence.

1 c. c. chaque jour soit 1 ampoule, ou

2 c. c. tous les deux jours soit 2 ampoules de 1 c. c. ou 1 de 2 c. c.

3 c. c. tous les trois jours soit 3 ampoules de 1 c. c. ou 1 de 3 c. c.

Vingt et un jours de ce traitement et neuf jours de repos et ainsi de suite jusqu'à guérison ; la semaine qui précède le repos, il est bon d'injecter 3 c. c. tous les 3 jours.

Prop. théér. :

Modificateur direct des lésions, astringent, anticatarrhal, possède un grand pouvoir asséchant, tonifie l'organisme.

Indications :

Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Contre-Indication :

S'abstenir de la médication arsenicale.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8^e)

Téléphone Wagram 14-73

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servis aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 Avril 1894).

Formes et Doses. — *Solution gazeuse:*
(de chaux, de soude ou de fer)
2 à 4 cuillérées à soupe par jour.

Granulé (de chaux, de soude, de fer ou composé):

2 à 4 cuillérées à café par jour.

Injectable (de chaux, de soude ou de fer):
1 à 2 injections par jour.

Propriétés. — Double action reconstituante:

1^o *Action reminéralisatrice*, par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci;

2^o *Puissante action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement: Croissance Débilité, Anémie, Neurasthénie, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Surmenage, Convalescences.

Nota. — Ce traitement reconstituant s'associe utilement et sans contre-indications à de nombreuses autres médications: opératoire, sérothérapique, iodurée, arsenicale, mercurielle, anti-paludique.

Etablissements JACQUEMAIRE

M. MIGUET, Docteur en Pharmacie

VILLEFRANCHE (Rhône)

PHOSPHATINE FALIÈRES

Aliment des enfants, des vieillards,
des surmenés, des convalescents.

Semploie, pour les enfants, dès l'âge
de 7 à 8 mois, surtout au moment du
sevrage et pendant la croissance.

Associée au lait frais, la *Phosphatine
Falières*, constitue une bouillie, d'un
goût très agréable, de digestion
facile.

Chaque cuillerée à bouche contient
0 gr. 20 gr. de phosphate bicalcique,
assimilable.

G. PRUNIER & C^{ie}

6, Rue de la Tacherie — PARIS

PHOSPHO-GAÏACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques
assimilables, avec addition de thiocol,
acide arsénieux et arséniate de stry-
chnine.

Prop. therap. — Modification rapide
des sécrétions bronchiques. Dispari-
tion de la toux, de l'expectoration,
des engorgements ganglionnaires et
du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de
granulé, très agréable au goût, à la
dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Laboratoire LAVADOIX

32, rue de l'Ouest — PARIS

PHOSPHORGANE

Nouveau médicament à base de phosphate nucléiné et d'arrhénal

Forme. — Elixir.

Reconstituant de premier ordre, trouve son indication dans tous les cas de : *Neurosthénie, Surmenage physique et intellectuel, Anémie, Lymphatisme, Troubles de naissance, Convalescences, etc., etc.*

Adultes : 1 cuillerée à soupe, au moment du repas.

Enfants : 1 cuillerée à café, au moment du repas.

Laboratoires F. BERNAMONT

87, rue du Commerce — NEVERS (Nièvre)

PHOSPIRINE

Acide Monométhyl
et Monoéthylphospho-salicylique

Forme :

Comprimés de 0 gr. 50.

Présentation :

Boîte 20 cachets de 0,50.

Tubes de 20 comprimés à 50 cgt.

Indications thérapeutiques :

Antirhumatismal nouveau.

Propriétés thérapeutiques :

A dose égale à l'Aspirine : 1° Action sédative plus accentuée et plus rapide;

2° Tolérance gastrique très supérieure;

3° Trois fois moins toxique.

Posologie :

2 à 6 Comprimés

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, Rue de Marly — RUEIL (S.-et-O.)

PHYLACTONE BYLA

Peptone spéciale à polyvalence protéinique et riche en polypeptides.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Les Etablissements BYLA

26, Avenue de l'Observatoire, 26
PARIS

PHYSÉINE GRÉMY

Principe actif du lobe postérieur de l'hypophyse.

En ampoules de 1 cc. correspondant à 0,20 cgr. de lobe postérieur de l'hypophyse.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées ou intraveineuses.

Prop. thér. — Action élective sur les fibres musculaires lisses et sur la musculature de l'utérus.

Indic. — En obstétrique : inertie utérine ; hémorragies de la délivrance.

En médecine : hypotension vasculaire ; cœur défaillant.

En chirurgie : shock et hypotension sanguine ; hémorragies.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

PHYSIOSTHÉNINE

sérum leucogène.

Forme. — Ampoules.

N° 1 50 cc. dose moyenne.

N° 2 50 cc. dose faible.

N° 3 20 cc. dose de soutien.

Indic. thérap. — Grippe, Angine, Bronchopneumonie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale et toutes les infections, quel que soit le siège, quel que soit le microbe, excepté tuberculose et cancer.

Pas de réaction sérique.

Toxicité nulle,

Injectons à la seringue.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise)

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Comp. — Phosphate organique de quinine contenant 57 % de quinine et 11 % de phosphore. Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré.

Indicat. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Fièvre typhoïde et maladies infectieuses. Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Mêmes que sulfate ou Chlorhydrate de quinine.

Prix. — Le tube de 20 comprimés, 3 fr. —

Le flacon de 50 comprimés, 6 francs.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

PHYTINE CIBA

Comp. — Produit naturel extrait des graines végétales contenant 22 % de phosphore en combinaison organique. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Apéritif puissant. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoïèse.

Indicat. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences difficiles, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Doses. — Adultes : 1 gr. par jour : 2 cachets, 4 compr., 2 cuillerées à café granulé. — Enfants : 25 cgr. à 50 cgr. par jour.

Prix. — Cachets et comprimés : la boîte, 5 fr. 50. — Granulé : le flacon, 7 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

PHYTOL

Vitellinate argento-cuprique ou argyro-cuprol,
antiseptique des muqueuses

(Spécifique de la Blennorrhagie)

Par sa richesse en argent, le « Phytol » a une action spécifique sur le gonocoque qu'il détruit en quelques injections.

Par l'action combinée du cuivre et de l'argent à l'état colloïdal, il est aussi efficace contre les associations microbiennes, si fréquentes au cours de la gonorrhée.

Le « Phytol » est indolore et fait immédiatement disparaître la sensation de brûlure à la miction.

APPLICATIONS du PHYTOL aux diverses formes de la Blennorrhagie

1° BLENNORRAGIE chez l'HOMME

Stade initial de suppuration :

L'écoulement date au maximum de 48 heures.

L'urèthre postérieur est indemne.

Phytol en Ampoules dosées ou en Poudre. (Il en faut de 28 gr. pour préparations extemporanées)

TRAITEMENT ABORTIF

2 à 3 injections quotidiennes à 20 %, puis à 10 %.

Faire précéder l'injection d'un lavage du canal avec **Phytoline Albarran**, à la dose de 5 gr. pour 2 litres d'eau.

Stade d'évolution aiguë :

L'écoulement est abondant.

L'urèthre postérieur est supposé atteint.

Phytoline Albarran

Pour grands lavages uréthro-vésicaux (suivant la technique du Docteur Janet) ; 5 gr. pour 2 litres d'eau bouillie, 2 lavages chaque jour.

Etat chronique :

Suintement persistant, surtout le matin.

a) **Littrite et Cowpéríte.**

b) **Prostatite et Vésiculite.**

Tubes-Seringues de Glyco-Phytol.

Massages de l'urèthre directement sur le topique ou sur béniqué après avoir rempli le canal de **Glyco-Phytol**. Faire avant ou après le massage un lavage uréthro-vésical (**Phytoline Albarran**).

Injecter du **Glyco-Phytol** dans la région du veru montanum, masser les vésicules et la prostate. Terminer par un lavage uréthro-vésical (**Phytoline Albarran**).

Cystites.

Phytoline Albarran.

Instillations : **Phytoline Albarran** étendue de 5 à 10 fois son volume d'eau.

Lavages vésicaux : **Phytoline Albarran**, 5 gr. pour 1 ou 2 litres d'eau bouillie.

2° BLENNORRAGIE chez la FEMME

Métrites aiguës et Vulvo-Vaginites.

Phytoline Albarran, Ovules.

Injectons vaginales : **Phytoline Albarran**, 5 gr. pour 1 ou 2 litres d'eau bouillie.

OVULES DE « PHYTOL ».

Métrites chroniques.

Tubes injecteurs de Gynéco-Phytol.

Injectons utérines de **Gynéco-Phytol**.

Injectons vaginales : **Phytoline Albarran**, 5 gr. pour 1 ou 2 litres d'eau bouillie.

Ovules de **Phytol**.

Une cuillerée à café de *Phytoline Albarran* = 5 grammes.

Une cuillerée à café de *Phytol en poudre* = 6 grammes.

LABORATOIRE P. ALBARRAN

3, Rue Chané, PARIS-AUTEUIL

PHYTOTHÉRAPIE COIRRE

Préparations de plantes fraîches stabilisées
marque « STASIMA »

AIL. — Médication hypotensive, et pulmonaire.

Alcoolature. — Médication hypotensive, XX à XXX gouttes par jour.

Médication pulmonaire, XXX à L gouttes par jour.

Pilules. — Médication hypotensive, 2 à 4 par jour.

Médication pulmonaire, 4 à 8 par jour.

MARRON D'INDE — Vaso-constricteur et analgésique. — Alcoolature : XXV à XXX gouttes par jour.

Autres préparations : Cupressus, gul.

Laboratoires du Dr COIRRE

5, Boulevard du Montparnasse — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

PILULES DE BLANCARD

A'Iodure de fer inaltérable, Approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 cgr. d'iodure de fer.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

Prop. thér. — Agent incomparable d'Hématopoïèse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de gripes infectieuses, etc.

BERTAUT-BLANCARD Frères

64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

PILULES du D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Affections hépatiques. — Lithiase biliaire. — Insuffisance hépatique. — Entéro-colite.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

PILULES DOUMER

Dosées à 0,05 cg. de Bleu de méthylène chimiquement pur.

(Spécialité française créée en 1894.)

Indications :

Névralgies, Névrites, Sciatique, Angine de poitrine, Grippe, Entérite bacillaire, Blennorrhagie, Cystites, etc., etc.

Pharmacie BOMEL

ANNONAY (Ardèche)

PILULES GIP

Oxalate de fer 0,10; Extrait de Quinquina rouge 0,05; Intrait de gentiane 0,01.

Dose et Mode d'emploi. — 4 pilules par jour (2 avant chaque repas); dans les cas graves aller jusqu'à 6 par jour. — Enfants : 3 pilules par jour suivant âge.

Prop. Thér. — Spécifiques de l'Anémie et de la faiblesse; régénératrices du sang et des nerfs.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Lassitude, Vieillesse, etc.

Laboratoire H. NOGUÉS

11, Rue Joseph-Bara — PARIS (6^e)

PILULES D'HERMAL

BRETONNEAU

Ces pilules ne donnant pas d'hydrargirisme parce qu'enrobées au gluten, sont très souvent employées à côté des injections mercurielles et même à côté des injections de 606 et de néosalvarsan. Voici leur formule :

Bi-iodure de Mercure.....	0,01
Iodure d'Arsenic.....	0,002
Correctif spécial.....	0,30

Nous croyons devoir prévenir Messieurs les Docteurs que les flacons de vente de *Pilules d'Hermal* ne sont accompagnés d'aucune notice.

Henri RIVIER, succ^r de LANCELOT & C^{ie}
26-28, Rue St-Claude — PARIS

PILULES PHILIPPE

Potassium — Sodium

Forme. — En *pilules kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 20 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

	(à 0,50
Pilules Philippe à l'iodure de potassium	(à 0,20
	(à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les Pilules Philippe à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium..... à 0,20

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies
Tension artérielle, Goitre, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur PHILIPPE

14, rue du Palais Grillet — LYON

PILULES PURGATIVES DU DOCTEUR DEHAUT

à base de Scammonée, aloès et Coloquinte

Tandis que les purgatifs salins ou l'huile de ricin provoquent la répugnance des malades par leur mauvais goût ou les préparatifs qu'exigent leur emploi, les pilules Dehaut, au contraire, d'un aspect agréable, sont faciles à prendre et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

Elles se prennent en mangeant.

Dose purgative : 2 à 3 pilules ;

Dose laxative : 1 à 2 pilules

Pharmacie DEHAUT

147, Faubourg Saint-Denis — PARIS

PILULES RÉDUCTRICES MIRATON-CHATEL-GUYON

Réductrices aux sels naturels de la Source Châtel-Guyon-Miraton, alliés aux extraits marins.

Action :

Traitement de l'obésité sans le moindre danger.

Emploi :

Dix à douze pilules par jour, dans une gorgée d'eau, le matin et le soir.

*Echantillon et littératures sur demande
aux Etablissements*

MIRATON CHATEL-GUYON

PILULE

du Docteur SEJOURNET

antidiabétiques

Indications therap. — Traitement du
DIABÈTE sans régime rigoureux
spécial.

Doses et Mode d'emploi. — Pilules
dosées à 0 gr. 02 de Santonine.

1 Pilule à chaque repas.

Docteur M. LEPRINCE

62, rue de la Tour — PARIS (16^e)

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} < \begin{smallmatrix} \text{CH}^+ \\ \text{CH}^+ \end{smallmatrix} > \text{NH}$, alcalin
organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au
Codex Français 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr. Pipérazine
pure par cuillerée à café.

Doses et Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à
café par jour comme préventif; 4 à 6 cuillerées
à café par jour, crises aiguës, dissoute dans un
verre d'eau à distance des repas.

Prop. Ther. — Dissout 92 % des composés de l'acide
urique; réduit les déchets uratiques en stimulant
l'activité hépatique; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à pres-
crire dans les manifestations de l'Arthritisme et
de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle,
Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques,
Sciatique, Artério-sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, Innocuité absolue sur cœur,
estomac, vaisseaux.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (17^e)

PLURION COUTURIEUX

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic fer, manganèse et vanadium, isotonique indolore, non toxique, en ampoules de 2 et (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoiétique et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer) à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les anémies GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDEENS, SYPHILITIKES, CANCEREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

PNEUMOBIOI

Composition :

Ess. Camphora monobromée.....	00290
Para-isopropyl méta-crésol.....	00031,50
Oilum ess. Cajepul (Majalencine).....	00283
Oilum vol thymus serpyllum (déterpénés).....	00001,50
Oilum vég. neut orthof. éthylée à 4 0/0...	00421

Forme. — Ampoules de 6-7 cc. livrées en boîtes de 10 et de 6.

Propriétés thérap. — Antispasmodique et stérisateur pulmonaire puissant. Produit type pour le lavage des bronches.

Mode d'emploi. — En injections pulmonaires par voie trachéale (méthode de choix), en insufflations, pulvérisations,

Indications. — Asthmes, Tuberculose pulmonaire, Emphysème, Bronchites aiguës et chroniques, Coqueluche, Gangrène pulmonaire, Bronchopneumonie, Dilatation bronchique, Rhume de foies, Laryngites, Trachéites, Conséquences pulmonaires dues aux gaz de guerre, etc...

Laboratoires des Produits PNEUMO

48, rue de Paris — VICHY

PNEUMOGÉINE RENARD

Spécifique des Dyspnées

Composition. — Symbiose d'iode, de caféine et de théobromine (chaque cuiller à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combinés à l'iode dans un véhicule qui en masque le goût.)

Propriétés therap. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, et le plus inoffensif des diurétiques ». (Huchard).

La *Pneumogéine* par son action *régulatrice respiratoire* assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ; *cardio-tonique éliminatrice*.

Indications. — Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysème, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

Posologie. — Dose journalière : 2 à 4 cuillerées à café. Verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

J. RENARD, Docteur en Pharmacie
142, avenue de Clichy — PARIS

PNEUMOTANIC GRÉMY

Opothérapie pulmonaire

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de parenchyme pulmonaire.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Affections pulmonaires chroniques, Fistules pleurales (voir Immunizol n° 16).

Tuberculose (voir Lipocytol).

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

PNOLEOL

Traitement méthodique et complet de toutes les affections des voies respiratoires par injections intra-trachéales et hypodermiques.

DEUX FORMULES :

PNOLEOL A, solution dans huile stérilisé d'essences antiseptiques non irritantes (8 %) associées à un antispasmodique (Benzoate de Benzyle).

PNOLEOL T, même formule de base que **PNOLEOL A** avec adjonction de cinnamate de Benzyle et Lipoides biliaires cholestériques.

TROIS PRESENTATIONS :

PNOLEOL, formules A et T : boîte de 10 ampoules stérilisées de 6 cm³.

PNOLEOL SPECIAL POUR PULVERISATIONS (à l'aide d'un pulvérisateur à huile), flacon de 30 cm³. Correspond comme formule au **PNOLEOL A**.

PROPRIETES DU PNOLEOL A :

Antiseptique, antitoxique, fluidifiant des sécrétions et expectorant, antispasmodique électif pour les muscles bronchiques.

PROPRIETES DU PNOLEOL T :

Antiseptique, antitoxique, immunisant, antihémolytique et reconstituant.

INDICATIONS PNOLEOL A :

Traitement de toutes les affections des voies respiratoires non bacillaires (affections à expectoration, bronchites, spasmes respiratoires, asthme humide, laryngite, coqueluche, etc.).

INDICATIONS PNOLEOL T :

Traitement de toutes les affections des voies respiratoires d'origine tuberculeuse, sous toutes leurs formes et tous leurs degrés.

DOSES, PNOLEOL A et T :

Injecter le contenu d'une ampoule par jour.

Note explicative envoyée gratuitement sur demande

Les Laboratoires NOVALIS

DUPRAZ-LAURENÇON, pharmaciens

1, Rue Chavanne — LYON

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique)

(Adrénaline, Stovaine, Anesthésine et Extrait de marrons d'Inde frais, stabilisé), Hamamelis.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les gardes-robes.

Prop. thérap. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré — PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll, 4
PARIS (17^e)

POTION BOISSEL

Indications. — Spécifique contre la Coqueluche, les toux spasmodiques et grippales. Calme très rapidement la Toux et guérit la Coqueluche en vingt jours.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, antispasmodique puissant. La POTION BOISSEL ne contient ni toxique ni stupéfiants et peut être administrée aux nourrissons. Le laxatif à donner en même temps que la POTION BOISSEL, supprime les vomissements et permet aux malades de profiter de leurs aliments. La POTION BOISSEL se prend dans un peu d'eau sucrée.

Forme. — Gouttes concentrées. Doses : Enfants de 10 mois à 6 ans, 10 gouttes, 6 fois par jour; de 6 à 15 ans, 20 gouttes, 6 fois par jour; adultes, 30 gout., 6 fois par jour.

NOTA. — La POTION BOISSEL doit être administrée très régulièrement, même pendant le repas si c'est nécessaire.

Aucune contre-indication

Pharmacie BOISSEL

4 et 6, Cours Cicé — BORDEAUX

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudres et cigarettes anti-asthmiques

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1^{re} ch.)

Indic. therap. et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fièvre de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise ; la prévenir par une fumigation anticipée, et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 4 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laboratoire ESCOUFLAIRE, à Baisieux (Nord)
(Echantil. grat. sur demand. de MM. les Doct.)

POUDRE GEORGES

Indications. — Facilite l'absorption des Huiles de ricin et Foie de Morue.

Propriétés. — Par la mousse qu'elle produit avec l'eau, la POUDRE GEORGES forme une capsule très élastique. L'huile est absorbée sans que les muqueuses soient touchées ; il ne reste au palais qu'un goût agréable de vanille.

Doses. — La moitié du paquet pour une purgation de 30 à 60 gr. Ajouter 4 à 5 cuillerées à soupe d'eau froide. Battre le mélange avec une fourchette jusqu'à ce qu'une couche de mousse d'au moins 1 centim. soit formée. Verser l'huile de ricin et, sans agiter, absorber la préparation. — Pour l'huile de foie de morue, diminuer les proportions de Poudre et d'eau, selon la quantité d'huile à prendre.

Pharmacie BOISSEL

4 et 6, Cours Cicé — BORDEAUX

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie
antivénérienne.

Le premier créé en France sous le contrôle et
d'après les conseils des Maîtres de la vénéréo-
logie française.

Composition. — En 3 tubes d'étain de couleur
différente :

- 1° Pommade de Metchnikoff (calomel 83 %) ;
- 2° Gelée au protargol à 3 % ;
- 3° Emulsion de savon ;
- 4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (7 fr.), pour 8 à
10 applications.

Petit modèle (3 fr. 50), aspect et format d'une
boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires MARCHAND & LEROY

40, Rue d'Enghien PARIS

Téléphone Bergère 37-13

Nous vous serons reconnaissants de
nous faire connaître les modifications
que vous jugerez utiles d'apporter à
cet ouvrage.

PRODUITS DIÉTÉTIQUES FAVRICHON

Phosphogène :

De toutes les farines alimentaires la plus riche en phosphates assimilables. Convient à tous les enfants pendant la croissance, mais particulièrement aux enfants chétifs, à ceux dont la dentition est en retard ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale.

Aliment de choix des jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement.

Répare rapidement les pertes en éléments phosphatés chez les convalescents.

Crème de Cacao

Soupe de grains grillés,

Farines naturelles mélangées,

Céréales granulées, etc.

Littératures et échantillons
sur demande

J. FAVRICHON

Pharmacien - Chimiste

Usine créée en 1890 à

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
(Loire)

PRODUITS GMET

Les « Produits Gmet » sont des *Extraits végétaux liquides* obtenus par un procédé spécial (procédé « Gimbert »), sans alcool et sans acides, d'où :

ACTIVITÉ REMARQUABLE

TOLÉRANCE PARFAITE

Tous les « **Produits GMET** »

correspondent à deux grammes de plante fraîche par cuillerée à café ;

peuvent être prescrits de 2 à 6 cuillerées à café par jour, dans un peu de liquide.

Cette posologie, *facile et uniforme*, est très commode pour le praticien, dont elle soulage la mémoire.

Liste complète et littérature sur demande au

Service médical
des " PRODUITS GMET "

27, r. du Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Télép. Bergère 43-10

PROPIDON

Bouillon stock-vaccin du Prof. Pierre DELAST

Compos. — Association, en proportions définies, de cultures en bouillon de streptocoques, staphylocoques et B. Pyocyane. Vieillessement suivi de chauffage. Ces procédés d'atténuation permettent d'injecter le protoplasma microbien à doses massives.

Indicat. — Staphylococcies fébriles, anthrax, phlegmons, ostéo-périostites dentaires, ostéomyélites, annexites et pelvi-péritonites, érysipèle, lymphangites, infections pyogènes, etc..

Mode d'emploi. — Délivré par boîtes de 3 ampoules contenant chacune 4 cm³ de vaccin. On pratique, selon le cas, une à trois injections intra-musculaires d'une ampoule chaque fois, à trois jours d'intervalle. Pratiquer chaque injection à la face externe de la fesse en deux points différents. Les phénomènes locaux et généraux, parfois assez intenses, se calment après quelques heures. Effet thérapeutique rapide.

Littérature sur demande

Etablissements **POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergique.

Anémie. - Chlorose. - Débilité. - Convalescence.

Vingt gouttes de Prosthénase contiennent 1 centig. de fer et 5 milligr. de manganèse.

5 à 20 gouttes pour les enfants

10 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (4^e)

PROVEINASE MIDY

(Comprimés)

Composition :

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) des plantes stabilisées : Cupressus, Viburnum, Maron d'Inde et Hamamélis.

2° Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Propriétés therap. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapeutiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles congestifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

Etats chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.

Etats aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel Moll — PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

PROXYTOL

Association des Proxýtases des organes de digestion (Foié, Estomac, Intestin, Pancréas).

Spécifique des affections gastro-intestinales

MODE D'ACTION :

Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

INDICATIONS :

1° Les dyspepsies ; 2° Les entérites ;
3° L'insuffisance hépatique.

FORME :

Boîte de 36 comprimés.

DOSES :

De 4 à 6 comprimés par jour en deux fois : le matin à jeun et l'après-midi vers 5 heures, avec un peu d'eau.

PROXYTASES

Diastases tissulaires pures spécifiques
à chaque organe

Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation intime, permettant à l'organe déficient de restaurer ses lésions et de recouvrer ses activités physiologiques.

Action rapide, rigoureusement spécifique.

INDICATIONS :

Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

PRESCRIRE : PROXYTASES OVAIRE, PROXYTASES REIN, PROXYTASES CŒUR (Ampoules).

FORMES :

1° Boîte de 36 comprimés pour tous les organes ; 2° Pour le Cœur, le Poumon et le Rein seulement, boîte de 10 ampoules de 2 cm³.

DOSES :

Proxýtases de Foié et de Poumon : de 4 à 6 comprimés par jour. Autres Proxýtases : de 2 à 4 par jour, à prendre en deux fois, le matin à jeun et l'après-midi vers 5 heures.

AMPOULES :

Une à deux par jour en injections (sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

21, Rue d'Aumale — PARIS (IX^e)

PSINASE GRÉMY

Erepsine et ferments peptonisants.
en Pilules

Doses et mode d'emploi. — Prendre 2 ou 3 pilules 1/2 heure ou 1 heure avant chacun des deux principaux repas.

Prop. thér. — Réalise la digestion complète de l'albumine.

Indications. — Dyspepsies et troubles consécutifs de nutrition et d'auto-intoxication. Anaphylaxie digestive.

14. Rue de Clichy — PARIS (9^e)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

PYRETHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide; Gouttes; Ampoules.

Composition. — Dérivé polyaminométhylé du Pyrazocarbamate d'éthyle.

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Val ou eau ordinaire ou sucrée, 60 c.c. avec 0,30-0 50 de bicarbonate).

Gouttes. Adultes : 25-50 à répéter à intervalles de 20'. Chercher la dose levier et passer aux doses massives 80-100, si nécessaire. Maximum : 300 *pro die*.

Enfants : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules, avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabès, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : 200 gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (25-50 à répéter), chercher la dose levier; Dysménorrhées (25-50); Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Poly-névrites, Siringomyélie (doses variables); Algies syphilitiques, Tabès, Cancer (60-80-100 gouttes, permettent de garder en médecine l'emploi de la morphine); Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (25-50, 2 fois par jour); phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques. (Post opératoire en petite chirurgie.) — Echantillons et Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET, ABLON (S.-et-O.

QUASSIA-KINA RABOT

aux Écorces d'Oranges amères

Prop. thérap. — Reconstituant énergique.
Le meilleur stimulant de l'appétit. Très
bien toléré par les estomacs les plus délicats.
Véhicule idéal de la médication iodée.

Indications. — Asthénie. Vertiges stomacaux.
Inappétence. Débilité. Convalescences.

Formes pharmaceutiques et Mode d'emploi :

VIN : Un verre à Madère aux deux principaux repas.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants, ainsi qu'aux malades chez qui le vin est contre-indiqué.

Adultes : Une cuillerée à café aux repas.

Enfants : Une demi-cuillerée à café aux repas.

C. DAVID-RABOT,

Docteur en Pharmacie

49, rue de Bâche — COURBEVOIE (Seine)

QUIÉTOL

Bromhydrate de diméthylaminovaléryloxy-
isobutyrate de propyle

Le *Quiétol* peut être employé dans tous les cas
où il faut calmer une douleur nerveuse,
ou un système nerveux surexcité.

Bien qu'il ne soit pas un hypnotique au sens
vrai du mot, son action est très favorable
dans les cas d'insomnie nerveuse.

Aux doses courantes, ce produit n'a aucune
toxicité, il est sans action nuisible sur les globules
sanguins. Ni éruption ni intolérance.
Son emploi ne rencontre aucune contre-
indication.

Mode d'emploi et doses. — Un à quatre
cachets de 0 gr. 50 par jour, suivis d'absorption
d'une certaine quantité de liquide.

Littérature sur demande

Établissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple -- PARIS

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina

Solution sans alcool, correspondant à
0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à
soupe.

Mode d'emploi :

Deux à trois cuillerées à soupe
par jour, avant chaque repas.

Propriétés :

Anémiés, convalescents, tubercu-
leux, opérés, et dans tous les cas où
l'organisme doit être tonifié.

P. FOURNIE

pharmacien de 1^{re} classe

3, place de la Miséricorde — LYON

QUINA-FER MECHLING

Composition et Forme. — Préparation sous
forme de liqueur d'un goût agréable. Con-
tient les principes actifs du quinquina, du
saccharo- citrate de fer, des toniques
amers et apéritifs.

Propriétés. — Tonique hématogène, stimu-
lant, reconstituant, apéritif. Elève rapide-
ment le nombre des globules rouges. Ne
fatigue pas l'estomac, ne constipe pas.

Indications. — Anémie, Chlorose, Débilité,
Anémie palustre, Anorexie, Surmenage,
Convalescences. Suites opératoires.

Mode d'emploi. — 1 verre à liqueur 2 à 3 fois
par jour, une demi-heure avant les repas.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoire MECHLING

MULHOUSE

“ QUINBY ”

Quinio-Bismuth « Formule Aubry »
Adopté et employé dans les Hospices
et dans les Hôpitaux civils et mili-
taires français.

Iodo-Bismuthate de Quinine stable en
suspension huileuse à 10 gr., 100 cm³
stérilisée et prête pour l'emploi.

Propriétés thérapeutiques :

Non toxique. — Spécifique extrê-
mement puissant de la *Syphilis* à
toutes les périodes.

Influence surprenante sur les lésions
de la *Syphilis nerveuse* de l'hérédo-
syphilis, par action combinée de
l'iode, de la Quinine et du métal
spécifique, le *Bismuth*. Action re-
marquable sur les ganglions. Tolé-
rance parfaite. *Pas de douleur à
l'infection. Pas de stomatite.*

Posologie :

Adultes : Pratiquer douze injec-
tions de 3 cm³.

Enfants : Pratiquer douze injec-
tions de 2/10 de cm³ par année
d'âge.

Ces injections devront être intramus-
culaires profondes et faites dans la
région fessière haute, à 3 jours
d'intervalle (consultez notre nou-
velle littérature).

Se méfier des contrefaçons

Exiger “ Formule AUBRY ”

Echantillons et littératures

Laboratoires CANTIN

à Palaiseau (Seine-et-Oise) France

QUINÉASE

Boîte de :			
12 Amp.	dosées à 25 egr.	de Phosphoformate de	quinine
12 —	à 50 egr.	—	—
20 Comp.	de 25 egr.	—	—
10 —	de 50 egr.	—	—

Propriétés thérapeutiques. — **TOXICITÉ :** Quatre fois moindre que le chlorhydrate du même sel. Jamais d'eschares.

Diffusibilité. — Infinitement supérieure. 20 minutes au maximum, après l'injection, le goût de quinine est perçu dans la bouche.

L'injection ne provoque pas, ou peu, de nodosité, preuve manifeste de la diffusibilité.

Mode d'emploi. — Injection, soit dans un muscle, soit dans le tissu cellulaire sous-dermique. L'injection est indolore.

Laboratoires D. DROUET & PLET

37, rue de Marly, à RUEIL (S.-et-O.)

QUINEINE

Extrait intégral des principes
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassée de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour, dose fébrifuge: 1/2 cuill. à café.

Laboratoire des Produits Scientia

10, Rue Fromentin, 10

PARIS

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine.

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 0/0 de sels basiques ou neutres).

Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques
Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules, 6 et 12 ampoules de 0,25 et 0,50.

Cachets, 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés, 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Laboratoires H. LACROIX

V. Mérobian, Successeur

29 et 31, Rue Philippe-de-Girard — PARIS (10^e)

QUINOÏDINE DURIEZ

Dragées contenant chacune 0,10 quinoïdine.

Tonique et fébrifuge. Supérieure à la quinine contre les récidives des fièvres intermittentes et la cachexie tellurique (Docteur Burdel, *Union Médicale*, novembre-décembre 1878, etc.), sans ses inconvénients habituels (bourdonnements d'oreilles, troubles gastriques), malgré l'usage prolongé.

V. *Bull. Académie de Médecine*, 21 mai 1878
Communication du Dr Burdel. — Communications des Drs Le Moine, Dardenne, Dujardin-Baumetz, etc., etc. — NOTICE sur demande.
1 à 6 dragées par jour pendant 2 à 3 semaines.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

QUINQUINA GMET

Extrait total de Quinquina Succirubra
Préparation liquide sans Alcool corres-
pondant à 2 gr. de plante par cuill.
à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et Mode d'emploi. — 2 à 8 cuill.
à café par jour dans eau, vin, bière,
etc., 1/2 heure avant le repas.

Prop. Thér. — Apéritif, Fébrifuge,
Tonique.

Indications. — Anorexies, Pyrexies,
Paludisme, Grippe, Anémie, Chlorose.

Littérature et échantillons sur demande
au Service Médical des

Produits GMET

27, Faubourg Montmartre, — PARIS (9^e)
Tél. Bergère 43-10

Ce n'est pas nous que vous devez
remercier, si cet ouvrage vous rend
service, ce sont les Spécialistes qui
en font les frais. Et vous ne pouvez
mieux le faire qu'en prescrivant leurs
produits.

RECONSTITUANT MARY

Prop. thérap. — Tonique de premier ordre. Grande richesse thérapeutique : Quina, coca, kola, gentiane, quassia, cacao, noix vomique. Fer organique et Phosphates.

Traitement curatif des Anémies, Lymphatisme, Anorexie, Convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. — Demi-dose pour enfants.

Laboratoire LAVADOUX

32, rue de l'Ouest — PARIS

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice, Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Laboratoire de la Varilaxine

164, Rue Saint-Honoré, 164

PARIS

RECTOPANBILINE

Forme. — Solution.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* glycérimé.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (Troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts : Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Une à trois cuillerées à café dans 160 grammes d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder 10 à 30 minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Echantillon, Littérature
Laboratoire de la PANBILINE
ANNONAY (Ardèche)

RÉGÉNÉRATEUR PULMONAIRE

DU D^r O. BOUYER

à base de Phénol synthétique
chimiquement pur

Liquide dosé à raison de 0 gr. 05 par cuill.
à bouche, sans causticité et parfaitement
toléré par les estomacs les plus susceptibles.

Doses. — 4 cuill. à bouche pour les grandes
personnes; 4 cuill. à dessert pour les
enfants de 7 à 14 ans; 4 cuill. à café pour
les enfants de 2 à 7 ans.

Indications. — Toutes les affections chroni-
ques et secrétantes des voies respiratoires.

8,80 le litre et 5,50 le 1/2 litre avec remise
de 25 % pour les Pharmaciens

BARTHÉLEMY & Cie

5, Rue Dugommier — NANTES

RÉGYL

(à base de peroxyde de magnésium hydraté,
de fluorure de sodium et de ferments digestifs.)

Mode d'emploi. — Un ou même deux com-
primés après chaque repas. Doubler la dose
dans les états aigus.

Présentation. — Sous forme de comprimés
pesant chacun 0 gr. 60.

Propriétés. — Régulateur de l'estomac, gas-
tralgie, dyspepsie, flatulences, fermenta-
tion, pesanteur, renvois, crises stomacales
tenaces.

Échantillons sur demande.

Laboratoire Central FIÉVET

53, rue Réaumur — PARIS

RÉNALEPTINE

Adrénaline pure — Lévogyre
Dioxy-phényléthanol-méthylamine

Sous le nom de *Rénaleptine* nous présentons une Adrénaline très pure dont, en dehors des constantes physiques et chimiques, nous déterminons les constantes physiologiques; toxicité et pouvoir vaso-constricteur.

Nous pouvons donc donner la plus formelle garantie de son activité thérapeutique et de la constance de celle-ci.

Indications médicales. — Insuffisance surrénale, défaillance cardio-vasculaire et hypotension, crises nitritoïdes.

Indications chirurg. — Dans tous les cas où une ischémie locale temporaire est nécessaire.

Présentations :

En flacons de 15 gr. d'une solution au millième.

En boîtes de 10 ou 5 ampoules de 1 cc., marque *Pragma*, pour injections hypodermiques contenant 1 milligr. ou 1/2 milligr. de Rénaleptine par cc.

Littérature franco sur demande.

Les Etablissements **POULENC Frères**
92, rue Vieille-du-Temple — PARIS (3^e).

RENOTANIC GRÉMY

Opothérapie rénale

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de parenchyme rénal.

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Néphrites chroniques, Hypertension artérielle avec Insuffisance rénale, petite manifestation de l'urémie chronique.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

RESYL

Antiseptique pulmonaire

Comp. et Prop. — Ether glycéro-galacologique soluble, non caustique, se décomposant pendant la traversée digestive et mettant en liberté du galacol à l'état naissant. Modificateur des sécrétions bronchiques; sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, la température s'abaisse, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indicat. — Toutes les formes de tuberculose pulmonaire ouvertes ou fermées, avec ou sans température. Bronchites et toutes affections de l'appareil respiratoire en général.

Doses. — Se prescrit sous forme de sirop, de comprimés ou d'ampoules, soit : 2 à 6 cuillerées à café de sirop, de 2 à 6 comprimés. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Prix : Le flacon sirop : 6 fr.

Le tube de 20 comprimés : 4 fr.

La boîte de 12 ampoules : 8 fr.

D. ROLLAND, Phar., 1, place Morand - LYON

RHAGADINE BRACQUEMOND

à base de KÉRATINE

Forme. Tubes aseptiques.

Prop. therap. — La *Rhagadine*, à base de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

Indic. therap. — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, déchirures du périnée, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Pharmacie BRACQUEMOND

71, Avenue de Villiers — PARIS (17^e)

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccin curatif antigonococcique

Constitution. — Corps bacillaires rigoureusement stérilisés et enrobés dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver inaltérés jusqu'au niveau de l'intestin, où leur absorption détermine un processus naturel de défense organique.

Indications. — Agit efficacement contre tous les états infectieux, d'origine gonococcique chez l'homme et chez la femme (blennorrhagie, orchite, métrite, salpingite, salpingo-ovarite, rhumatisme gonococcique).

Doses. — 4 à 6 sphérules par jour, loin des repas. Aucune réaction locale ni générale.

Produits spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

RHESAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle. Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi :

En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications :

Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (8^e)

RHINARGYNE

Composition :

Solution isotonique de collargol adréaliné.

Propriétés :

Association sous une forme stable des propriétés vaso-constrictrices de l'adrénaline et catalytiques de l'argent colloïdal.

Indications :

Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Une à deux gouttes dans les narines, matin et soir.

Pharmacie DEBŒUF

10, Rue Washington — PARIS (VIII^e)

RHINO-MENTHOL

BAUME ^{p^r} l'ANTISEPSIE NASALE

Seul procédé pratique, Bout spécial stérilisable

Souverain contre

les Rhumes, le Coryza, les Rhinites et les Maladies du nez et de la Gorge. Préventif de la Tuberculose, des maladies infectieuses, grippe, etc., de toutes les affections d'origine nasale et de leurs complications auriculaires.

Prix : 2 fr 50

Dépôt : **C. CARTILLIER, Pharmacien**

48, Rue de Berri — PARIS

RHODARSAN

(Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène sulfoxyate de soude.)

(914) « **USINES du RHONE** »

Préparation spéciale lui assurant une grande régularité d'action. — Contrôle chimique et physiologique rigoureux.

Facilement toléré

Dose - 0 - 0 gr. 10.

Dose I - 0 gr. 15

Dose II - 0 gr. 30

Dose III - 0 gr. 45

Dose IV - 0 gr. 60

Dose V - 0 gr. 75

Dose VI - 0 gr. 90

Dose VII - 1 gr. 05

Doses de 3 gr. et 4 gr. 50

(Spéciales pour Hôpitaux.)

Principalement employé contre la Syphilis, le « **RHODARSAN** » est également indiqué dans toutes les maladies à spirilles : Paludisme, Framboesia, Angine de Vincent, etc.

Laboratoire des Produits « **USINES du RHONE** »
21, rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

RHODAZIL

(Solution aromatisée
de Benzoate de Benzyle U. R.)

Médication antispasmodique des muscles lisses

Parfaite tolérance — Aucune toxicité

Indications.

Asthme vrai, Coqueluche, Spasmes du pylore, Colique hépatique, Dysménorrhée, Hoquet persistant, Hypertension, etc.

Posologie.

Chez l'adulte, 30 à 40 gouttes, renouvelées toutes les trois ou quatre heures.

En médecine infantile, 2 à 4 gouttes par année, renouvelées toutes les trois ou quatre heures.

**Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE**

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8^e)

RHOFÉINE

(Aspirine-Caféine)

Ajoute à l'action de l'Aspirine
les propriétés stimulantes
et toni-cardiaques de la caféine.

Comprimés dosés à 0 gr. 50 d'aspirine
et 0 gr. 05 de caféine.

(1 à 6 par jour.)

(Se méfier des contrefaçons.)

Laboratoire des Produits

"USINES DU RHONE"

21, Rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

RHOMNOL

$C^{40} H^{14} Az^{14} P^4 O^{27}$

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

Indic. thér. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, antineurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à café ; une cuill. à café ou à dessert aux repas, pour adultes ; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 c. c. (0,05 de nucléinate de soude par c. c.) pour injections hypodermiques. (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës.)

Dr M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (16^e)

RIODINE

$(C^{18} H^{32} O^2)^2 (I H), C^2 H^2$

Compos. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20 % d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chaque perle représente l'action de 0,20 cgr. environ d'iodure alcalin.

Prop. Physiol. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. Action prolongée et durable n'occasionnant aucun accident d'iodisme.

Indications. — Affections cardio-vasculaires : Artério-sclérose, Myocardites chroniques, Hypertension, etc. — Affections respiratoires chroniques : Emphysème pulmonaire, Bronchites chroniques, Asthme, etc. — Affections diverses : Obésité, Rhumatisme chronique, Scrofule, Syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Dose. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 6 francs

Laboratoires P. ASTIER

45, Rue du Docteur Blanche — PARIS (16^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

ROYÉRINE DUPUY

Poudre digestive absorbante
en cachets

Compos. — Pepsine extractive ; Pan-créatine extractive ; Sous-carbonate de bismuth, Phosphate et Carbonate de chaux.

Avantages. — La pepsine et la pan-créatine associées à une poudre non fermentescible, antiputride, comme le carbonate de bismuth, se conservent indéfiniment et agissent toujours ainsi avec leur maximum d'action. Le carbonate de bismuth, non toxique, donne au contact du suc gastrique un dégagement très lent d'acide carbonique sans produire aucune distension de la paroi stomacale. Absorbant de premier ordre, antiacide, ne provoque pas de constipation. Assure une digestion parfaite. Supprime les douleurs.

Indications. — Dyspepsies à forme hypersthénique ou hyposthénique. Gastralgies. Fermentations secondaires. Tympanisme. Maladie de Reichmann. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées profuses des tuberculeux. Éruptions provenant de troubles digestifs (Urticaire).

Dose. — 2 cachets avant chaque repas, 6 et jusqu'à 8 cachets par jour dans les cas anciens et les diarrhées chroniques.

En boîtes de 40 cachets.

**Laboratoire de Thérapeutique
des Voies Digestives**

J. LAUMONIER

225, Rue Saint-Martin — PARIS

RUBYL

Iodure double de quinine
et de
bismuth chimiquement pur (sel insoluble)

L'efficacité des Sels de bismuth en tant qu'agent antisyphilitique est, à l'heure actuelle universellement admise; ils conviennent particulièrement aux cas réfractaires à l'arsenic et au mercure.

Nous présentons ce sel en suspension huileuse stérilisée par la chaleur, mise en ampoules de 3 cmc., dosée à 0 gr. 10 de produit actif par centimètre cube, injectable dans les muscles (partie supérieure de la fesse) en évitant l'introduction du Sel de bismuth dans les vaisseaux.

Littérature franco sur demande :

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (3*)

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

RYTHMOS LEYSIN

Symbiose Pseudo-Colloïdale Chimio-Electrolytique en Véhicule diurétique.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Asystolie, même lorsque la Digitale et la Digitaline se montrent inefficaces, Asthme, Angine de Poitrine, Arythmies, Endocardites, Bréthysme, Insuffisance aiguë du cœur gauche, Insuffisance irréductible du cœur droit, même accompagnée d'une stase abdominale considérable. Insuffisance aortique ou mitrale, Myocardites, Névroses cardiaques, Sclérose artérielle, Sténose mitrale et coronaire, Tachycardies, tous les troubles cardiaques des maladies infectieuses.

Propriétés. — Tonio-Cardiaque de grande puissance et d'extrême souplesse. Eupnéique et Hypotenseur énergique à action durable ramenant constamment la tension artérielle à sa valeur normale. Sans action sur l'Hypotension. Régénérateur et Régulateur parfait des Fonctions cardiaques. Curatif réel des Affections cardio-vasculaires par son Action Régénératrice sur le Myocarde.

Posologie. — 2 demi-cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, à n'importe quel moment de la journée. Si l'on redoute des crises, la dose peut être portée à 6 demi-cuillerées à café régulièrement espacées dans les 24 heures. Supprimer les collyres mercuriels et les insufflations de calomel dans les yeux.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

SALÈNE CIBA (et SALÈNAL CIBA)

Compos. et Prop. — Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicyllique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

Indicat. — Le rhumatisme dans ses diverses manifestations.

Formes pharm. — Le SALÈNE se formule magistralement, pur ou en liniments.

Le SALÈNOL (pommade au Salène),
le tube de 30 gr. : 4 francs

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

SALLIA CHATEL GUYON MIRATON

Châtel-Guyon chez soi

Avec les sels purs extraits, par évaporation complète des eaux de la Source Miraton Châtel-Guyon.

Les SALLIA MIRATON sont garantis d'une pureté absolue.

Action. — Véritable cure de remplacement de la cure de Châtel Guyon, les SALLIA MIRATON agissent par la complexité même des sels de ces eaux.

Emploi. — 4 à 8 cuillerées prises avec les aliments aux trois repas. Cure de 25 jours renouvelée tous les deux ou trois mois.

Echantillon et Littérature sur demande aux

Etablissements

MIRATON CHATEL-GUYON

Dépôt à PARIS, 13, boulevard Saint-Germain

SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. — Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs, Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Effet digestif : Une cuillerée à café une demi-heure après les repas.

Effet laxatif : Deux cuillerées à café le matin à jeun.

Effet purgatif : Une ou deux cuillerées à soupe le matin à jeun.

ROBERTS & C^e, Pharmaciens

5, rue de la Paix — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des Maladies des Voies respiratoires.

Deux formes : *Elixir* (adultes); *Gouttes* (enfants).

ELIXIR (*chez l'adulte*).

Mode d'emploi. — 4 ou 5 cuillerées à dessert par 24 heures, peut être pris pur ou dans tisane; si l'effet désiré n'est pas obtenu, aller à 4 cuillerées à soupe; *enfants de plus de 10 ans et vieillards*, commencer par 4 cuillerées à café.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Rhumes vulgaires, Bronchites aiguës, Bronchites chroniques dites négligées, Affections pulmonaires, Grippe et ses formes.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament héroïque, calmant énergique de la toux, anti-fébrifuge de premier ordre, médicament antigrippal et anti-bronchitique par excellence, donne un sommeil calme et réparateur.

GOUTTES (*chez l'enfant*).

Mode d'emploi. — Enfants jusqu'à 10 ans: 10 gouttes par jour et par année d'âge. (2 ans : 20 gouttes; 5 ans : 50 gouttes par jour, en 4 ou 5 fois dans les 24 heures); au-dessous d'un an, une goutte par jour et par mois d'âge. (4 mois : 4 gouttes par jour en 4 fois). Prendre les gouttes dans eau très sucrée ou sirop de tolu.

Indications. — Coqueluche et toutes les toux de l'enfant, quelle qu'en soit la cause, Laryngites, Rhumes, Affections broncho-pulmonaires.

Laboratoire Georges TINARD

134, Boulevard Péreire — PARIS (17)

SALYSÉRUM

du Docteur SÉJOURNET

(Communication Académique de Médecine.)

forme. — Ampoules de 1 cc. d'un composé cocalicylé.

Indic. thérap. — Rhumatisme aigu ou subaigu. Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique. Sciatique. Goutte.

Injections complètement indolores.

Laboratoires

de Biologie et de Physiologie appliquées

D. DROUET & PLET

3, rue de Marly, à RUEIL (Seine-et-Oise).

SAMBUL-GONDARD

Médicament végétal, sans *colchique*

Composition :

Suc des baies du *Sambucus Ebulus*.

Indications :

Goutte ; rhumatismes ; sciatique ;
névralgies ; lumbago, etc.

Posologie :

Une cuillerée à café le matin ;
une demi-cuillerée à café le soir
avant et à distance des repas. *N'est*
pas toxique ; pas de contre-indi-
cations.

Littérature et spécimens médicaux
sur demande

Laboratoire du **SAMBUL-GONDARD**

EVREUX (Eure)

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène

Forme. — Capsules.

Compos. — Chaque capsule contient

Essences balsamiques : 0 gr. 20

Bleu de Méthylène : 0 gr. 02

Dose. — 4 à 10 capsules par jour.

Action. — Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, rue de Vienne — PARIS

SANTHÉOSE

A base d'une Diméthylxanthine irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine

Formes. — Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1^{re} Santhéose pure : Affections cardio-rénales, albuminurie ; 2^e Santhéose phosphatée : Scléroses, convalescences ; 3^e Santhéose caféinée : Asthénie, asystolie, infections ; 4^e Santhéose lithinée : Artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Prop. Thér. — Diurétique, hypotenseur, lat-cardiaque, antitoxique.

Indications. — Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

DÉPOT GÉNÉRAL :

4, Rue Rol-de-Siclle — PARIS (4^e)

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse.

Sapocade. Sapolan et Huile de Cade. Psoriasis. Séborrhée, Sycosis.

Lait de Sapolan. Erythèmes, gerçures.

Laits de Sapolan : au Soufre, Huile de Cade ou Ichthyol.

Savon de Sapolan.

Poudre de Sapolan.

Sapo-barbe. Savon au soufre et au sapolan pour la barbe : acné, pyodermes,

Sapo-pâtes. Pâtes de Lassar au Sapolan.

Laboratoire R. CAVAILLÈS

34, rue de Turin — PARIS (8°).

SATUROL

Ampos. — Bicarbonate, phosphate et sulfate de soude chimiquement purs (conditions essentielles d'efficacité). Formule du professeur Bourget de Lausanne).

Action. — Sature les acides de l'estomac; permet de ramener rapidement, à toutes les périodes de la digestion, l'acidité des hyperchlorhydriques au tarif normal de 0,2 %.

Indications. — Pyrosis (brûlures, acidité, aigreurs, pesanteurs, fermentations, spasmes pyloriques).

Forme pharmaceutique. — Granulé soluble.

Dose. — Une mesure dissoute dans un verre à bordeaux d'eau pure. Répéter aussi souvent que cela est nécessaire.

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18°)

SAUGE GMET

Extrait total de " Sauge officinale "

Préparation liquide sans Alcool correspondant à 2 gr. de plante par cuillerée à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, en dehors des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-sudorifique, Nervin, Tonique.

Indications. — Atonie, Sueurs profuses des tuberculeux et des grippés.

Littérature et échantillons sur demande au Service Médical des

Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Téléphone : Bergère 43-10

SAVONS ANTISEPTIQUES

Préparés avec des pâtes strictement neutres, entièrement saturées. Soins hygiéniques du corps; traitement des affections de la peau.

Savon doux, S. Surgras au beurre de cacao.

Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufré, S. Goudron et Naphtol, S. Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Résorcine, S. Salicylé.

Savon à l'Ichtyol, S. Panama et Ichtyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boré, S. Iodé à 5 % d'iode, S. Mercuriel à 33 % de mercure, S. au Tannoforme contre les sueurs, S. à l'huile de Chaulmoogra (lépre, psoriasis), S. B. du Péron et Pétrole (gale, parasites, etc.)

Savon Dentifrice Vigier pour l'entretien des dents, gencives et muqueuses; évite les accidents buccaux chez les syphilitiques.

VIGIER & HUERRE

Docteur-ésciences

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

SAVON ANTISEPTIQUE LIEUTAUD

Au goudron boraté

Son emploi est tout indiqué pour la guérison des maladies de la peau et pour la toilette intime.

MM. les docteurs ont intérêt eux-mêmes à faire usage du *Savon antiseptique Lieutaud* après une visite à ceux de leurs malades atteints de maladies contagieuses. Efficacité absolue, nombreuses attestations de notabilités médicales. Envoi sur demande à MM. les Docteurs contre 0 fr. 50 en timbres d'un spécimen d'essai en écrivant à

A. RICHELME & C^{ie}

12, Rue Jacquand — MARSEILLE

SAVONS PHARMACEUTIQUES

marque "SPA"

Les Savons pharmaceutiques marque "SPA", préparés par un pharmacien attaché à la maison, se font à tous médicaments.

NOMENCLATURE ET RÉFÉRENCE

Au Goudron de Norvège.	Sulfureux.
Au Goudron boraté.	Au Crésyl.
Au Goudron et Panama.	A l'Acide salicylique
Boraté.	A l'Huile de Cade.
Boriqué.	Au Sublimé.
A l'Ichtyol.	Ioduré, iod. de Potassium.
Phéniqué.	Au Thymol.
Au Soufre.	

Ils donnent à MM. les Docteurs toutes les garanties de pureté et de dosage. En les prescrivant ils sont donc certains d'obtenir le maximum d'effet.

A. RICHELME & C^{ie}, Fabricants

12, Rue Jacquand — MARSEILLE

SCILLARÈNE SANDOZ

Composition :

Glycoside cristallisé, principe actif isolé du bulbe de la scille.

Forme :

Comprimés à 0 gr. 0005 de substance active ; solution pour usage interne à 1/2000 ; ampoules pour injections intramusculaires ou intraveineuses à 1 cm³ 1 = 0 gr. 00017.

Indications thérapeutiques :

Produit pur. Cardiotonique et diurétique de tolérance parfaite. Pas d'irritation rénale ou intestinale. Pas d'accumulation.

Indications :

Toutes les insuffisances cardiaques. En particulier dans les lésions valvulaires non compensées (affections anciennes, œdèmes, myocardites, etc.) et quand on observe une intolérance ou une accoutumance aux digitaliques.

Posologie :

$\frac{1}{2}$ à 1 ampoule, $\frac{1}{2}$ à 1 comprimé ou 15 gouttes une à quatre fois par jour.

Produits SANDOZ

BUREAUX : 3 et 5, Rue de Metz, PARIS

DÉPOT GÉNÉL. : 125, r. de Turenne, PARIS

(Usine des Pharmaciens de France)

SCURÉNALINE

Adrénaline synthétique lévogyre Codex
chimiquement pure " Usines du
Rhône " en solution au millième.

Flacons de 10 à 30 cc:

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc.

Laboratoire des Produits

" USINES DU RHONE "

21, rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

SCUROCAINE

Novocaïne « Usines du Rhône »

Ampoules pour tous usages anesthésiques :
Anesthésies par infiltration, rachidiennes,
dentaires, régionales, rhino-laryngologiques,
oculaires, etc.

Comprimés dosés à 0 gr. 05 avec ou sans
Scurénaline (Adrénaline « Usines du Rhône »),
pour préparation extemporanée de toutes
formules.

Ampoules stériles contenant 0 gr. 10 ou 0 gr. 50
de Scurocaïne cristallisée pure.

Scurocaïne nitrate pour addition, sans précipité,
aux solutions argentiques.

Scurocaïne base pour préparation indolore de
solutions huileuses (traitements hypodermiques,
urologie, etc.)

Laboratoire des Produits

USINES DU RHONE

21, rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8^e)

SCUROFORME

(Paraminobenzoate de Butyle normal)

Mêmes indications que les Orthoformes. Solubilité et, par suite, toxicité moindre, Anesthésie très supérieure, *Anesthésique local, insoluble, non toxique*

- 1° Scuroforme en nature. — Pour être employé en pulvérisation, en insufflation, pour être associé aux pommades, lavements : Plaies douloureuses, Brûlures, Rectites, Colites, Affections oto-rhino-laryngologiques.
- 2° Poudre lactasée à 1/10°. — Pour être employée en pulvérisation et insufflation : Affections rhino-laryngologiques, Dysphagie.
- 3° Pastilles chocolatées à 0 gr. 032. — Pastilles " RHODIA " spécialement indiquées contre : Stomatites, Angines, Pharyngites, Enrouements des fumeurs et des orateurs. Toutes affections douloureuses relevant de la Stomatologie.
- 4° Camprimés carbonates-calciques à 0 gr. 05. — N'exerce aucune influence sur les phénomènes de la digestion. Douleurs gastriques. Ulcérations.

Laboratoire des Produits " USINES DU RHONE "

21, rue Jean Goujon — PARIS (8°)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

SÉCACORNINE " ROCHE "

Compos. — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

Action thérap. — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

Indic. thérap. — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématomés, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action toni-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylique, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phtisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant, et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et Vessie.* — Polypes du rectum (injection sous muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrhée etc.

Doses et Mode d'emploi. — 1 centimètre cube, ou 1 ampoule, ou 40 gouttes, ou 4 comprimés de Sécacornine "Roche" agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

Thérapeutique d'urgence. — 2 cc. ou 80 gouttes par voie buccale; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

Doses moyennes. — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire, 20 à 30 gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour; par voie buccale ou rectale; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

Thérapeutique Locale. — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine); 1 cc. ou 1 ampoule par jour, en injection sous-muqueuse (loco dolenti): Prolapsus du rectum.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Cours des Vosges, 21, PARIS (10^e)

SÉDATINE CHRISTIAENS

FORMULE { Diiodo Salicylate de Sodium 2 gr. 10
Eau bidistillée stérilisée Q s. p^r 100 cc.

Forme. — Ampoules sédatives pouvant remplacer la morphine dans les insomnies et crises nerveuses, ainsi que dans les affections douloureuses (coliques hépatiques, lumbago, brûlures, etc.).

Mode d'emploi et doses. — Les essais ont été faits à dose de 1 c.c. et 2 c.c. en injections hypodermiques ou intramusculaires. Dans la plupart des cas, l'action est immédiate, quelquefois cependant, la sédation ne se produit qu'au bout d'une heure, rarement plus; la sédation procure un sommeil calme et au réveil on n'observe aucune fatigue. *La dose 2 c.c. en général semble nécessaire.*

De plus, ce produit étant tout à fait inoffensif, présente l'avantage de pouvoir être laissé dans toutes les mains, sans crainte d'accident.

PRIX IMPOSÉ {	La boîte de 6 ampoules de 2 c.c. = 4 50
	— — — 12 — — — 2 c.c. = 7 50

Envoi franco par poste contre mandat de pareille somme majorée de 0 fr. 60 pour frais d'envoi.

Adresser les demandes à

M. CHRISTIAENS

2, rue du Champ-de-Mars. — REIMS (Marne).

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur André Gigon

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé.

Flacon de 40 gr.

Laboratoire du Doct' André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{re})

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

SÉDOBROL " ROCHE

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré

Tablettes et Liquide :

1 tablette ou 1 mesure = 1 gr. Na Br.

Mode d'emploi et Doses :

Adultes : 1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse une ou deux mesures de *Sédobrol " Roche "* liquide ou on fait dissoudre une ou deux tablettes ; on prépare ainsi instantanément un bouillon particulièrement savoureux que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée.)

Prop. Thér. :

Médicament sédatif, hypnotique et calmant donnant des résultats certains et permettant d'imposer un *traitement bromuré* intensif *dissimulé*, tout en rendant agréable le régime déchloruré.

Indic. Thér. :

Insomnies, névralgies, excitabilité, irritabilité, gastralgies, dyspepsies, palpitations, cardiopathies, migraines, spasmes, convulsions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

SÉDOGÈNE SALLÉ

Comprimés contre la Toux et la Dyspnée

Présent. — Le Sédogène se présente sous la forme de petites lentilles.

Compos. — *Aconit* (décongestif), *quebracho blanco* (fébrifuge expectorant antiseptique) et très faible quantité de *dionine* et d'*héroïne* (calmants, antidyspnéiques).

Indic. — Action sédative vraiment *spécifique* sur les organes respiratoires, laryngites, rhumes, bronchites, catarrhe pulmonaire, asthme bronchique, emphysème, hémoptysies, tuberculose, manifestations pulmonaires de la grippe. A l'encontre des sirops pectoraux calmants, les comprimés de Sédogène n'ont aucune action nocive sur l'estomac, ne constipent pas, ne troublent pas l'activité cardiaque.

Doses. — 6 à 8 comprimés irrégulièrement espacés dans les 24 heures suivant les besoins. (En raison de l'*aconit*, il est prudent de ne pas donner de sédogène aux enfants âgés de moins de cinq ans). — Prix : 4 fr. 50.

Laboratoire **BERGER** — 4, rue des Pyramides
PARIS

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine

Mode d'emploi et dose. — Injection hypodermique : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Prop. Thér. — Plus actif et moins toxique que la morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux, Insomnies douloureuses, Cancers, Spasmes, Crises Tabétiques, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, etc.

Établissements **Albert BUISSON**

157, Rue de Sèvres — PARIS

SÉDONEUROL DEHAUSSY

Traitement de l'Épilepsie

Composition. — C'est une association de tartrate *berico-potassique* et de *Gardéol* (phényl-éthyl-malonylurée), deux agents anti-épileptiques d'une efficacité connue, mais dont cette association, dans des proportions bien étudiées, permet de diminuer les doses respectives. Par là, on évite les fortes doses, nécessaires quand le Gardéol est employé seul, et dont les sérieux inconvénients sont bien connus. De plus on a achevé d'éliminer ces inconvénients par l'addition alternée de deux correctifs, *caféine* ou *strychnine*, toutes deux accompagnées de *belladone*. Ces deux substances combattent efficacement l'action de dépression du Gardéol, et comme elles interviennent alternativement (par l'emploi de comprimés blancs, alternant avec des comprimés roses), on évite l'accoutumance de l'organisme à ces agents. Enfin la belladone, dont l'heureuse action sur le psychisme de ces malades est connue, complète la correction cherchée.

Doses. — Chez les enfants, on commence par deux ou trois comprimés par jour, soit un à chaque repas; chez les adultes par quatre comprimés, deux le matin et deux le soir. Si les crises sont arrêtées on s'en tient à cette dose. Si non, on augmente la dose d'un cinquième comprimé par jour, puis après quelques jours, d'un sixième, si l'effet cherché s'est pas obtenu, mais en répartissant alors la dose quotidienne en trois prises. On continue ainsi jusqu'à suppression des crises, mais sans dépasser jamais par jour six comprimés chez l'enfant (valant 0 gr. 12 de Gardéol par jour), et chez l'adulte douze comprimés (valant 0 gr. 24 de Gardéol par jour). — Ne jamais interrompre le traitement brusquement.

Résultats. — De nombreux essais cliniques ont démontré la surprenante efficacité de cette association, nettement supérieure à celle du Gardéol ou du tartrate, employés séparément.

Laboratoire Ed. DEHAUSSY

Docteur en Pharmacie, licencié-ès-sciences

44, rue Inkermann — LILLE

(Echantillons et Littérature)

SEL DIGESTIF BÉ-ME-CÉ

Bicarbonate de Soude	4.
Magnésie	1
Carbonate de chaux léger	2
lactosés et chimiquement purs.	

par c. à c.

Forme :

Poudre,

Propriétés :

Spécifique de l'*Hyperacidose*.

Posologie :

1 cuillerée à café après chaque repas.

Laboratoire ODINOT

21, rue Violet, 21 — PARIS

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur Normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions Digestives.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans un 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 5 fr. 50 le flacon

Laboratoire Alph. BRUNOT

16, rue Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

SELS de LITHINE EFFERVESCENTS

Nature. — Sels de Lithine.

Action. — Les sels de Lithine, en opérant sur le foie, tarissent à la source même la production de l'acide urique en modifiant la nutrition troublée.

Indications. — *Carbonate*, rhumatisme, goutte. *Benzoate*, coliques néphrétiques, gravelle, coliques hépatiques, albuminurie, diabète. *Salicylate*, rhumatisme articulaire, rhumatisme chronique. *Glycérophosphate*, diathèse arthritique goutteuse, accompagnée de neurasthénie; possède en même temps les propriétés reconstituantes de l'acide glycérophosphorique. *Bromhydrate*, sédatif par le brome. Par la Lithine dissout l'acide urique et les urates alcalins. *Citrate*, diathèse rhumatismale.

Posologie et mode d'emploi. — Chaque flacon de Sels de Lithine est surmonté d'un bouchon-mesure qui contient 20 centigrammes de principe actif. Faire prendre dans de l'eau sucrée ou non, ou dans de la bière ou du lait.

SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS

LE PERDRIEL

11, Rue Milton — PARIS (9^e)

SELENIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cm³ (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le sélénol est une solution limpide de couleur brune; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses soit seul, soit associé à la Cytuline (Voir plus haut).

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

SÉOTRAL LEYSIN

Éliminateur supra-rapide des acides urique et oxalique et de leurs composés.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Crises de goutte aiguë. Rhumatismes musculaires et articulaires aigus.

Propriétés. — Élimine en quelques heures par la salive, la transpiration et les urines des quantités considérables d'acide urique avec lequel il forme des sels extrêmement solubles. Arrête les crises de goutte aiguë en quelques heures.

Posologie. — Se prend, à jeun à raison d'une cuillerée à café toutes les trois heures dans de la tisane non sucrée faite avec la poudre jointe au flacon. Rester au lit pour favoriser la transpiration. Pour plus de détails, consulter le mode d'emploi.

Les Laboratoires LEYSIN

1 bis, rue Molitor — PARIS (16^e)

Téléphone : Auteuil 14-73

SEPTICÉMINE CORTIAL

Compos. — Di urotropine iodobenzométhylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, indolore. Aucune réaction locale ou générale.

Prop. — Antisepsie intégrale, interne et externe, pénètre dans tous les tissus, même dans le liquide céphalo-rachidien; chute de la température régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxinique; éliminateur hépatique et rénal.

Indicat. — Infections aiguës fébriles : Grippe, Fièvre puerpérale, Pneumonie, Pyélonéphrites, Typhoïde, Encéphalite épidémique, Méningites Tuberculose pulm. à allure aiguë, rapide. — Urogynécologie, infect. chirurgicales.

Forme. — Ampoules de 4 cc. La boîte de 8 : 12 fr. net.

USE. Septicémies à marche rapide : 2 à 4 ampoules dans les 24 heures¹
— — — lente : 1 à 2 — — —

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. — Pure : Urogynécologie, Plaies purulentes, Tumeurs ouvertes. — Ou étendues d'eau : Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Laboratoires CORTIAL

125, Rue de Turenne — PARIS

SERUM ANTIPHYMIQUE VADAM

A base de Cholestérine iodo-balsamique gaulcolée et Cinnamate de benzyle.

Indications.

Traitement de toutes les affections inflammatoires pulmonaires (bacillaires ou parabacillaires).

Résultats immédiats chez les malades curables (Antiseptie, cicatrisation et histogénèse).

Dose :

Une ampoule tous les deux jours

(Voir « Thalassotonine Vadam »)

Etablisse^m. VADAM d'Hypodermie

9, Rue Mogador (Opéra) — PARIS

Prix Laroze de la Faculté de Paris

SERUM FERRUGINEUX FRAISSE

Composition :

Glycérophos. de Soude : 0 gr. 10 ;
Cacodylate de Fer : 0 gr. 01 ; Caco-
dylate de Strychine : $\frac{1}{2}$ milligr.,
pour 1 cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant : spécifique des anémies et de la chlorose.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 6 fr. 50 ;

2° En gouttes, prix du flacon : 6 fr. 50.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SERUM HYPOTENSIF FRAISSE

Composition :

Extrait de Gui : 0 gr. 05.

Nitrite de Soude : 0 gr. 01.

Indications :

Contre l'hypertension artérielle.
l'Artério-sclérose.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 6 fr. 50 ;

2° En gouttes, prix du flacon : 6 fr. 50.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM NEUROPHILE THÉVENOT

Composition. — Soluté injectable de glycéro-phosphate de soude, de cacodylate de strychnine et de saccharose. L'addition de ce dernier corps a pour but de maintenir en solution la strychnine malgré l'alcalinité du liquide. — L'injection de ce liquide est indolore. Cette formule a été spécialisée à la suite de la communication de M. LECLERE, directeur des Usines Thévenot, à la *Société de Pharmacie de Paris* (février 1920).

Indications. — Modificateur très puissant des états asthéniques.

Echantillon sur demande.

Prix la boîte de 12 ampoules : 4 fr. 50

Produit fabriqué par la SOCIÉTÉ des
PRODUITS PHARMACEUTIQUES THEVENOT
DIJON

SERUM NEVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude :
0 gr. 10; Cacodylate de Strychnine :
 $\frac{1}{2}$ milligr., pour un cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 6 fr. 50 ;

2° En gouttes, prix du flacon : 6 fr. 50.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM OLIVIÉRO

(en comprimés.)

(Sérum de cheval associé à l'extrait hépatique et au fer.)

Formule rationnelle pour le traitement des *Anémies*, de la *Convalescence*, de la *Débilité* (4 à 6 par jour).

Augmente le taux globulaire et la charge en *Hémoglobine* des hématies.

Autre forme : (Capsules de sérum desséché) sans association (à enveloppe de gluten).

Emploi indiqué lorsqu'il s'agit d'augmenter le pouvoir coagulant du sang dans les cas d'*Hémoptysies*, *Hémorragies*, *Métrorragies*.

Envoi gratuit d'un hémoglobinamètre de poche
pour examen du sang.

87, rue Denfert-Rochereau — PARIS (14°).

SIGMODINE GRÉMY

Le Natrosulfonate de tyrosinehydrargyre possède une qualité que n'ont pas les autres composés mercuriels : la disparition quasi complète de la douleur à l'injection.

Doses et mode d'emploi. — En ampoules de 1 cm³ qui correspond à 0 gr. 01 de mercure métal.

Indications. — Toutes les manifestations de la syphilis.

(En association avec le Thionhydrol.)

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX*)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

SILICYL

Médication de base et de régime des *artériosclérose*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la lésion initiale et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestrinéé d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésion athéromateuse chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude. (Professeur Gougé, *P. M.*, 1911.) — L'injection intra-veineuse défensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeur Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^2 \text{O}^{12} \text{Na}^2$ et K^2 , stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante, par périodes de 20 jours par mois.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,50 de sel de soude et de potasse, 1 à 2 compr. au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures. (Action rapide : présclérose, angor.)

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Hypotension. Elimination chlorurée. Diurèse. Action antiathéromateuse. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — Présclérose. Artériosclérose. Hypertension. Aortite. Athérome aortique. Sclérose rénale. Angine de poitrine. Endartérite oblitérante progressive. Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale. Troubles cérébraux. Migraines. Vertiges. Paresse intellectuelle. Bourdonnements, etc. Otite scléreuse. Sclérose auriculaire. Troubles oculaires. Presbytie. Fatigue et Sclérose cardiaque. Calcification. Anémie siliceuse.

Echantillons — Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, rue du Rocher — PARIS

Laboratoires CAMUSET, ABLON (Seine-et-Oise).

SILISODE

Forme. — arGunlé.

Comp. — Une cuillerée à café de granulé contient :

Silicate de soude: 0,40

Benzoate de lithine 0,10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas.

Action. — Hypotensive, déchlorurante.

Indications. — Maladies de la cinquantaine, Hypertension, Artério-Sclérose.

MICHEL S,

Pharmacien de 1^{re} Classe.

22, rue des Bernardins — PARIS

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

SINAHIN

Antidiabétique

Forme. — Pilules.

Propriétés :

Traitement *sans régime* (Communication faite par le Dr Dingruzi, travaux et formules extraits d'Avicenne.

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Prix : 9 fr. 90 la boîte

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

LE SINAPLASME

Cataplasme sinapisé instantané
du Dr J.-A. FAURE

Indications thérapeutiques :

Broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, bronchites, rhume, etc.
Mode d'emploi. — Tremper le SINAPLASME pendant trois minutes dans l'eau tiède avant de l'appliquer sur la peau du côté non imprimé, éviter l'eau trop chaude qui pourrait empêcher l'action du révulsif.

N.-B. — Assujettir fortement le SINAPLASME avec une serviette, ne l'enlever qu'après action complète lorsqu'il n'est plus possible de le supporter.

Dépôt : 4, Rue Brunel — PARIS

DUSSUEL & FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie)

SINRÉNALINE DEHAUSSY

Composition. — Solution à 1 gr. p. 1000 d'Adrénaïne *gauche* synthétique, pure et stable, la seule qui soit *précisément* active, exempte de l'isomère *droit*, lequel est totalement inactif.

Indications thérapeut. — La Sinrénaline Dehaussy (ou *Sin.*, abréviation de *Sin*istère, *gauche* et de *adrénaline*) est employée :

Contre l'asthénie cardio-vasculaire, l'hypotension, la faiblesse, l'état de fatigue et d'incapacité à tout effort au cours et pendant la convalescence des maladies infectieuses, *grippe*, pneumonie, scarlatine.

Comme adjuvant indispensable de la cure de *rééducation* au cours de la tuberculose, de la grossesse, de l'allaitement, de la croissance, de la consolidation des fractures.

Contre les vomissements incoercibles de la grossesse contre la crise d'asthme, la crise urticale, comme hémostatique, etc.,

Dose. — Se prescrit par gouttes : dès le début, 10 à 30 gouttes par jour.

Laboratoires Ed. DEHAUSSY

Docteur en Pharmacie, Licencié-ès-Sciences

44, rue d'Inkermann — LILLE

(Echantillons et Littérature)

SIROP AUZES

A l'Iodure de Manganèse
aromatisé à la Mandarine.

Composition. — Chaque cuillerée à soupe contient 0 gr. 05 d'Iodure de Manganèse.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe au début de chaque repas ; *Enfants* : 1 cuillerée à café ou à dessert au début de chaque repas, suivant l'âge.

Propriété thérapeutique. — Agent catalytique convoyeur et fixateur d'oxygène, hématopoïétique puissant. Ne constipe pas comme le fer, n'agit pas sur le foie comme l'arsenic.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage, Tuberculose, Carence physiologique, Scrofule, Lymphatisme, etc.

A. BLANC & Cie

AGEN (Lot-et-Garonne)

SIROP DE BLANCARD

A l'Iodure de fer inaltérable
10 cgr. par cuillerée à soupe.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuill.
lerées à soupe par jour.

Propriétés. — Agent incomparable
d'Hématopoïèse.

Indications. — Anémie, Scrofules, lym-
phatisme, Chlorose, Leucorrhée, Amé-
norrhée, Syphilis accidentelles, ou
constitutionnelles, suite de grippe
infectieuses, etc.

BERTAUT BLANCARD Frères,
64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

SIROP de DIGITALE de LABELONYE

Sirop d'extrait de Feuilles de Digitale,
contenant tous les principes actifs de
la Digitale, à leur état naturel.

Forme. — Bouteilles et demi-bouteilles

Propriétés. — Régulateur des contrac-
tions cardiaques et de la circulation.
Diurétique. Toutes les indications de
la Digitale. Dose : 1/3 de milligr. par
cuill. à soupe.

Dose moyenne. — 3 cuill. à soupe par
24 h. à distance des repas, pendant
5 à 6 jours. Interrompre ensuite
10-15 jours, avant de recommencer.

LABELONYE & C^{ie}
99, Rue d'Aboukir — PARIS

SIROP DU D^r GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie

Posologie :

Une à deux cuillerées à bouche
le soir au coucher.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

à SCEAUX (Seine)

SIROP GIRARD

Iodotannique phosphaté

Même composition que le Vin Girard.
S'ordonne plus spécialement en médecine infantile.

Mode d'emploi :

1 ou 2 cuill. à dessert ou à bouche
par jour.

A. GIRARD

48, Rue d'Alésia, 48

PARIS

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « Prunus virginianus », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Enfants : 4 à 5 cuillerées à dessert ou à café, suivant l'âge.

PATE GRIBELL

Même composition — Mêmes indications

Laboratoires BELIERES

19, Rue Drouot — PARIS

SIROP DE LA MATERNITÉ

Ext. de fl. pêcheur 25 gr., Manne en larmes 20 gr.

Alcool 60 gr., Alc. de mandarine 5 gr.

Shrop q. s. pour 1 litre.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés therap. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Laboratoire L. LAURIN

86, Boulevard Port-Royal — PARIS

SIRCP PATRICE

Composition :

Drosera, benzoate de soude, Aconit, Belladone, Sirops de Desessartz, tolu.

Action :

Balsamique cicatrisante.

Indications :

Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Quatre à cinq cuillerées à soupe par jour, soit pur, soit dans une tasse de tisane.

Pharmacie DEBŒUF

10, Rue Washington — PARIS (vin^e)

SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches

1^o Calme l'irritation et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2^o Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir, le spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyllique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Dose pour les adultes. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Dose pour les enfants. — 2 ans : une cuillerée à café matin et soir ; 5 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour ; à 10 ans, 5 à 6 cuillerées à café.

Ed. DEHAUSSY,

Docteur en Pharmacie, Licencié-ès-Sciences

44, Rue d'Inkermann — LILLE

SIROP " ROCHE "

AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 egr. de gâlaeol cristallisé.

Doses et Mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour ; Enfants : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Serofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Entérites, Diarrhées, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, Place des Vosges — PARIS

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson

Indications thérapeutiques :

Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Emile TEYSSÈDRE Fils Aîné

Docteur en Médec. — Pharmac. de 1^{re} cl.

34, Faub. d'Angoulême — LIMOGES

SISTOMENSINE CIBA

Substance lipoidique extraite du corps jaune de l'ovaire, appartenant à la classe des chalcones et harmozones, insoluble dans l'eau. Action physiologique. — Equilibrante de la fonction menstruelle; régularise le flux cataménial et fait disparaître rapidement les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.

II. — Règles trop fréquentes.

III. — Règles de trop longue durée.

IV. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures.

Le flacon de 20 comprimés : 6 francs

(Voir Agomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

SOLUBAÏNE

Cardio Tonique, Diurétique puissant

(Voir : "OUABAÏNE")

SOLUTIONS HENRY MURE PHOSPHATÉES

Cinq formes différentes :

- 1° Solution Henry Mure, au bi-phosphate de chaux cristallisé ;
- 2° Solution Henry Mure, au bi-phosphate de chaux arsénié ;
- 3° Solution Henry Mure, au chlorhydro-phosphate de chaux cristallisé ;
- 4° Solution Henry Mure, au chlorhydro-phosphate de chaux arsénié ;
- 5° Solution Henry Mure, au chlorhydro-phosphate de chaux arsénié et créosote.

DOSAGES :

Sels calciques purs :	0, 50 cg.	par cuillerée à soupe
Arséniate de soude :	0,001 mg.	— —
Créosote très pure :	0, 10 cg.	— —

DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie BOMEL
ANNONAY (Ardèche).

SOLUTION LAROYENNE

Composition :

Succinate d'ammoniaque et valérianate d'éthyle.

Indications :

Spécifique contre toutes les formes de l'agitation nerveuse.

Posologie :

Une cuillerée à café, dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire DUREL

7, Boulevard Denain — PARIS

SOMNIFÈNE „ ROCHE ”

Diéthylisopropylpropenylbarbiturate de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloetta, Gelma et des D^{rs} Combe-nale, Vullien, Assoignon, Kindler, Boi-nière, Jourdan, Journiac, de Teyssien, Hamant, Bénéch, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

Indic. thérap. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Epilepsie, Tétanos etc.

SOMNIFÈNE “ ROCHE ” Gouttes

XXX gouttes = 1 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de donner à chacun sa dose, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XX à XXX et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

SOMNIFÈNE “ ROCHE ” Ampoules

chaque ampoule = 2 cc.

(Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux graves, anesthésie, etc.)

Dose hypnotique simple. — 1 ampoule 1/2 heure avant le moment du sommeil.

Dose hypnotique et sédative. — 2 à 3 ampoules, plusieurs jours de suite.

Dose d'urgence. — 3 à 6 ampoules.

Injections indolores. — (Voies endoveineuse, intra-musculaire, sous-cutanée profonde.)

A. B. — L'injection sous-cutanée doit être pratiquée profondément pour éviter tout phénomène douloureux ou névralgique.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

SONERYL

Hypnotique et Analgésique

Nouvel hypnotique de la série barbiturique. Ce corps a été préparé par M. Tiffeneau et l'étude pharmacologique et chimique en a été faite par les Profess. P. Carnot et Tiffeneau.

Trois fois plus actif que le Véronal en tant qu'hypnotique, analgésique ou sédatif du système nerveux.

Le Sonéryl est délivré sous forme de comprimés dosés à 10 cgr. de substance active et en ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 05 par cc. pour injections sous-cutanées.

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

SORGAL THEVENOT

Composition. — Comprimés hypnotiques et sédatifs à base de Phényldiéthylmalonylurée. Extrait de Piscidia, Extrait de Gelsemium, Extrait de Phellandrie.

Indications. — Sommeil rapide, réveil sans malaise. — Le Sorgal agit d'autant mieux que les extraits végétaux qui sont associés à la Diéthylmalonylurée sont de remarquables sédatifs généraux du système nerveux.

Doses. — Comme hypnotique : 1 ou 2 comprimés au moment de se mettre au lit, avec une tasse d'infusion chaude.

Comme calmant (Nervosisme) : $\frac{1}{2}$ comprimé 4 à 6 fois par 24 heures, avec quelques gorgées de liquide froid.

Prix du Sorgal. — Le $\frac{1}{2}$ tube (12 comp.), 3 fr. 75. — Le tube (24 comp.), 7 francs. Echantillons sur demande adressée aux

Usines THEVENOT

21, Rue des Roses — DIJON

SORNYL

(Anciennement Sornaldéhyde)

Composition supérieure au Benzoate de Benzyle contenant les dérivés benzyliques en association médicamenteuse.

Deux présentations : 1° Gouttes ; 2° Comprimés.

Gouttes. — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse. Même vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche, Hypertension.

Dosologie. — 5 à 40 gouttes 4 à 5 fois par jour.

Comprimés : Spécifique de la DYSMENORRHEE.

Dosologie. — 2 à 5 comprimés à un quart d'heure d'intervalle.

Littérat. médicale et échant. sur demande :

Laborat. CHENAL et DOUILHET

22, rue de la Sorbonne — PARIS (5^e)

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

SPASMALGINE " ROCHE "

Antispasmodique vrai

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

A - Un centigramme PANTOPON " ROCHE " (Opium total injectable)

B - Deux centigrammes PAPAVERINE " ROCHE " (Alcaloïde de l'opium moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).

C - Un milligramme ATRINAL " ROCHE " (Ether sulf-atropine, action sur le centre parasympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine " Roche "* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indic. thérap. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Dose et mode d'emploi :

	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
Voie buccale. . .		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, Place des Vosges — PARIS

SPASMINE JOLLY

Combinaison physiologique stabilisée
de Valériane fraîche et Aubépine
Sans odeur — Saveur agréable

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuill. à café.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 6 cuill. à café
par 24 heures, 1/2 dose pour les enfants.

Prop. thér. — — Antispasmodique; Sédatif
du système nerveux; hypnotique et hypo-
tenseur.

Indications. — Nervosisme. — Affections
spasmodiques; Hystérie; Insomnies, etc.

Echantillons et notices sur demande au

Laboratoire Louis JOLLY

1, Rue Christine — PARIS (6^e)

**Demandez-nous tous les renseigne-
ments que vous ne trouverez pas dans
cet ouvrage.**

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies

COMPOSITION :

Sérum frais hémopoïétique de cheval prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (Ac. des Sc. 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndallisation, ses substances minimales sont intactes.

ACTION :

- 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétine de Carnot) ;
- 2° Agent de Leucopoïèse et de phagocytose (opsonines) ;
- 3° Action tonique générale de sérum de cheval ;
- 4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

INDICATIONS :

Toutes anémies, hémophilie, Etats hémorragiques, convalescence, déficiences organiques, tuberculose, infections, et toxoinfections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes.

Pas d'accidents sériques ou infectieux.

MODE D'EMPLOI, POSOLOGIE :

Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Littérature. — Echantillon :

Laboratoire du SPECTROL

71, Av. Victor-Emmanuel-III PARIS (8^e)

Tél. : Elysées 17-46

SPHÉRULINES " MONCOUR "

(Voir Opothérapie « MONCOUR »)

A tous extraits totaux d'organes, préparés à froid dans le vide profond. Rigoureusement dosées. Absolument inaltérables et toujours solubles, grâce à leurs enrobages spéciaux.

Mode d'emploi. — Toutes les sphérulines (monergiques et synergiques) : 1 à 6 par jour, sauf : Hépatiques et Rénales : 1 à 16 par jour.

Doses. — Sphérulines :

Cholagogues (Extr. de Bile), Hypophysaires, Thyroïdiennes, Sur-rénales : 0 gr. 10.

Ovariennes : 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Cérébrales, Entériques, Entéro-pancréatiques, Gastriques, Mammaires, Myocardiques, Orchitiques, Pancréatiques, Placentaires, etc., etc. : 0 gr. 20,

Hépatiques, Rénales : 0 gr. 30.

Parathyroïdiennes : 0 gr. 001.

Bonbons Thyroïdiens : 0 gr. 01.

Sphérulines Synergiques Moncour bi et pluri-glandulaires

(Thyro-ovariennes, Thyro-Orchitiques, Hypophyso-Ovariennes, Sur-réno-Ovariennes, etc., etc.)

Sur demande, toutes préparations ou associations opothérapiques spéciales en SPHERULINE ou Cachets.

Produits Opothérapiques MONCOUR

49, av. Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

SPLENOTANIC GRÉMY

Opothérapie splénique

Complexe inaltérable obtenu par précipitation au moyen du réactif tanno-silicotungstique d'une émulsion albumino-lipoïdique de pulpe splénique

Doses et mode d'emploi. — Dix pilules par jour à prendre en plusieurs fois dans la journée, en dehors des repas.

Indications. — Anémies, Chlorose, Paludisme, Convalescence des maladies infectieuses, Arriération mentale.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (IX^e)

STANION

Description. — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flac.).

Ampoules : contiennent 3 cm³ de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons, et les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmon, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Roche — PARIS

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique
absolument purs

Indications. — Furunculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage interne : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage externe : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement pratique, rapide et définitif : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Laboratoires ROBERT & CARRIERE

37, Rue de Bourgogne — PARIS

Téléph.: Ségur 29-49 ; Fleurus 13-09

STANNYLOSE THÉVENOT

Composition. — *Comprimés dissociables* d'étain et d'oxyde d'étain de pureté contrôlée.

Indications. — Traitement des infections staphylococciques. La *Stannylose Thévenot* réussit notamment bien contre l'acné des jeunes gens si rebelle à tous traitements. — Il est à noter que nos comprimés se délitent rapidement au contact des liquides. C'est ce qui explique l'énergie de leur action. Les comprimés d'étain fabriqués habituellement dans le commerce traversent inaltérés le tube digestif. (Voir les journaux médicaux et pharmaceutiques de 1920.)

Doses. — 2 à 4 comprimés à chacun des grands repas (laisser le produit se délayer de lui-même dans un peu d'eau ou de tisane pendant deux ou trois minutes).

Echantillon sur demande

Prix du flacon de 80 comprimés : 6 francs

Produit fabriqué par la

**SOCIÉTÉ des PRODUITS PHARMACEUTIQUES
THÉVENOT — DIJON**

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs
des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — Adultes : 4 à 12 cuill. à potage par jour; Enfants : 1 à 4 cuill. à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

STAPHYLOCIDE AUDRAS

en *Tablettes* au sucre et à l'Ess. de Menthe
dosées à 0 gr. 25 *Etain-Oxyde d'Etain*
rigoureusement purs

(*Etain d'Electrolyse*)

*plus pur et plus soluble que les étains
du commerce*

Croquer 2, 3 ou 4 tablettes par jour, de
préférence au moment des repas.

Contre toutes les maladies à Staphy-
locoques :

Furuncles, Anthrax, Orgelets à
répétition, Acné, Phlegmons, Abscess
du Sein, Suppurations osseuses, Sy-
cosis, Impétigo, Septicémies bucca-
les et pharyngiennes, etc.

Nota :

Préparation particulièrement *pra-
tique, absorbable, efficace*, à cause
de sa forme de tablettes, nécessitant
une longue trituration et division
des principes actifs avec le sucre, et
leur assurant en outre une fine
émulsion par la salive. L'étain ar-
rive ainsi à l'estomac dans l'état
idéal pour une absorption rapide et
totale.

Se trouve dans toutes les pharmacies
La boîte, pour 10 à 20 jours de traite-
ment : 6 francs

Laborat. du Staphylocide AUDRAS

89, Rue Victor-Hugo — CALAIS

STAPHYLO-COCCINE

FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte et à doses moindres. Agent de la phagocytose, la Staphylo-coccine s'emploie en solution, comprimés et ampoules contre la furonculose, l'angine, les maladies infectieuses, les dermatoses, etc.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA

10, Rue Fromentin, 10

PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

STENERGINE

Reconstituant général

Producteur d'énergie

Formes. — Cachets, Comprimés, Ampoules.

Indications. — Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Convalescence des maladies aiguës, Adynamie, Lymphatisme, Dépression des arthritiques.

Mode d'emploi et doses. — La dose moyenne est de deux cachets ou comprimés par jour, mais dans les cas où l'on recherche une action stimulante et rapide, on devra la porter à trois. Une ampoule chaque jour.

Les cachets ou comprimés peuvent être pris à toute heure, mais de préférence au début des repas. Pour les enfants, un ou deux suffisent.

Laboratoires BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS

STÉNOPHYL VIGAN

Granulé fondant d'un goût exquis

Formule :

4 gr. ou 1. cuiller à café contient :

Iode combiné.....	0,04
A l'Acide Tannique du Juglans Régia et au Rouge de la Kola.....	0,30
Méthylarsinate disodique.....	0,015
Acide Phosphorique officinal et Phos- phate calcique.....	0,20
Sucre blanc.....	3,45

Propriétés therap. — Agent de reconstitution et d'épargne. Stimulant des échanges nutritifs. Apéritif puissant. Tonique du système nerveux.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Lymphatisme, Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou osseuse, Convalescence, etc...

Posologie. — 1 à 2 cuillères à café avant les repas, suivant l'âge.

Laboratoires VIGAN

103 et 105, rue Saint-Lazare — PARIS (9*)

STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble

Compos. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 % de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux....

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Le tube de Stéramine: 3 fr. 50

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire des ANTISEPTIQUES CHLORÉS

40, rue Thiers — LE HAVRE

STIBYL

ou Emétique de Bismuth

Tartrate d'antimoine et de sodium

Les indications du Stibyl sont, d'une part la Bilharziose, d'autre part les Leishmanioses dans leurs diverses manifestations.

Nous délivrons le Stibyl sous la forme de solution à 2, 3 et 6 %, cette solution est faite au moyen d'un sel chimique pur, préparé spécialement pour la médication intra-veineuse et est renfermé dans des ampoules de 2 cm³.

Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (m^e)

STOMOPHILE

RÉGULATEUR ÉNERGIQUE DES FONCTIONS STOMACALES

(Alcalin — Antiferment.)

Forme. — Paquets (de saturation).

Composition. — Alcalins (sodium, calcium, magnésium). — Bismuth (professeur Hayem).

Indications. — Dyspepsie. Gastralgie. Gastrites aiguë et chronique. Hyperchlorhydrie. Hypersthénie. Pyrosis. Ulcère.

(Supprime, dans de nombreux cas, l'atonie intestinale.)

Posologie. — Un paquet, délayé dans un peu d'eau, à la fin ou une heure après les principaux repas.

Dans les crises aiguës, prendre supplémentamment 1 ou 2 paquets dans le courant de la journée.

INNOCUITÉ ABSOLUE

Littérature et Échantillon gratuit à MM. les Docteurs pour leurs essais cliniques.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (11^e)

STOVAÏNE

Chlorhydrate

de Diméthylaminobenzoylpentanol

Produit synthétique. Le moins toxique des anesthésiques locaux, à pouvoir égal; aucune action vaso-constrictive; agit comme tonique du cœur et comme antiseptique.

L'action de la Stovaïne est au moins égale à celle de la cocaïne, mais son absence de toxicité permet d'en utiliser des doses beaucoup plus considérables. La Stovaïnomanie n'existe pas.

En dehors des emplois chirurgicaux (rachianesthésie, anesthésie locale et régionale) la stovaïne se prescrit dans toutes les affections internes et externes où il s'agit de combattre la douleur, le prurit ou l'irritation. Littérature sur demande.

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

STOVAR SOL

Composé « 190 »

Acide Acetyl-oxyaminophénylarsinique

Action préventive de la Syphilis.

Le Stovarsol est le premier exemple de médicament d'ordre chimique, administré par la bouche dans l'intention de prévenir une maladie infectieuse.

Le Stovarsol a été étudié à l'Institut Pasteur de Paris par MM. Levaditi et Navarro-Martin, ainsi que par M. Fournier, médecin de l'Hôp. Cochin.
Littérature franco sur demande

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (III^e)

STROPHANTUS CATILLON

(Prix de l'Académie de Médecine)

Forme. — Granules de Catillon à 0,001 d'Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*. En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Si l'on ne veut pas d'effet diurétique, mais seulement *tonique*, on prescrit les

GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée

3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Affections médullaires et névritiques. —

Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

Dérivé synthétique de la strychnine, dont la toxicité est dix fois moindre.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 cigr. de Strychnal.

1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 cigr. de Strychnal par c¹

Laboratoires P. LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (11^e)

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Nucléophosphate de soude pur et
méthylarsinate de strychnine

Ampoules injectables de 2 c.c.

Dose et mode d'emploi :

Une injection Hypodermique de 1 c. c.
par 24 heures pouvant être portée
à 2 c. c. en une seule injection
dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

SUCCOMUSCULINE CHAIX

PLASMA MUSCULAIRE

Suc de viande crue préparé à froid.

La *SUCCOMUSCULINE* possède les qualités physiques, chimiques, thérapeutiques du *suc musculaire* préparé extemporanément, puisqu'elle n'est autre que ce suc lui-même.

C'est l'extrait global et inaltéré du muscle qui « vient de vivre ».

La *SUCCOMUSCULINE* renferme *cent grammes de viande de bœuf* par cuillerée.

Elle n'est additionnée d'aucune substance nuisible.

Elle possède le plus haut degré de concentration qu'il est possible d'atteindre, et agit à faibles doses.

D'odeur et de saveur agréables, elle est d'une digestibilité parfaite et ne provoque aucun symptôme d'intolérance gastrique ou gustative.

Elle est inaltérable et peut s'administrer à tous les moments de l'année.

Indic. therap. — *Anémie. Convalescence. Neurasthénie. Chlorose. Débilité générale. Tuberculose pulmonaire.*

La *SUCCOMUSCULINE* est ingérée pure ou étendue d'eau, eau de Seltz, eau minérale, véhicule froid quelconque.

Dose moy. — 3 à 4 cuill. à soupe par jour, suivant les indications du médecin.

Dose chez l'enfant : 1 à 2 cuillerées à café par jour, pendant 4 jours, se reposer 2 jours ; reprendre 4 jours, etc. Augmenter les doses avec l'âge.

Laboratoire CHAIX

10, rue de l'Orne — PARIS (15^e)

SULFARÈNE

Soufre colloïdal électrique associé :

Au Hg. à l'As, au Va ; Syphilis et toutes ses manifestations. **Ampoules** : Injections intramusculaires.

Aux aromates : Camphre, Essence de Niaouli, etc. Affections gynécologiques : **ovuies**.

Aux corps plurimétalliques colloïdaux contenus dans les eaux minérales sulfurées : **Bain-Gelée en tube**.

Formule intégrale sur chaque boîte. :

Formule et Méthode du D^r MOLINÉRY
de Luchon

Ancien interne des Hôpitaux de Toulouse

Dépôt général : Laboratoires du Sulfarène

Droguerie Centrale du Sud-Ouest — AGEN

PARIS — Michelat et Souillard

SULFARGYRE THÉVENOT

Description. — Solutés injectables de sulfure de mercure colloïdal, avec ou sans soufre colloïdal. Réaction légèrement alcaline. Injection indolore ne provoquant pas d'induration au point piqué.

Le **SULFARGYRE** se présente sous trois formes distinctes :

1° **SULFARGYRE THEVENOT simple**, en ampoules de 1 cc. Chaque cc. renfermant 0.001 de mercure.

Indications. — Syphilis, lésions syphilitiques.

2° **SULFARGYRE THEVENOT concentré**, en ampoules de 2 cc. Chaque cc. renfermant 0.005 de mercure.

Indications. — Celle de la médication mercurielle sur laquelle il présente l'avantage d'une asepsie absolue, asepsie qui n'est jamais atteinte avec les huiles mercurielles.

3° **SULFARGYRE THEVENOT soufré**, en ampoules de 2 cc., renfermant 0.001 de mercure par cc. et un demi-milligramme de soufre colloïdal.

Indications. — Rhumatisme et dermatoses d'origine syphilitique.

Prix de la boîte de 12 ampoules de **SULFARGYRE simple**, concentré ou soufré, 16 francs.

Envois d'Echantillons sur demande

Société des Produits Pharmaceutiques THEVENOT
à DIJON

SULFODERMOL RAMBAUD

Emploi interne du soufre
dans le traitement des dermatoses

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, Etats séborrhéïques et dermatoses associées. Pityriasis, Psoriasis, Urticaires, Furunculose, Impetigo, Sycosis de la barbe et de la moustache.

Mode d'emploi. — Un cachet dans un demi-verre d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire RAMBAUD

38, Rue Gay-Lussac — PARIS (v°)

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal

Granulé — Ampoules — Pommades

Doses et Modes d'emploi. — *Granulé* : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centig. de soufre colloïdal.

Injectable : 1 inj. par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 inj. tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques, Antisepsie de l'intestin, Rhumatismes aigus et chroniques, Arthritismes, Syphilis.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorrhagique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

SULFURYL MONAL

Forme. — Pastilles agréables à sucer.

Compos. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses. Chaque pastille dégage 2 cc. d'hydrogène sulfuré dans l'estomac.

Dose. — 2 à 8 pastilles par jour.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *cure sulfureuse*.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires. Traitement sulfo-mercuriel dans la syphilis. Maladies de la peau.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, rue de Vienne — PARIS

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie rectale*, active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Suppositoires à 0,04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif est et reste le seul anti-syphilitique indiscutable et testé. Sa véritable voie d'absorption est la voie rectale parce que tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif : On mélange à une solution d'arséno-benzol des trépanèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'EXTRAIT de FOIE, les trépanèmes sont foudroyés.

(Exp. de Levaditi.)

Laboratoire du Docteur TISSOT
34, Boulevard de Clichy — PARIS

SUPPO-GYNALS

Analgésique emménagogue

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame, de cannabis et de sénéclo, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Facilitent la venue des époques et calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles.

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un « SUPPO-GYNAL ». Dix minutes après, deuxième suppositoire (il est bon d'employer les S.-G. dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

Laboratoire LEES

PARIS — 124, Rue du Bac, 124 — PARIS

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée,
pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi :

Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'intestin par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments, pour leur administration par la voie rectale.

Établissements FUMOUBE

78, Faubourg Saint-Denis -- PARIS

Si le "DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES" vous rend des services, engagez les Pharmaciens Spécialistes à y souscrire, ce qui nous permettra de le perfectionner et d'en augmenter le tirage.

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénno-Styptiques)

Adrénaline.....	1/4 mgr.
Anesthésine-stovaïne.....	0,06 cgr.
Ext. de Marrons d'Inde frais	
stabilisé.....	0,02 cgr.

(Hamamelis)

pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi :

Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes, soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés Thérapeutiques :

Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications :

Traitement rationnel des Hémorroïdes.

— Détail : 140, Faubourg Saint-Honoré
PARIS

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll, 4

PARIS (17^e)

TABLETTES OXYMENTHOL PERRAUDIN

A base d'oxygène naissant, menthol, coca-stovaïne, benzoate de soude, etc. Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 10 à 15 par jour à sucer; Enfants, 6 à 10 par jour à sucer.

Propriétés. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Laboratoire des Produits Scientia
10, Rue Fromentin — PARIS

TABLETTE PERROUD

La " Tablette Perroud " est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : Le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de bismuth par tablette divisée en 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — Minimum : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastro-pathies : *Gastrite* *gastralgie*, *hypersécrétion* dans les fermentations intestinales, à petites doses, seule ou associée, la " Tablette Perroud " rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD
7, rue des Archers — LYON

TABUROL MONAL

Opothérapie Sanguine et Reminéralisation.

Forme. — Dragées.

Compos. — Sérum hématopoïétique hémoglobiné associé au fluorure de calcium méthylarsiné.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour aux repas.

Action. — Hématogènes, Reconstituantes, Reminéralisatrices.

Indications. — Etats Anémiques, Chlorose, Neurasthénie.

Laboratoires MONAL & C^{ie}
20, rue de Vienne, 20 — PARIS

TÆNIFUGE KIRN

en capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tœnifuge le plus actif, ne présentant pas les dangers inconvénients des tœnicides, comme la pelletiérine.

(Travaux et thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extract vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1^o Avant-veille, purgation; 2^o la veille, diète presque absolue (lait); 3^o Le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement suivies.

Enfants. — Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires ni équivalents

Capsules Kirn, prix : 10 fr., réglementé

Capsulines Kirn, prix : 6 fr., réglementé

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, Rue de la Source — PARIS (16^e). Tél. Aut. 66-6

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le *Tampol Roche* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol Roche* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement, jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait*.

U. S. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

TARBISOL

**Traitement de la Syphilis
par voie intra-musculaire**

TARBISOL-SUSPENSION: Suspension huileuse stérile et indolore de bismutho-tartrate de sodium.

Formule A à 10 0/0 — Formule B à 5 0/0

(Chacune de ces formules est livrée en boîtes de 10 et 20 ampoules de 4 cc.)

TARBISOL-SOLUTION : Solution aqueuse, stable et stérile, à 5 0/0 de bismutho-tartrate de diéthylamine. (Boîte de 10 amp. de 2 cc.)

Le TARBISOL se recommande par sa bonne tolérance dans les cas justiciables de la thérapeutique bismuthique (arséno et mercure-résistance, intolérance aux arsénicaux, syphilis nerveuse, etc.)

**Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE**

21, Rue Jean Goujon, 21 — PARIS (8^e)

TAXOL

Composition :

Extrait total des glandes de l'intestin.....	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar.....	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

Indication. — Constipation.

Dose et Mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler ou mâcher.

Laboratoires Réunis

159, Avenue de Wagram — PARIS

TERKAL MONAL

forme. — Dragées.

Compos. — Carbonate de gaiacol ter-pino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Laboratoires MONAL & C^{ie}

20, Rue de Vienne — PARIS

THALASSOTONINE VADAM

Histogénèse générale

et particulièrement pulmonaire

Les ampoules de composition voisine de celle de notre « SYNERGYL » en diffèrent par la présence de 5 cc. d'Eau de Mer isotonique.

Si le Synergyl est plus spécialement indiqué pour les neurasthéniques, la Thalassotonine se recommande chez les bacillaires ou prébacillaires (Voir « Sérum antiphytique »).

Formule.

Eau de Mer isotonique	5 cc,
Cacodylate de soude	0,05
§. de Strychnine	0,001
Nucléophosphate de soude	0,10

Etablissement. VADAM d'Hypodermie

9, Rue Mogador (Opéra). — PARIS

Prix Laroze de la Faculté de Paris

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhannées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas; cachets 1 à 4 cachets à chaque repas; comprimés 2 à 8 comprimés à chaque repas; granulé 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas, (Spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Laboratoires DURET & REMY

5, Avenue des Tilleuls — PARIS (18^e)

THÉBAÏL

Opium essentiel — Produit Français

Formes :

1^o Ampoules isotoniques-isovisqueuses.

2^o Comprimés.

3^o Suppositoires.

A l'encontre de l'*Opium total* le *Thébaïl* ne renferme que les seuls alcaloïdes, soporifiques et analgésiants de cette drogue, à l'exclusion des alcaloïdes, convulsivants et tétanisants.

0.02 de Thébaïl équivalent à 0.01 de morphine
0.05 d'extrait d'opium

Indic. thérap. — Analgésie générale. Insomnies.

Société des Marques Biologiques

Dépôt à PARIS, 11, rue Joseph-Bara

THÉISINE DUBAT

Granulé sucré à base de Théobromine
pure et d'extrait de maïs

Le plus puissant diurétique connu dans les affections du cœur et des reins ; Urémie, Albuminurie, Artériosclérose, Hydropises, Intoxication, Oppressions.

Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; seule préparation de théobromine ne produisant ni maux de tête ni troubles nerveux, et tolérée par les enfants, comme par les vieillards.

Dose et mode d'emploi. — Une cuillerée à café = 25 cgr. théobromine pure ; 5 cgr. extrait mou de maïs. — Une à huit cuillerées à café par jour.

G. DUBAT, docteur en pharmacie

80, Faubourg Saint-Denis — PARIS

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de Lithium cristallisé

Prop. Thér. — Possède les propriétés tonico-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais elle agit à des doses 4 à 5 fois moindres que celle-ci ; elle est dépourvue des inconvénients de la théobromine.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline (Méthode de Huchard) la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'ariémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1^{re} Solution. Dose : 3 à 4 cuill. à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.

Une cuill. équivaut à 0,50 cgr. de théobromine.

2^e Gouttes. — Dose : 3 à 4 par jour.

60 gouttes équivalent à une cuill. à soupe de solution.

3^e Comprimés. — Dose : 6 à 8 par jour.

2 comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

Laboratoires DUMESNIL

10, Rue du Plâtre — PARIS

THÉOBRYL " ROCHE "

(Théobromine injectable)

Indications, Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres.

(Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Bémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénéch, Ségard, Vigoureux, Colomès, Crampon, etc.)

Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants, sous deux formes très pratiques : Ampoules et Gouttes.

THÉOBRYL " ROCHE " AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Dose moyenne. — *Par voie intramusculaire indolore.* — Adultes : 2 ampoules par jour. Enfants : 1/2 ampoule par jour.

Dose forte. — *Par voie intramusculaire indolore.* — Adultes : 3 à 4 ampoules par jour. Enfants : 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence. — *Par voie endoveineuse ou intramusculaire.* — Adultes : 3 à 4 ampoules par jour, en 1 ou 2 fois. Enfants : 1 à 2 ampoules par jour, en 1 ou 2 fois.

THÉOBRYL " ROCHE " GOUTTES

1 cc. = XXX gouttes

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.

Dose moyenne. — Adultes : X à XX gouttes, 2 à 3 fois par jour et plus. Enfants : V à X gouttes, 2 à 3 fois par jour selon l'âge.

Ces doses peuvent être largement dépassées sans aucun inconvénient, sous la surveillance médicale.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS (3^e)

THÉOSALVOSE

Composition. — Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao. (Usine à Villeneuve-la Garenne, Seine).

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales, Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 par jour.

Forme. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

THIGÉNOL " ROCHE "

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Prop. thér. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indic. thér. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol " Roche " pur ou en solution glycinée (10 à 15 %) en applications externes :

Savon " Roche " au Thigénol, le meilleur savon antiseptique.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol " Roche " pur ou en solution glycinée (10 à 15 %).

Ovules " Roche " au Thigénol à 30 % (voir page spéciale).

Tampol " Roche " pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, Place des Vosges — PARIS

THIOL " ROCHE "

Dérivé du gailacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 de gailacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP " ROCHE " au Thiocol

(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol " Roche ")

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge

CACHETS " ROCHE " de Thiocol

(1 cachet = 0,50 Thiocol " Roche ")

2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS " ROCHE " de Thiocol

(1 comprimé = 0,50 Thiocol " Roche ")

2 à 6 comprimés par jour

Propriétés Thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocyto-gène, Enépeptique, Orexique.

Indications Thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites. Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}

21, Place des Vosges — PARIS

THIONHYDROL GRÉMY

Soufre colloïdal

Liquueur titrée à 0 gr. 20 par cuill. à soupe. —

Pommade. — *Ooules gynécologiques.*

Doses et mode d'emploi. — Une cuill. à soupe de *Liquueur* au milieu de chaque repas. — *Pommade* en frictions matin et soir.

Indications principales. — Rhumatisme chronique. — Affections chroniques des voies respiratoires (rhinites, pharyngites, laryngites, bronchites avec expectoration muco-purulente) (Associer l'Immunizol n° 16). — Syphilis (adjuvant du traitement mercuriel : voir Sigmodine). — Vaginites et métrites.

Dans l'arthritisme, il y a avantage à associer au Thionhydrol la Thyrénine Grémy.

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

THIOPEPTONE du Dr L. BRU

Soufre colloïdal organique à l'état naissant en sérum glycérimé, directement assimilable.

Indications. — *Le Poumon* : Tous états infectieux du poumon, congestions chroniques et reliquats d'affections aiguës. Pleurites, Douleurs d'épaules, Névralgies intercostales, Rhumatisme tuberculeux, *Tuberculose aiguë et chronique.*

Arrêt de la maladie. Pas de choc, pas de réaction, pas d'écotoxicité, action nettement tonique. (Les résultats s'obtiennent le plus souvent avec une rapidité remarquable.)

Formes pharmaceutiques :

1^o Ampoules de 20 cc. pour injections intraveineuses. (1 par semaine.) — La boîte de 3 ampoules, prix au public : 30 fr.

2^o Ampoules de 5 cc. pour injections hypodermiques ou intramusculaires (indolores). (1 à 2 par semaine). — La boîte de 6 ampoules, prix au public : 30 fr.

Dépôt général et littérature :

Laboratoires F. MOULIN

2, Rue Léon-Cogniet — PARIS

Adresse télégr. : Férouleff-Paris

THYMINÉ

Solution stable de Di-Chloro-di-Thymol
 $C^{20} H^{28} Cl^2 O^2$

Indications.

Antisepsie générale. Chirurgie. Gynécologie. Obstétrique (Ulcères profonds. Plaies infectées. Ulcérations néoplasiques.)

Posologie.

1 à 4 cuillerées par litre d'eau, suivant usage. (Ces doses peuvent être doublées, pour le traitement des plaies infectées des ulcérations profondes.)

Avantages.

Pouvoir antiseptique et cytogène élevé. Conservation indéfinie. Aucune action irritante. Jamais de réaction épidermique ou muqueuse.

Laboratoire de PASSY-MUETTE

2, Avenue Mozart (Tél.: Aut. 21-69)

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.
 (exempte de parathyroïdes)

Pilules dosées à 0,02, correspondant à 0,20 de glande fraîche.

Tablettes dosées à 0,01, correspondant à 0,10 de glande fraîche.

Doses et mode d'emploi. — Débuter par une pilule par jour pendant deux jours, puis alterner une et deux, puis deux pilules par jour. Au besoin, élever progressivement la dose jusqu'à six pilules, dose *maxima*.

Tablettes : doses doubles.

Suspendre momentanément le traitement : 1° si le pouls dépasse 100 pulsations, 2° si le malade accuse de la diarrhée, des transpirations, des bouffées de chaleur, des palpitations, du tremblement.

Indications. — Insuffisance thyroïdienne.

Arthritisme : associer la *Thyrénine* au *Thiohydrol Grémy*.

Aménorrhée : associer la *Thyrénine* à l'*Ocréine* (voir *Thyrocréine Grémy*).

14, Rue de Clichy — PARIS (9^e)

THYROCRÉINE GRÉMY

Synergie Thyro-ovarienne

Association d'Ocréine et de Thyrénine renfermant, pour une pilule, quatre parties d'Ocréine et une partie de Thyrénine.

Doses et mode d'emploi. — Deux à six pilules par jour, pendant 20 jours, de préférence une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Voir Ocréine.

14, RUE DE CLICHY — PARIS (ix^e)

TOCHLORINE

(Paratoluène sulfochloramine)

Produit antiseptique préconisé par Dakin sous le nom de Chloramine T.

C'est une poudre cristalline blanche, très soluble dans l'eau, ne coagulant pas l'albumine des plaies.

Douée d'une action germicide intense, elle n'est ni toxique ni irritante.

Usages Chirurgicaux : La Tochlorine trouve de nombreuses applications sous forme, soit de solution aqueuse à 1 % ou 2 %, soit de pâtes ou crèmes, en chirurgie générale, en urologie, en oculistique, en stomatologie.

Usages médicaux : Pour l'usage interne la Tochlorine a été proposée comme désinfectant de l'intestin ainsi que dans le traitement de la tuberculose pulmonaire.

Littérature sur demande

Etablissements POULENC Frères
92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique

Ampoules contenant chacune :

Eau de mer isotonique.....	5 cc.
Cacodylate de soude.....	0,05
Glycérophosphate de soude..	0,20
Sulfate de strychnine..... ..	1 mil.

Prop. thér. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoute l'action des 3 médicaments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — Tuberculose, neurasthénie, entérites. Convalescents.

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE

5, Rue Ballu — PARIS (Tél. Central 45-56)

TONUDOL

COMPRIMÉ de Nucléarsinate de Manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi :

Deux comprimés avant chaque repas.

Indications :

Reconstituant de l'organisme dans les surmenages, les troubles de la nutrition et de la croissance, la chlorose et les anémies.

Ne contient aucun excitant

Laboratoires LICARDY

38, Boulev. Bourdon — PARIS-NEUILLY

TOPIQUE BERTRAND

Vésicatoire idéal

Forme. — Le Topique Bertrand est préparé sous forme d'un sparadrap rouge, sans envers, possédant une souplesse et une homogénéité parfaites grâce à la présence d'un tissu spécial au milieu même de la masse emplastique. Il est rendu en quelque sorte aseptique par son inclusion en petits cartons hermétiquement clos qui le protègent des poussières et des germes auxquels le vésicatoire ordinaire est exposé dans toutes les officines.

Indications. — Pneumonies, pleurésies, pleurites, bronchites, douleurs thoraciques de la tuberculose pulmonaire, congestions, salpingites, péritonites, hydarthroses, névralgies, quel qu'en soit le siège (intercostal, sciatique, névritique, sus et sous-orbitaire.) Se prépare en carnets de toutes dimensions.

FILE DE MAI BERTRAND (sparadrap inaltérable, antiseptique au salénol) pour panser le Topique Bertrand.

LABORATOIRES DU TOPIQUE BERTRAND
Reichard et Philippe — OULLINS (Rhône)

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

TRAITEMENT MERCURIEL DISSIMULÉ

par les PILULES LEMARY (form. A, B ou C)
en pilules kératinisées

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit, soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille le fixer définitivement par un essai de médicament spécifique, soit qu'il tienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouve dans les **Pilules Lémary**, nom banal quelconque, mais **NOM DEPOSE**, ce qu'il désire : le traitement mercuriel dissimulé ou traitement secret.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

PILULES LEMARY

(formule A ou formule B ou formule C)
fortifiantes, dépuratives, reconstituantes
Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc toute sécurité.

Pour les Pilules Dupuytren Codex, prescrire
PILULES LEMARY, formule A. — Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les Pilules Ricord Codex, prescrire
PILULES LEMARY, formule A. — Dose habituelle, 2 par jour, 1 à chaque principal repas.

Pour les Pilules au biiodure de mercure et iodure de potassium, prescrire **PILULES LEMARY**, formule C. — Dose habituelle, 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.

Littérature — Echantillons

Laborat. du Docteur H. PHILIPPE

14, Rue Palais-Grillet — LYON

TRÉPOL

Traitement de la syphilis par les sels de Bismuth. Médication intra-musculaire en ampoules stérilisées.

Spirillicide à base de tartro-bismuthate de potassium et de sodium à 64 % de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation,

S'adresser aux :

Laboratoires **CHENAL & DOUILHET**

22, r. de la Sorbonne, PARIS (v°)

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Etats nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Epilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour.

Flacons de 30, 60 et 125 gr.

Laboratoire du Doct^r André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables : phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme. Cette spécialité reproduit la formule de Ferrier, ce qui explique et justifie sa vogue. La Tricalcine pure s'emploie en poudre, comprimés, granulés, cachets et tablettes chocolat dans le traitement de la tuberculose et comme tonique de premier ordre, dans l'anémie, les convalescences, etc.

Tricalcine en poudre : une mesure à chacun des 3 repas dans un peu d'eau ou mélangée aux aliments, 1/2 dose au-dessous de 10 ans; comprimés : 3 par jour; granulés : 2 cuillers-mesure à chaque repas, enfants au-dessous de 10 ans, 1/2 dose; tablettes chocolat : 2 tablettes à chacun des 3 repas, enfants au-dessous de 10 ans, une tablette; cachets : 3 par jour.

Tricalcine méthylarsinée (0 gr. 01 par cachet) en cachets seulement : 3 par jour; enfants, 2.

Tricalcine adrénalinée en cachets seulement : 3 par jour.

Tricalcine fluorée en cachets seulement : 3 par jour.

(1) Les études radiographiques sur l'ostéoporose dans les fractures de guerre ont démontré l'importance de la récalcification par la Tricalcine, en chirurgie osseuse. De plus dans les cas de déminéralisation, elle apporte par transformation physiologique, grâce au chlorure de calcium et à l'acide glycérophosphorique, les matériaux indispensables pour rétablir la nutrition troublée.

Laboratoire des Produits Scientia
10, Rue Fromentin — PARIS

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Laboratoire DALLOZ

13, Bd de la Chapelle — PARIS (10^e).

TRIFERYL

Forme. — Comprimés chocolatés de Nucléinate de fer, composé ferro-organique entièrement assimilable, dosés à 0 gr. 30.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 3 comprimés par jour, au début de chacun des repas. Les croquer.

Enfants : Donner 1 ou 2 comprimés par jour aux repas.

Prop. théor. — Puissant reconstituant des globules sanguins et des noyaux cellulaires. Augmente la quantité d'hémoglobine dans le sang jusqu'à 90 %

Indications. — Anémies, Chlorose, Faiblesse générale, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, etc.

E. HAUTDIDIER

37, Rue Galilée — PARIS

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées à Noyau Mou)

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième	Deux Gouttes (3 centigr.)
Cafféine.....	Deux centigrammes
Chlorhydrate d'Héroïne	Un demi milligramme

Propriétés et Indicat. thérap. — *Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquent aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme Cardiaque, l'œdème Pulmonaire.

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *av*alées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée du principe actif et par là-même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.
Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Laboratoires LALEUF

49, av. de La Motte-Picquet — PARIS (15^e)
Téléph. Ségur : 65-01

TRIXYL FRAUDIN

Comprimés très bien tolérés

Tonique, Stimulant, Reconstituant
Reminéralisateur immédiatement actif
Hémato, Neuro, Trophique

Indications thérapeutiques :

Neurasthénie, Surmenage, Anémie, Pré-tuberculose, Tuberculose, Rachitisme, etc.

Doses :

Adultes, 4 à 6 par jour et plus.

Enfants, 1 à 3 par jour, selon l'âge.

Laboratoire E. FRAUDIN
BOULOGNE (près Paris)

TUBE SALS

Pommade ophtalmique indolore
à l'oxyde orangé de Hg
(à 1-2-3-4-5 %.)

Indications. — Blépharites, Conjonctivites, Kératites.

Composition. — Oxyde orangé de Hg de préparation récente, chimiquement pur et porphyrisé; lanoline et vaseline pures stérilisées.

Propriétés. — Suppression de la douleur. Innocuité absolue. Asepsie complète. Conservation indéfinie.

Laboratoires du Topique Bertrand
BLANCHARD & PHILIPPE
OULLINS (Rhône).

TUBERCULINE C. L.

Pour le traitement de la tuberculose

Tuberculine C. L. est présentée en solution dans de l'eau physiologique stérilisée.

Série des ampoules est répartie en trois séries de 12 :

Série O. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 cent millième à 7 dix-millièmes et demi de milligramme.

Série A. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 millième à 3 dixièmes de milligramme.

Série B. — Ampoules contenant par centi-cube de 1 à 3 milligrammes.

Usage. — Habituellement, une injection tous les 2 jours.

Les injections ne produisent aucune douleur aucune gêne et le malade peut vaquer aux occupations permises par son médecin.

Littérature sur demande

Établissements POULENC Frères

2, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

TUBÉROL

Association d'essences balsamiques pures.

Propriétés therap. — Sans aucune toxicité. Irritant. Il est absorbé par la peau ou respirées en fumigations ou inhalations, puis exhalé avec toute son efficacité antiseptique par la muqueuse des voies respiratoires. Une petite quantité est éliminée par les reins dans les urines.

Indic. therap. — a) Toutes affections des voies respiratoires : Broncho-pneumonie, Bronchite capillaire, Abscès du poulmon, Pneumonies grises, Bronchites aiguës, Catarrhes des apophysémateux, etc.

b) Les états ganglionnaires : Ganglions et Abscès froids non fistuleux.

Mode d'emploi. — 1° Applications thoraciques. Dans une flanelle bien imbibée qui sèche sur même la peau.

2° En inhalations, 1/2 cuil. à café dans un litre d'eau bouillante.

3° En compresses. Sur les ganglions, par un mélange de 2 ou 3 parties d'huile ou de vaseline.

Laboratoire du TUBÉROL

23, Rue des Moines — PARIS

Téléphone : Marc. 04-02

TUBES du Docteur GUIRAUD

(Anciennement DAVIEL)

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde de jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de conservation extrême et une puissance d'action considérable.

Echantillons sur demande

Docteur GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux

98, Rue Saint-Genès — BORDEAUX

TUBES DULCIS

Argolène (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës. à 5 0/0 et 10 0/0.

Cadmiol (Sel de Zn et Cd). — Conjonctivites chroniques. à 1 0/0.

Cuprinol (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques. à 1 0/0, 2 0/0, 5 0/0.

Iodo-Calciqne. — Traitement de la cataracte. à 8 0/0.

Nov-Optochine. — Ulcères à pneumocoques. à 1 0/0.

Oxyde orangé de Hg. — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires. à 1 0/0 2 0/0, 3 0/0, 4 0/0, 5 0/0

Ophtalmoforme. — Antipurulent. à 2 0/0 3 0/0.

Aristol. — Antipurulent. à 2 0/0.

Bleu de Méthylène. — Antipurulent. à 1 0/0.

Iodoforme. — Antipurulent. à 1 0/0, 2 0/0.

Thiosinamine. — Opacités, synéchies. à 1 0/0.

Alcaloïdes seuls.

Alcaloïdes associés.

Laborat. de Thérapeutique oculaire
du Docteur FERRY, à BOURG (Ain)

ULCERINE BERGER

Forme. — Pommade contenant les principes actifs du *populus nigra* et *balsamifera*.

Indic. Thér. — Ulcères variqueux, Brûlures anciennes, Escarres, Radiodermites, Chancres mous, Bubons chancreux, Plaies à la suite d'opérations, Ulcérations succédant aux gelures.

Propriétés. — Cicatrisation des Ulcères variqueux en déterminant une prolifération cellulaire intense qui remplace la perte de substance. — Epidermisation rapide des brûlures anciennes, des Escarres, des Radiodermites. Guérison des chancres mous en quelques jours.

Mode d'emploi. — Laver la plaie avec de l'eau bouillie additionnée de moitié eau oxygénée chirurgicale à 12 volumes. Appliquer ensuite sur la plaie une gaze stérilisée préalablement enduite d'Ulcérine et maintenir le pansement avec une bande élastique. Faire le pansement matin et soir.

Echantillons sur demande :

Laboratoires I. BERGER

90, Av. du Bac, La Varenne-Saint-Hilaire (Seine)

Demandez-nous tous les renseignements que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage.

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Ether salicylique liquide d'odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène pur, flacons de 30, 60, 125 cmc.;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) ;

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoires du D^r André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (1^{re})

URACÉTOSE

Granulé sucré effervescent soluble

Propriétés thérap. — Action uricolytique très énergique, diurétique aussi puissante que douce pour le filtre rénal. Antiseptique urinaire et hépato-rénal par excellence ; analgésique.

Tolérance indéfinie. Aucune contre-indication.

Composition. — Tartrate de pipérazine (Lycétol), hexaméthyltétramine, salicylate, benzoate et formiate de lithine lactose et sucre effervescent

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme. Artério-Sclérose, Douleurs, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques et hépatiques, Névralgies, Migraines, Sciatiques, Maladies du foie, des reins, de la vessie et des Voies urinaires (Néphrites, Pyélo-Néphrites, Cystites, Urétrites, Hémorrhagies, etc.)

Grippe, Influenza, Fièvre et toutes les maladies infectieuses.

Dose et Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour dans de l'eau. Pour les enfants de 5 à 15 ans, par demi-cuillerées à café, 3 à 6 par jour.

Echantillons et Littérature

Laboratoires FEBVIER & DECOISY

26, rue Bérignô — PARIS (4^e)

URASÉOL

Dissolvant de l'acide urique.
Antiseptique urinaire.

Forme. — Comprimés solubles.

Composition :

Acide thyminique.....	0 gr. 05
Benzoate de lithine.....	0 gr. 10
Urotropine	0 gr. 45
par comprimé.	

Posologie. — 4 comprimés par 24 heures, préalablement délayés dans un peu d'eau.

Indications. — Diathèse urique (Rhumatismes, Goutte, Gravelle), Antiseptique des voies urinaires.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} Classe,
de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

URASEPTINE ROGIER

A base de Piperazine, Urotropine, Helmitol, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 60 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique Urinaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 8 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

URAZINE

(Citro-salicylate de Pipérazine)

Le plus actif des dissolvants de l'acide urique et des urates, analgésique, antiseptique.

Le médicament de choix à opposer à la *lithiase rénale* et à toutes les *manifestations arthritiques* (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.).

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Comprimés dosés à 0 gr. 30 (3 à 4 par jour, au moment des repas).

Granulés effervescents (une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas.)

Laboratoire des Produits

"USINES DU RHONE"

21, Rue Jean Goujon — PARIS (8^e)

URIFLUINE

Le seul sel de Lithine injectable sous la peau sans douleur ni réactions

Indications. — Rhumatisme chronique et déformant, goutte, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, sciatique.

Propriétés thérapeutiques. — Ce sel dissout l'acide urique au sein de l'économie et ensuite aide à son expulsion par une action diurétique très accusée.

Mode d'emploi. — Les injections peuvent se faire dans toutes les régions du corps ; elles n'ont aucun inconvénient, n'amenant ni douleurs, ni gonflement, ni réaction d'aucune sorte. Selon les cas, en faire une matin et soir, une par jour, une tous les deux jours.

Les comprimés d'Urifluine se prennent à la dose de 2 à 4 par jour.

Laboratoires BEAUGONIN

4, Place des Vosges — PARIS

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine (urotropine) dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 1 gr. de Benzoate d'urotropine + 0,20 cgr. d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérap. — Antiseptique urinaire et biliaire complet ; balsamique et diurétique ; dissolvant phosphatique, urique et uratique ; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Prix réglementé : 7 fr. 50 le flacon

Laboratoires de l'« URISANINE »

28, rue Milton — PARIS

URNOSOL

Antisepsie intégrale du tube digestif.

Composition. — Héxaméthylène, amine et sels alcalins desséchés et purs.

Indications. — Constipation, entérite, entéro-colite, troubles digestifs, dyspepsies, congestions du foie, lithiases biliaires, vésicales ou rénales, diabète.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un verre d'eau de Vichy (Grande Grille) chaude, le matin à jeun.

5 jours de traitement.

5 jours de repos, etc.

Innocuité absolue — Dose pouvant être augmentée sans inconvénient.

Laboratoires de l'URNOSOL

10, rue de Richelieu — PARIS (1^{re})

UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0,50. Solution injectable en ampoules de 2 et 5 cc. à 0 gr. 25 par cc.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 1 à 3 gr. par jour.

Prop. thér. — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant parfait de l'acide urique.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

G. BEYTOUT & L. CISTERNE

12, Boulevard St-Martin — PARIS (10^e)

FROMETINE LAMBIOTTE FRÈRES

Comprimés de 0 gr. 50

d'Hexaméthylène tétramine pure

Dose et Modes d'emploi. — *Traitement de la Diathèse urique* : 3 comprimés par jour dissous dans un peu d'eau et pris à n'importe quel moment.

Maladies des voies Urinaires. — *Etats aigus* : 4 à 8 comprimés par jour pris dans un peu d'eau à n'importe quel moment. — *Etats chroniques* : de 3 à 4 comprimés par jour.

Indications. — Contre la Diathèse urique et les infections des voies urinaires.

Prop. Thér. — Dissolvant puissant des urates, antiseptique urinaire type.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE Frères

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (8^e)

Téléph. Wagram 14-73

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimés à faire dissoudre.

Composition. — Benzo-camphorate, d'urotropine et extr. de styles de maïs.

Indications. — S'emploie avantageusement dans tous les cas où l'urotropine est indiquée. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites, Prostatites, Urétrites, Pyélites, Pyélonéphrites, de la Grippe, Fièvre typhoïde, Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Calculs, Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Laboratoire DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS

Nous vous serons reconnaissants de nous faire connaître les modifications que vous jugerez utiles d'apporter à cet ouvrage.

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour, l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injections, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

Laboratoires BEAUGONIN

4, place des Vosges — PARIS

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

• A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification véritablement impressionnante du tableau classique de la Pneumonie. •

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards. Congestion grip-pale.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule, soit 1 cc. 1/2 et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

Laboratoires BEAUGONIN

4, place des Vosges — PARIS

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Ces vaccins sont constitués par des émulsions de cultures microbiennes en milieu fluoruré.

Le procédé de préparation assure à une façon absolue la mort des microbes, qui conservent cependant toutes leurs propriétés à la vie près. Pratiquement *atoxiques* et *stabilisés* ils conservent leur activité pendant une très longue période.

On peut les utiliser à titre *curatif*, sans réaction fébrile appréciable.

Polyethniques, donc polyvalents, leur efficacité est égale, sinon supérieure à celle des auto-vaccins. Leur emploi ne nécessite ni calculs, ni technique compliquée.

La série comprend les trois vaccins suivants :

NEO-DMEGON antigonococcique,

NEO-DMESTA antistaphylococcique.

NEO-DMETYS anticoquelucheux.

APLEXIL, préventif des complications pulmonaires de la grippe.

(Voir chacun de ces mots)

Mode d'emploi et Posologie. — Injections sous-cutanées ou intra-musculaires d'une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Littérature sur demande :

Etablissements POULENC Frères

92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie. — Vaccinothérapie

VACCIN : Antityphoïdique,

— Antistaphylococcique,

— Polyvalents I et II,

— Pneumo-Streptococcique,

— Antistreptococcique,

— Anticolibacillaire,

— Antimélitococcique,

— Antiméningococcique,

— Antidysentérique,

— Anticholérique.

Injectables en injections sous-cutanées.

DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX :

DEFFINS, 40, Faubourg Poissonnière — PARIS

REBOUL, 15, Allées des Capucines — MARSEILLE

HAMELIN, 31, Rue Michelet — ALGER

Pour Littérature et Echantillons :

18, Rue Dragon — MARSEILLE

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du **Formulaire Magistral** sur le bureau du médecin.

VACCINS MICROBIENS CURATIFS

Immunizols Grémy en ampoules injectables

(Voir : Immunizols)

Médicaux

- 10 Furunculose.
- 11 Entérite.
- 12 Appendicite.
- 13 Asthme.
- 14 Asthme des foins.
- 15 Eczéma. - Psoriasis.
- 16 Bronchites chroniques.
- 17 Rhumatisme.
- 19 Acné.
- 20 Méningocoque.
- 21 Dysenterie.
- 22 Typhoïde.
- 23 Grippe.

Oculaires

- 60 Conjunctivites chroniques.
- 61 Ulcérations de la cornée.

Chirurgicaux

- 30 Ostéomyélite.
- 31 Abscess chauds. Plaies suppurées.
- 32 Abscess froids. - Fistules.
- 33 Sarcome.
- 34 Gangrène.

Génito-Urinaires

- 18 Uréthrites.
- 40 Cystites. — Pyélonéphrites.
- 41 Métrites.

Auriculaires

- 50 Otites. — Sinusites. Mastoïdites.

Dentaires

- 70 Pyorrhée alvéolo-dentaire.

IMMUNIZOLS GRÉMY en comprimés

à administrer par voie buccale.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 10 Furunculose. | 18 Uréthrites. |
| 11 Entérite. | 22 Typhoïde. |
| 12 Appendicite. | 40 Cystites. — Pyélonéphrites. |
| 13 Asthme. | 41 Métrites. |
| 14 Asthme des foins. | 70 Pyorrhée alvéolo-dentaire. |
| 15 Eczéma. - Psoriasis. | |

NOTA. — On prescrit les IMMUNIZOLS GRÉMY en spécifiant :

1° Le nom de l'affection à traiter ou le numéro qui lui correspond dans la nomenclature ci-dessus ; 2° s'il s'agit d'un Immunizol *injectable* ou d'un Immunizol en comprimés (voie buccale).

Exemples : Immunizol Grémy "Asthme" injectable ou Immunizol Grémy 13 injectable. — Immunizol Grémy "Entérite" en comprimés ou Immunizol Grémy 11 en comprimés.

14, Rue de Clichy — PARIS (9°)

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

Le flacon : 6 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie

19, Avenue de Villiers — PARIS

VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules

Bromovalérianate sodique alcalin.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance.

Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes.

Dose. — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/2 verre d'eau sucrée par jour, dont une le soir.

Envoi échantillon et littérature.

Laboratoire PUY

GRENOBLE

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Prop. thérap. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuill. à café par jour.

Pharmacie GRIGNON

2, Rue Duphot — PARIS

VALÉRIANATE PIERLOT

Le VALERIANATE PIERLOT,

liquide ou en capsules

RESTE TOUJOURS et MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

H. RIVIER

Pharmacien de 1^{re} Classe

Successeur de LANCELOT & C^{ie}

26 et 28, Rue Saint-Claude

PARIS

VALÉRIANE GMET

Extrait *total* de Valériane officinale
Préparation liquide sans alcool ocrres-
pondant à 2 gr. de plante par cuill.
à café.

Voir *Produits Gmet*, page 265.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 cuill.
à café par jour dans un peu d'eau
froide. Enfants 1/2 dose.

Prop. thér. — Antispasmodique. Toni-
sédatif cérébro-médullaire.

Indications. — Insomnies, Chorée, Epi-
lepsie, Agitation, Névralgies. Tous
états névropathiques.

Littérature et échantillons sur demande au

Service Médical des Produits GMET

27, Faubourg Montmartre — PARIS (9^e)

Tél. Bergère 43.10

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche
stérilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du sys-
tème nerveux, Antispasmodique, Antiné-
vralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par
jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane
fraîche stérilisée et pepsine.

De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures

Laboratoires du D^r André GIGON

7, Rue Coq-Héron — PARIS (1^{er})

VALÉROBROMINE LEGRAND

Liquide : Dosé à 0,50 cgr. de bromovalérianate de soude par cuill. à café.

Capsules enrobées de gluten : Dosées à 0,25 cgr de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Propriétés. — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les indications des bromures avec plus d'activité et sans en avoir les inconvénients.

Doses. — *Liquide* : 2 à 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules* : 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE Frères

13, rue Pavée — PARIS

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de suc *frais de valériane* combiné au *Validol*.

Prop. thérap. — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

Indic. thérap. — Neurasthénie, Hystérie, Insomnie, toutes Affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

PHARMACIE INTERNATIONALE

71, Faubourg Saint-Honoré

LABORATOIRE DE FABRICATION

108, Faubourg Saint-Honoré, 108

PARIS

VALÉRONAL

Solution ou Comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Formule par cuil. à café ou par comprimé :

Véronal sodique très pur..... 0 gr. 15

Extrait fluide de Valériane fraîche Q. S.

Dose sédative : 1 cuillerée à café ou un comprimé, 2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique : 1 cuillerée à café ou un comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Prix : 7 Fr.

Laboratoire BERGER

14, Rue des Pyramides — PARIS

Ce n'est pas nous que vous devez remercier, si cet ouvrage vous rend service, ce sont les Spécialistes qui en font les frais. Et vous ne pouvez mieux le faire qu'en prescrivant leurs produits.

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la pré-tuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme et les leucémies.

Mode d'emploi. — La Vanadarsine s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler dont elle n'a pas les inconvénients : V à X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Serum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 003 arséniate de vanadium par cent. cube.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, pré-tuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 2 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

VANADINE CHEVRIER

Composition :

Solution d'acide vanadique chloratée.

Propriétés :

Stimulant de l'appétit ; sans action sur l'estomac.

Indications :

Emploie dans la prétuberculose, la tuberculose, l'anémie, la neurasthénie et les affections de l'estomac.

Mode d'emploi :

Six à dix gouttes dans une cuillerée d'eau avant le repas.

Docteur G. CHEVRIER

21, Faubourg Montmartre — PARIS

VANUCLÉOL

Composition.

Nucléophosphate de vanadium strychnarsiné.

OXYDANT par le Vanadium.

TONIQUE par la Strychnine.

LEUCOSTHÉNIQUE par les Nucléines.

Indications.

Neurasthénie, Asthénie, Surmenage, Tuberculose et Prétuberculose, Anémie, Chlorose.

Formes médicamenteuses.

AMPOULES. — Boîte d'ampoules pour 12 injections journalières.

GOUTTES. — 10 à 20 gouttes par repas.

Laboratoires H. LACROIX

V. MEROBIAN, Successeur

29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, 29 et 31
PARIS (X^e)

VARÉNOFERMENTS

Levures sélectionnées de bière et de raisin, desséchées par un procédé spécial qui leur assure une conservation parfaite et une activité égale à cinq ou six fois le même poids des mêmes levures fraîches en pâte.

Produit plus actif que les ferments liquides, sous une forme concentrée

Forme. — Cachets — Poudre.

Indications thérapeutiques. — Constipation, Diarrhée, Entérite, Furonculose, Eczéma, Auto-intoxication, Arthritisme, Maladies de la nutrition.

Laboratoire des VARENOLS et des Varénoferments

26, rue des Trois-Frères — PARIS (18°)
Tél.: NORD 83-88

Le Dictionnaire des Spécialités Pharmaceutiques deviendra le pendant du Formulaire Magistral sur le bureau du Médecin.

VARÉNOLS

Sérums campho-chlorés

Application du Chlore en Médecine interne
Forme. — Ampoules hypodermiques.

VARENOL. — Indic. therap. — Maladies infectieuses à forme apyrétique, gourme, eczéma, rhumatisme, etc.

Dose. — 60 cc. chez l'enfant ; 125 cc. chez l'adulte.

Mode d'emplol. — Une injection hypodermique quotidienne.

ENDOVARENOL. — Indic. therap. — Maladies infectieuses à forme pyrélique (grippe, pneumonie, typhoïde, etc.).

Dose. — 125 à 250 cc.

Mode d'emplol. — Instillations rectales, matin et soir.

VARÉNOLS EXTERNES

Cytovarénol, pour pansements. — Genovarénol, blennorrhagie. — Leucovarénol, gynécologie. — Lipovarénol, ulcères plaies atones. — Oléovarénol, brûlures. — Ophtalmo-varénol, oculistique. — Stomavarénol, infections de la bouche et de la gorge.

Littératures et Echantillons sur demande

Laboratoire des VARENOLS

26, Rue des Trois-Frères — PARIS (18°)

Téléphone : Nord 83-88

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

Dose et Mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, un ou deux Comprimés avant le repas du soir en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le 6^e jour, et continuer la variation.

Prop. Thér. — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation — Tolérance parfaite — Innocuité absolue.

Laboratoire de la VARILAXINE

164, Rue Saint-Honoré — PARIS

VASOLAXINE

Huile de Vaseline pure

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant

Enfants : 1 cuillerée à café.

Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon 6 fr.-50

Laboratoires FOURNIER Frères
26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Deux comprimés avant les repas de midi et du soir.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 1,15 amide barbiturique diéthylé et 1 gr. Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie. — Comme sédatif : 1 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans infusion ou eau sucrée.

Flacon de 125 cc. : 7 francs

Laboratoire BURIAT

30, rue Pergolèse — PARIS

Feuillets jaunes : Système nerveux, hypnotiques, calmants, antispasmodique, maladies mentales.

VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de *Passiflora incarnata* dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Prop. Thér. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, Névrose d'angoisse, etc.

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Etablissements Albert BUISSON

157, Rue de Sèvres — PARIS

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif

Malaga vieux - Quinquina - Cacao

Indications :

Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Etats consumptifs, Diabète, Convalescence des Maladies aiguës, Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à liqueur aux deux principaux repas.

P. LEBEAULT & C^{ie}

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (3^e)

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrée par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode..... 0 gr. 075 mil.

Tannin..... 0 gr. 50 cent.

Lactophosphate de chaux 0 gr. 75 cent.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne, demi-dose pour enfant.

Prop. thérap. — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

Indicat. — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1^{er} degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

Laboratoire A. GIRARD

48, Rue d'Alésia — PARIS

VITAMYL

Extrait frais et concentré

de toutes les VITAMINES conservées vivantes
Indications. — Spécifique des états pathologiques dus au manque de VITAMINES.

Scorbut infantile. Croissance ralentie. Développement incomplet. Rachitisme. Troubles de la Grossesse et de la Lactation. Dyspepsie des Régimes. Convalescence. Sénilité précoce.

Mode d'emploi. — Aux enfants au-dessous d'un an, 1 cuillerée à café par jour suffit.

Aux enfants de 1 an à 5 ans, 2 cuillerées à café par jour.

Aux adultes, 1 cuillerée avant chacun des trois repas.

Laboratoire BEAUGONIN

4, place des Vosges — PARIS (IV^e)

XEMADERM

Composition. — Pommade à base de corps gras entièrement absorbés par la peau.

Aspect. — Crème blanche d'odeur agréable.

Propriétés. — Calme les démangeaisons et favorise la reconstitution des tissus.

Indications. — ECZÉMA et toutes les affections para-eczémateuses : acné, impétigo, pityriasis, psoriasis, séborrhée, etc..

Mode d'emploi. — En applications matin et soir.

Dans l'acné ponctuelle, lotionner d'abord avec l'*Acnédermine* (solution décapante).

Laboratoire GILLOT

59, Rue de Châteaudun — PARIS

LA YAOURTINE

Comprimés sucrés de Yaourt frais.

Composition. — Culture sèche de ferments lactiques bulgares. Le noyau central vivant est enrobé de sucre dur qui met le ferment à l'abri de l'air, de la lumière et de l'humidité qui le tuent, et lui assure le maximum de longévité. (Un an en moyenne).

Forme. — Dragées rondes.

Prop. therap. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale sous toutes ses formes. Indiqué dans toutes les maladies qui favorisent cette auto-intoxication : gastro-entérite, entéro-colite, appendicite chronique, hépatites et pancréatites.

Posologie. — Nourrissons : 3 à 4 comprimés par jour en solution dans de l'eau bouillie ou du lait (solution fraîche).

Enfants : 10 comprimés par jour à intervalles réguliers. (Laxatif à dose plus forte).

Adultes : 15 à 20 comprimés par jour. 3 à 4 après les repas pour les forts mangeurs.

Adresse : L.-J. MOUNIER, Pharmac. de 1^{re} cl.
16, rue Saint-Gilles — PARIS (3^e)

Téléph. : Arch. 45-00

ZOHOL

Prop. Thér. — Reconstituant.

Indications. — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1^{re} Forme : En granulés.

Composition :

Hypophosphite de chaux	0 gr. 05
— fer.....	0 gr. 05
— manganèse.....	0 gr. 05

Mode d'emploi. — 1 cuill. à café à chacun des principaux repas.

2^{re} Forme : En ampoules.

Composition :

Hypophosphites composés	0 gr. 18
Sulfate de strychnine	1/4 de mgr.
Eau physiologique Q. P.....	2 cm ³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

Laboratoires Réunis

159, Avenue de Wagram — PARIS

ZYMATINE LESCÈNE

Composition — Galactozymases, Vitamines associées aux carbonophosphates minéralisants.

Propriétés. — Elle ne change pas la saveur du lait dont elle assure la conservation et la parfaite tolérance.

Fait disparaître les troubles digestifs et la constipation.

Le meilleur saturant dans l'hyperacidité stomacale. Elle supprime les fermentations secondaires.

Indications. — Enfants : Prophylaxie de la gastro-entérite, Maladies de nutrition aiguës ou chroniques, Constipation, Rachitisme.

Adultes : Constipation, Affections du tube digestif, Dyspepsies avec hyperacidité, Ulcères de l'estomac.

Usages. — Enfants : 1 centigramme par gramme de lait pur ou 2 cuillerées à café par litre de lait bouilli et refroidi ; agiter fortement pour mélanger. Donner tiède en agitant de temps en temps, à une température ne dépassant pas 50°.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après les repas.

Laboratoires LESCÈNE

à LIVAROT (Calvados)



3^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec noms et adresses
de leurs fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2^e partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.

A

'Acépilline Rambaud	12, rue Beautreillis, Paris.
'Acésine	Lab. A. GUILLAUMIN, 13, r. du Cherche-Midi, Paris (7 ^e).
'Achanol	USINE DES AUBRAIS, 286, faub. Bannier, Orléans.
'Acrisol Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
'Adrénaline Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
'Adrénaline Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
'Adrénophyséine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
'Adrénopitutine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
'Adrèpatine	Lab. LALEUF, 49, avenue, Lamotte-Picquet, Paris.
'Ethone Falcoz	9, rue Boissonnade, Paris.
'Atatyl	Lab. H. CARRION & C ^{ie} , 54 faub. St-Honoré, Paris.
'Agaryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
'Agomensine Ciba	1, place Morand, Lyon.
'Agonol Cognet	43, rue de Saintonge, Paris.
'Ainol Roche	21, place des Vosges, Paris.
'Akésol Muzi	ROUSSY, à Sarlat (Dordogne).
'Aicarhène Monnier	19, rue de Chartres, à Neuilly- sur-Seine.
'Akoolature d'Aconit Ecalie	BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
'Aldogène Carteret	15, rue d'Argenteuil, Paris.
'Alepsal Genèvevlier,	2, rue du Débarcadère, Paris.
'Alga Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
'Algarine Nyrdhal	20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
'Algatan	Laboratoire de l'Anlodol, 40, rue Condorcet, Paris.
'Algocratine Lancosme	71, avenue Victor-Emma- nuel III, Paris.
'Algolane Poulenc	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
'Algyrène Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-s-S.
'Aliment Tinardon	Labor. OBERLIN, 17, rue Cadet, Paris.
'Allocaïne Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.
'Aloysine Gouzène	139, rue de Paris, Pantin.
'Alnozal	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
'Amandol	DURET & RÊMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
'Ambrine	48, b. La-Tour-Maubourg, Paris.
'Amibiasine	27, rue Miromesnil, Paris.
'Amidal ,	Lab. Prod. Biologiques, 6, rue de la Baignerie, Lille.
'Ampoules bi-iodure Hg. Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
'Ampoules Boissy	32 bis, bd d'Argenson, Neuilly.
'Ampoules Churchill	SWANN, 12, r. Castiglione, Paris

* Ampoules de Digalène	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
Ampoules Dubé	MILLOT, 54, rue Bienfaisance, Paris.
Ampoules Guillaumin	168, b. Saint-Germain, Paris.
* Ampoules de Pantopon	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
* Ampoules Reipar	DRAPIER, à Audincourt.
* Amylodiastase Thépénier	2, rue Clapeyron, Paris.
Analgénine	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
* Anapeptone Vassal	28, r. Hôpital Militaire, Lille à Livarot (Calvados).
* Anaquintine Lescène	41, r. d. Francs-Bourgeois, Paris.
Anasepsine J. Muraire	47, rue Blanche, Paris.
Anestile Bengué	DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Anexol	4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
* Angiolymphé	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Angiosthénine	40, rue Condorcet, Paris.
* Anlodol	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
* Antacidol	13, boul. de la Chapelle, Paris.
* Antalgol Dailloz	Etabl. POULENC Frères, 32, r. Vieille-du-Temple, Paris à Reims.
* Anthema	FAGARD, 44, rue d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
* Antialgos Christlaens	FOULON et C ^{ie} , 188, faubourg Saint-Martin, Paris.
* Antiasthme Bengalais	MIDY & C ^{ie} , 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Anti-Cholestérine	MIDY & C ^{ie} , 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Antigastralgique Winkler	MIDY & C ^{ie} , 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
* Antigrippine Midy	MIDY & C ^{ie} , 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Antikamnia	5, rue de la Paix, Paris.
Antimucose Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
* Antiphlogistine	116, rue de la Convention, Paris.
Antipyrine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Antipyrine Cün	20, r. Fossés-St Jacques, Paris.
Antipyrine Le Perdreu	11, rue Milton, Paris.
* Antirrhoïde Bélières	19, rue Drouot, Paris.
* Anturique de Contrexéville	286, faub. Bannier, Orléans.
* Antodyne Poulenc	92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
* Antonai	Lab. CARESMEL, 5 et 7, rue Henry-Gréville, Angers.
* Anusol	Pharmacie du D ^r MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
* Apaiudol	AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
Aplol Briand	DEGLOS, 131, rue de Valenciennes, Paris.

Agiol Joret et Homolle	165, rue Saint-Honoré, Paris.
Ajolline Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
*Aplaxil	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Apocynine du D ^r Des- champs	LALEUF, 49, avenue Lamotte- Picquet, Paris.
*Aquilol	Pharmacie du D ^r MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Archésine Trouette- Perret	15, rue des Immeubles-Indus- triels, Paris.
Argent colloïdal Nyr- dhal	20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
*Arhéol Astier	45, rue du D ^r -Manche, Paris.
*Arhine Lambiotte Fr.	3, rue d'Edimbourg, Paris.
*Arquértoïl	LESURE, 70, rue du Bac, Paris
Arrhénaï Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Arrhénuclène Bergevin	à Chateaudun (Eure-et-Loir).
Arsenic Organique Glasser	COIRRE, 79, rue du Cherche- Midi, Paris.
*Arséniode	BURIAT, 30, r. Pergolèse, Paris
Arsenon Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Arsénobenzol Billon	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Arsiodyl Chassaigne	à Ruffec (Charente).
Arsiquinine Lemaitre	12, rue Vavin, Paris.
Arsycodyle Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Arsynal Legrand	GRÉNY, 14, r. de Clichy, Paris.
*Artério-Sérum Vincardi	VIGUIER, 42, av. Borriglione, Nice.
Arthricide	N. COUVE & C ^{ie} , 16, rue de la Bienfaisance, Paris.
*Arthri-sel	BOILLOT & C ^{ie} , 9, rue Saint- Paul, Paris.
*Arthritose	Lab. du MARINOL, à Dieppe (Seine-Inférieure).
*Asciatine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Ascotéline Rivier	26, rue Saint-Claude, Paris.
Aspirine	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Aspirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Asquirrol Poulenc	92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Asthmolysine	Lab. G. MIESCH, 228, boul. de la Villette, Paris.
Asthmor	GOBERT, 83, av. J.-B. Clé- ment, Boulogne-sur-Seine.
*Atophan Cruet	13, rue des Minimes, Paris.
*Atoquinol Ciba	1, place Morand, Lyon.
Atoxyl Poulenc	92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Atural Poulenc	d ^e
Aurion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Avanazol Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.

- *Azigol Thévenot
Azotyl
*Azufrol Couturieux
- 21, rue des Roses, Dijon.
50, rue Rennequin, Paris.
18, avenue Hoche, Paris.

B

- *Backérine
*Bactloxyne
Bains du D^r Deschamps
*Bakamlodol
*Bakamoi Lescène
*Baume Baissade
Baume Bengué
Baume du D^r Biancard
Baume Delacour
*Baume du D^r Gigon
(à l'ulmarène)
Baume Lartigol
*Baume Rhodia
Baume Suelta
Benzhermyl
*Béatol
Benzoate de Naphtol
Benzocalyptol
*Benzo-iodhydrineBruei
*Benzo-Lactol
Benzo-Ringyl
*Benzylol
*Bétul-Oi Midy
*Bibromure de Hg.
Vicarlo
Bilsec Lefrancoq
*Bihégon
Bi-iodures Cros
*Bi-iodure de Hg. Midy
*Bi-iodure Souffron
- Lab. Prod. Biologiques, 6, rue
de la Baignerie, Lille.
USINES CHIMIQUES DU
PECOQ, 39, r. Cambon, Paris.
49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
DEBOEUF, 10, rue Washington
Paris.
à Livarot (Calvados).
D^r BAISSADE, à La Garde,
près Toulon (Var).
47, rue Blanche, Paris.
LAPORTE, 1, rue d'Enghien,
Paris.
ROGIER, 19, ac. de Villers,
Paris.
7, r. Coq-Héron, Paris.
FUMOUE, 78, faub. Saint-
Denis, Paris.
USINES DU RHONE, 21, rue
Jean-Goujon, Paris.
9, faub. Poissonnière, Paris.
AGUETTANT, 36, quai, Ful-
chiron, Lyon.
Lab. de Bio-Chimie appliquée,
21, rue Th.-de-Banville, Paris.
FRAUDIN, 4, aven. Desfieux,
Boulogne-sur-Seine.
GOUDAL, 213, rue St-Honoré,
Paris.
36, rue de Paris, Colombes
(Seine).
26, rue de Sévigné, Paris.
FALCOZ, 18, rue Vavin, Paris.
HAUTDIDIER, 37, r. Galilée,
Paris.
4, rue du Colonel-Moll, Paris.
17, boul. Haussmann, Paris.
FUMOUE, 78, faub. Saint-
Denis, Paris.
24-26, rue Trachet, Nice.
10, rue du Bac, Paris.
4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Etablissements BUISSON, 75,
rue de Sèvres, Paris. 1

*Biléyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Bilfluine	BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
Bilfol Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
*Bilirhéine	MONDOLAN, 11, place des Vosges, Paris.
Binol Roger	177, boul. St-Germain, Paris.
Biscols Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s-S.
*Biocalcose Chevretin	Laborat. CHEVRETIN & LEMATTE, 5, r. Ballu, Paris.
*Biodynamine	Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
*Biogastrine	BERTHIOT & C ^{ie} , 1, boul. Henri IV, Paris.
Biogénoi Demasles	à Vienne (Isère).
Biogésine Rochard	à Lorient.
*Biolactyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Biophorine Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
*Biophorol	Lab. NOVALIS, 1, r. Chavanne Lyon.
*Biosine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
*Biotox Ciba	1, place Morand, Lyon.
*Bioxol	CAILLAUD, 25, r. Drouot, Paris
Biphosphate de chaux	Etab. JACQUÉMAIRE, Villefranche (Rhône).
*Bismhydal	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
*Bismuth Desleaux	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
*Bismuth	PERROUD, 7, r. des Archers, Lyon.
Blastéase	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
*Bédine Jacquemaître	à Villefranche (Rhône).
Bluetine	Régis MEILLER, à Dunières (Haute-Loire).
Boldine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
*Boldo-Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Boldo-Verne	à Grenoble (Isère).
Boldoïne Eparvier	26, Grand'Rue St-Clair, Lyon.
*Boiéase Monal	Laboratoires MONAL & C ^{ie} , 6, rue Daubigny, Paris.
Bonbons vermifuges Royer	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Bornyval	L. ROHAIS & C ^{ie} , 2, rue des Lions, Paris.
*Boricine Meissonnier	LOGEALS, 30, r. de Chaillot, Paris.
Boro-borax Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
*Borocalcyi Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
Borosal	LALEUF 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.

- Bos Cuit
 Bougies Américaines
 Bougies Chaumel
 Bougies Reynal
 Bov'Cardiac
 Bov'Billé
 Bov'Hepatic
 Bromalbin Adrian
 *Broméline Montagu
 *Bromilase Couturiéux
 Bromocarpine
 *Bromogénoi Pépin
 Bromomaisine Salle
 *Bromone Robin
 Bromure Laroze
 Bromure de Sodium du
 D^r Gigon
 *Bromure Souffron
 Bronchoplastre
 Buctol Paris
 *Bulgarine Thépénier
 FUMOUIZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 LOGEAI, 30, rue de Chaillet Paris.
 FUMOUIZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
 Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
 FUMOUIZE, 78, -faub. Saint-Denis, Paris.
 id.
 id.
 9, rue de la Perle, Paris.
 49, boui. Port-Royal, Paris.
 18, avenue Hoche, Paris.
 OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
 PÉPIN & LÉBOUCQ, à Courbevoie (Seine).
 4, rue Elzévir, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 ROHAIS & C^{ie}, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
 7, rue Coq-Héron, Paris.
 Etablissements BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
 CAVAILLÈS, 34, r. Turin Paris
 4, rue Lamotte-Piequet, Paris.
 12, rue Clapeyron, Paris.

C

- Cabilline
 Cachets Boveil
 Cachets Céli
 Cachets Charvoz
 Cachets du D^r Faivre
 Cachets opothérapiques
 Byla
 *Cachets Roche de Thio-
 col
 *Cachets de gâiacaïne
 Latour
 Cacodylate Vigier
 Cacodyle Gonnon
 *Cacodylo-Phosphate
 vital Jacquemaire
 Cœalline Gagnière
 Caféine Houdé
 *Caicéose Boillot
 CHAMPION, 25, boulevard
 Latour-Maubourg, Paris.
 14, rue Grenette, Lyon.
 LANDES, à Gramat (Lot).
 à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône)
 à Lyon.
 26, aven. de l'Observatoire,
 Paris.
 HOFFMANN-LA ROCHE &
 C^{ie}, 21, pl. des Vosges. Paris
 17, place des Vosges, Paris.
 12, boul. Bonne-Nouvelle. Paris
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 à Villefranche (Rhône).
 à Clermont-Ferrand.
 9, rue Dieu, Paris.
 9, rue Saint-Paul, Paris.

*Calciiline	WATELET & C ^{ie} , 25, rue Vaneau, Paris.
*Calciphose Coutillier	48, rue de Berri, Paris.
Calcitine	DIGNE Fils, à Fréjus (Var).
Camphoral Aguetant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Capsules Bonnefond	MONTAGU, 49, boulevard Port-Royal, Paris.
*Capsules Bruel	36, rue de Paris, Colombes (S.).
Capsules Cognet	43, rue de Saintonge, Paris.
*Capsules Dartois	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Capsules Delpech	LABELONYE & C ^{ie} , 99, rue d'Aboukir, Paris.
Capsules Enter-Leros	A. SOREL, à Boulogne-s-M.
Capsules de Gonosan	ROHAIS & C ^{ie} , 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.
Capsules d'Ichtyol	12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Vigier	
Capsules Pautauberge	165, rue Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
*Capsules Ramel	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Capsules Raquin	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Capsules Sals	Labor. du TOPIQUE BERTRAND, Oullins (Rhône).
Capsules salolées	LACROIX, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris.
Capsules Sérafin	9, rue de la Perle, Paris.
Capsules de Terpinol	GONNON, 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
*Carbochloryls	ALEZARD, 70, rue Réaumur, Paris.
*Carbolactyl	DENISOT, 19, rue de Fleurus, Paris.
*Cardibaine	Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
*Cardiotonic	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
*Carnine Lefrancq	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Cascara Alexandre	41, rue de Rome, Paris.
*Cascara Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
*Cascarine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Caséoline Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Catalysine du D ^r Vi-	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
querat	
Cathiode	Labor. BRISSON & C ^{ie} , 111 rue du Mont-Cenis, Paris.
*Cédryl	Lab. IMMUNOS, 6, rue Ed. Valentin, Narbonne.
*Céréalose	Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.

*Cérébrine Fournier	49, boulev. Port-Royal, Paris.
*Cérébroil	Lab. LEYSIN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
Cérédine Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-s-S.
Céréoi Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Céréossine	DEHAUSSY, 44, rue Inkermann, Lille.
*Cervoi	DENISOT, 19, rue de Fleures, Paris.
*Cétrarose Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Charbon granulé	4, aven. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
Fraudin	4, aven. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
Charbon naphtoïé	
Fraudin	
*Charbon Tissot	34, boulev. de Clichy, Paris.
*Chéioïdine	BROCADET, 89, rue du Commerce, Paris.
*Chenanthol	HINGLAIS, à Epernay.
*Chloral bromuré Dubois	DURIEZ, 20, pl. des Vosges, Paris.
Chloramine	FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
Chloréthyle Bengué	47, rue Blanche, Paris.
Chloridia	VERRIER & GUERNIER, 64 rue des Tournelles, Paris.
*Chlorobyi	Labor. de Bio-Chimie appliquée, 21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
*Chloro-Calcion	MICHEL, 22, rue des Bernardins, Paris.
Chloroforme anesthésique	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Chloroforme Lamblotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
*Choléine Camus	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
*Choléitoires Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Choiéiyse Carbou	8, rue Jean-de-Bellay, Paris.
*Choléo-Combretol	CAILLAUD, 25, r Drouot, Paris.
*Choléoboldine Thévenot	21, rue des Roses, à Dijon.
*Choiéokinase	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
*Chotéolactol Daguin	5, rue des Remises, Saint-Maur (Seine).
*Choiergine	Daniel BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Chrysoprase	FOUQUET & C ^{ie} , 199, rue Saint-Denis, Paris.
Cigares Barral	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.

Cigarettes américaines Leroy	LANDRIN, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Cigarettes du Dr Cléry	53, boul. Saint-Martin, Paris.
*Cigarettes Espic	20, rue Saint-Lazare, Paris.
*Chinozyl	COMAR & C ^{ie} , 20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Cinol	Lab. IMMUNOS, 6, rue Ed. Valentin, Nanbonne.
*Citrosodine Grémy	LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
*Clonazone Daufresne	40, rue Thiers, Le Havre.
*Coagulène Ciba	1, place Morand, Lyon.
Coca Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Cocaïne Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
*Coccidal Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Codocol	20, rue des Martyrs, Paris.
*Codeforme Bottu	9, rue Dupuytren, Paris.
*Colarsé	DELAMARRE, à Beaugency (Loiret).
*Coichi-Sal Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Collargol Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
*Collo-iode Dubols	35, rue Pergolèse, Paris.
Colchiflor Vial	8, rue Vivienne, Paris.
Collobiases Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
*Colloïdes Cila	20, r. Fossés-St-Jacques Paris.
Colloïdine	LALEUF, 49, aven. Lamotte-Picquet, Paris.
Colloïdogénine du Dr Bayle	CHAIX, 10, rue de l'Orne, Paris
*Colloïxols	MERMINOD & C ^{ie} , 49, rue de Paradis, Paris.
*Collosoi cadique Pépin	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Collothiol	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Colloïl	Lab. LEYSIN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
*Colluborine	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Collyres stérilisés Cila	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Coloplastre	CAVAILLES, 34, r. de Turin, Paris.
*Combrétine Boquillon	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
*Comitioi	GRORICHARD, 12, place Labourée, Besançon.
*Composé Gmet	27, faub. Montmartre, Paris,
*Comprimés Guillaumin	13, rue du Cherche-Midi, Paris
Comprimés du Profes. Pénillères	COUPAT, à Ussel (Corrèze).
Comprimés Rogé-Cavalliès	PEPIN, 9, rue du 4-Septembre, Paris.
*Comprimés de Thiocol Roche	HOFFMANN-LA ROCHE, 21 place des Vosges, Paris.

Comprimés Vichy-État	G. PRUNIER & C ^{ie} , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Conarsénol	IMBERT, 12, place Puget, Toulon.
*Condurango Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Condurango granulé Astier	Laboratoires ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
Conhydrargol	IMBERT, 12, place Puget, Toulon.
Conticine Guillaumond	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
*Coréine	DANIEL BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
*Corps Thyroïde Mon-cœur	à Boulogne-sur-Seine.
*Cosmargyre Thévenot	21, rue des Roses, à Dijon.
*Cratægus Boquillon	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
*Cratægus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Crayons Chaumel	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Crayons Raynal	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
*Créosal Dubols	Lab. LALEUF, 49, av. Lamotte Picquet, Paris.
*Créosoforme Lamblotte Frères	3, rue d'Edimbourg, Paris.
Crésyl Jeyes	36, r. France-Bourgeois, Paris.
*Cristolax	Et. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Crucyl	Lab. FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.
*Cryogénine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
*Crypthermol	DEHAUSSY, 44, rue Inghermann, Lille.
Cuprion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Cuproclithine	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
Curatif Vaugirard	37, avenue Marceau, Paris.
Curgol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Curiode	Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, Paris.
Cyanaurol du D ^r Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Cyanermine	CAILLAUD, 25, r. Drouot, Paris.
Cypridol Chapelle	8, rue Vivienne, Paris.
Cyto-Serum Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Cytoplasmine Ducatte	8, place de la Madeleine, Paris.
Cytosal	Lab. SCHAEFER, 184, boulevard Haussmann, Paris.
Cytuline Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.

D

- Denisoline Brisson
 Dentoxyl
 *Dépuratif Kromlinck
 *Dermofagine
 *Dermoplastol
 *Diabétifuge
 *Diadermine
 *Dial Ciba
 *Dialaccline Ciba
 *Dialyl Brunot
 *Diasclérol
 Dlaces Progil
 *Diasténine Grémy
 *Diastogène
 *Didal Ciba
 Diéménal
 Diénoï
 *Digalène Roche
 Digestif Capmartin
 *Digestif Harvey
 Digestif Pinel
 *Digibaine
 *Digicardine
 *Digifoline Ciba
 Digitale Dausse
 Digitale Écalle
 Digitaline Homolle et Quévenne
 *Digitaline cristallisée de Nativelle.
 *Digitaline cristallisée du D^r Mialhe
 Dimétol Vicario
 *Dimol
 Dilodoforme Talne
 *Dioradin
 31, r. Boissy-d'Anglas, Paris.
 HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
 BELIERES, 119, r. Drouot, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
 DUMESNIL, 10, rue du Plâtre. Laborat. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
 BONETTI 12, r. Vavin, Paris.
 1, place Morand, Lyon.
 1, place Morand, Lyon
 16, rue Boulainvilliers, Paris.
 RANSON, 121, aven. Gambetta, Paris.
 LAURIN, 86, bd. Port-Royal, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 DEHAUSSY, 44, rue Inker-mann, Lille.
 1, pl. Morand, Lyon.
 J. DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, Paris.
 id.
 F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^{ie}, 21, pl. des Vosges, Paris.
 3, rue du Trésor, Paris.
 MALMANCHE, 37, r. de Paris, Rueil.
 D^r THOUVENIN, à Bonnelles (S.-et-O.).
 Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'Assas, Paris.
 Lab. IMMUNOS, 6, rue Ed. Valentin, Narbonne.
 1, pl. Morand, Lyon.
 4, rue Aubriot, Paris.
 BUISSON, 157, r. Sèvres, Paris
 GENEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
 49, boul. Port-Royal, Paris.
 8, rue Favart, Paris.
 17, boul. Haussmann, Paris.
 Lab. Anglo-Français, Bois-Colombes (Seine).
 ADRIAN, 9, r. la Perle, Paris
 CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.

- *Dioséline Prunier
Disques Tulasne
*Diurène
Diurocardine
*Dmégon (Neo)
*Dmesta (Neo)
*Dmetys (Neo)
*Doloma
*Dozéol
Dragées antinerveuses
Cavallières
Dragées Bengué
Dragées Blottière
Dragées de Bondonneau
Dragées Carbonel
Dragées Demazières
Dragées de fer Cognet
Dragées de fer Ravuteau
Dragées ergotées
*Dragées Gélneau
Dragées du Dr Hecquet
Dragées Le Brun
*Dragées Névrosthé-
niques " Yse "
Dragées Nyrdhai
Dragées Pautauberge
Dragées Somedo
*Duodénase
*Dyspeptine Hepp
6, Avenue Victoria, Paris.
11, rue Blanche, Paris.
CARTERET, 15, rue d'Argen-
teuil, Paris.
285, av. Jean-Jaurès, Lyon.
POULENC Frères, 92, rue
Vieille-du-Temple, Paris.
id.
id.
29, place Bossuet, Dijon.
Lab. DEGLAUDE, 6, rue d'As-
sas, Paris.
PÉPIN, 9, r. du 4-Septembre,
Paris.
47, rue Blanche, Paris.
6, rue Dombasle, Paris.
GUERIN, 60, cours de Vin-
cennes, Paris.
CARTERET, 15, rue d'Argen-
teuil, Paris.
131, rue de Valenciennes, Paris.
43, rue de Saintonge, Paris.
COMAR & C^{ie}, 20, rue des
Fossés-St-Jacques, Paris.
MANNET, à Loudun (Vienne).
MOUSNIER, à Sceaux.
49, boulev. Port-Royal, Paris.
5, r. Hippolyte-Labas, Paris.
65, rue Louis-Blanc, Paris.
20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
165, r. St-Denis, Courbevoie.
2, rue Colonel-Renard, à Meu-
don (S.-et-O.).
Lab. DELATTRE, 10, rue du
Bac, Paris.
Labor. du Puits-d'Angle, Le
Chesnay (S.-et-O.).

E

- Eau Antileucorrhéique
Blottière
*Eau Chambille
*Eau de Saint-Colomban
*Ebanyl
*Eczéda
*Ektogan
Elatine Boulé
6, rue Dombasle, Paris.
MONTAGU, 49, boul. Port-
Royal, Paris.
Bains-les-Bains (Vosges).
TRONCIN & HUMBERT, 96,
rue d'Amsterdam, Paris.
BEYTOUT & CISTERNE, 12,
boul. St-Martin, Paris.
12, rue Lamartine, Paris.
FAGARD, 44, rue d'Agues-
seau, Boulogne-sur-Seine.

Elbon Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
*Electrargol Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Electraurocl Clin	id.
Electrocuprol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro Hg	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromanganol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electromartiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electropalladiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-platinol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electro-Rhodiol	COMAR & C ^{ie} , id.
Electrosélénium	COMAR & C ^{ie} , id.
Elixir d'antipyrine Laroze	ROHAIS & C ^{ie} , rue des Lions- Saint-Paul, 2, Paris.
*Elixir Bonjean	DUSSUEL & FAURE, Aix-les- Bains.
Elixir Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port- Royal, Paris.
Elixir Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Elixir Dérêt	COMAR & C ^{ie} 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris
*Elixir Duchamp	Comte de GRAUWE, 6, rue Rocroy, Paris
*Elixir Ducro	DURIEZ 20, pl. des Vosges Paris.
Elixir Duret	10, rue du Bac, Paris.
Elixir eupeptique Tisy	VAUDIN & GUILLAUMIN, 12, rue Charles V, Paris.
Elixir de fer Kœnig	37, avenue Marceau, Paris.
Elixir ferro ergoté	MANNET, à Loudun (Vienne).
Elixir Glover	R. CRUET, 13, rue des Mi- nimes, Paris.
Elixir Grez	COLLIN, 49, r. Maubeuge Paris
*Elixir du D ^r Hequet	MONTAGU, 49, boul. Port- Royal, Paris.
Elixir Houdé	9, rue Dieu, Paris.
*Elixir Iodo-dépuratif	C. PEPIN, 9, rue du 4-Sep- tembre, Paris.
Elixir Mannet ioduré	à Loudun (Vienne).
Elixir Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
Elixir Martin-Mazade	à Saint-Vallier (Drôme).
*Elixir du D ^r Mialhe	8, rue Favart, Paris.
Elixir de Pepto-Cardine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Elixir polybromuré Yvon	5, rue de la Feuillade, Paris.
*Elixir Spes	D ^r GUIRAUD, 98, rue Saint- Ginès, Bordeaux.
Elixir toni-radical Blottière	6, rue Dombasle, Paris.
Elixir tribromuré Mannet	à Loudun (Vienne).

Élixir Virenque	DEGLÔS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Élixir de Virginie Nyrđhal	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Élixir Vital Quentin	MOUSNIER à Sceaux.
*Embryonine du D ^r Barré	à Argentan (Orne).
Emétinol Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
Emplâtres R. Cavaillhès	34, rue de Turin, Paris (8 ^e).
Emplâtre Duret	61, rue de Vaugirard, Paris.
Emplâtre poreux Williams	LOGEAI, 30, rue de Chaillot, Paris.
Emulsion Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Emulsion Defresne	Les Lilas (Seine).
*Emulsion Marchais	à la Rochelle (Char.-Infér.).
*Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Energétènes végétaux Byla	26, avenue de l'Observatoire Paris.
Entésol Clln	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Engeluroi	ALEXANDRE, 22, rue de Vienne, Paris.
*Eniade Lefebvre	2, rue Duphot, Paris.
*Entéroseptyl Clérambourg	BRUNERYE, 4, rue Tarbé, Paris.
*Entérovaccin Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
*Entérozone	H. ROGIER, 9, rue de la Terrasse, Paris.
Entérozyne Chevretin et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
*Eparseno	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
*Epidosine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Epoquallne	FRANÇOIS, 16, cours Gambetta, Lyon.
*Eranol	45, rue de l'Échiquier, Paris.
Ergot de seigle Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
*Ergotine Bonjean	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Ergotine Yvon	5, rue Lafeuillade, Paris.
*Ergotinine Tanret	10, rue du Commandant-Rivière, Paris.
Erséol Prunier	6, rue de la Tacherie, Paris.
Esculéol	FOURIS, 9, faub. Poissonnière, Paris.
Ether anesthésique	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Ether amyvalérianique	G. BRUEL, 36, rue de Paris, à Colombes (Seine).
*Eucalcium	BASTIDE, 50, boul. de Paris, Marseille.

*Eudynol

Eugéine Prunier

Eukénol Clément

Eukinase Carrion

*Eumictine Leprince

Eupeptique Monavon

Euphorol Loudenot

*Euphrénine Bastia

Euphonol Aguetant

Euphorine du D^r Chaboud

*Eupnine Vernade

Eureka-Cooky

*Eusomnine Bélières

*Eutensine Grémy

Evalnine Carrion

Evonymine Thibaut

Exaigine Defresne

Exol Cognet

Exolysés Byla

*Extrait de Malt Français Déjardin

*Extrait de Malt Français Déjardin glycérophosphaté

*Extraits Moncour

USINES DES AUBRAIS, 286, faub. Bannier, Orléans.

6, rue de la Tacherie, Paris.

7, passage Thionville, Paris.

54, faub. Saint-Honoré, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.

VACHERON, 26, av. Valloud à Ste-Foy, près Lyon.

106, av. du Roule, Neuilly-s-S.

61, cours de la Liberté, Lyon.

36, quai Fulchiron, Lyon.

26, rue des Petits-Champs, Paris.

DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.

18, rue Molitor, Paris.

19, rue Drouot, Paris.

14, rue de Clichy, Paris.

54, faub. Saint-Honoré, Paris.

76, rue Petits-Champs, Paris.

Les Lilas (Seine).

43, rue de Saintonge, Paris.

26, av. Observatoire, Paris

109, boulevard Haussmann, Paris.

109, boulevard Haussmann, Paris.

49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

F

Fabianose

Farines Benedictus

Farines Favrichon

*Farine lactée Heudebert

*Farine lactée Nestlé

*Farine lactée Salvy

*Farines Maltées Jammet

*Farine de Malt Heudebert

*Farine Milo

Favolysine Thévenot

*Félargent

*Fer Bravais

Fer injectable Roussel

Féride Byla

Fer Larcade

LOGEAI, 30, r. Chaillot, Paris

74, rue Lamarck, Paris.

à St-Symphorien-de-Lay (Loire)

85, rue de Saint-Germain, Nanterre.

6, avenue Portalis, Paris.

6, rue Daubigny, Paris.

47, rue Miromesnil, Paris.

85, rue de Saint-Germain, Nanterre.

6, avenue Portalis, Paris.

21, rue des Roses, Dijon.

USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroy, Paris.

MOUSNIER, à Sceaux.

26, av. de l'Observatoire, Paris

151, rue Lafayette, Paris.

*Fermentérol Milan	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
*Félamine	Et. SANDOZ, 5, r. de Metz Paris
Ferments organiques	COIRRE, 79, rue du Cherche-Midi, Paris.
Zévor	PARIS, 4, rue de Lamotte-Picquet, Paris.
Ferosthyl	157, rue de Sèvres, Paris.
*Feroxal Buisson	GENEVOIX, 14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Fer Quévenne	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Fer Rabuteau	62, rue de la Tour, Paris.
*Ferrocodile Leprince	Lab. du FERROCOL, 58, rue Taitbout, Paris.
*Ferrocol	Lab. Anglo-Français, Bois-Colombes (Seine).
*Ferromalt	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
Ferropeptone	1, pl. Morand, Lyon.
*Ferrophytline Ciba	VIVIEN, 6, r.d'Abbeville, Paris
Ferroplasma	Labor. TISSOT, 34, boul. de Clichy, Paris.
*Ferrygène Carrau	à Villefranche (Rhône).
Fer vital de Jacquemaire	6, rue d'Abbeville, Paris.
Figadol Vivien	PARET, à Marseille.
Fixase	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
*Fixine Grémy	106, av. du Roule, Neuilly-s-S
Fixogène Loudenot	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
Fluène	N. COUVÉ & C ^{ie} , 39, rue de Châteaudun, Paris.
Flucide	LOGEAIS, 30, rue de Chaillot, Paris.
Fluid, Listérol	Noel COUVÉ & C ^{ie} , 39, rue de Châteaudun, Paris.
Fluidex	60, rue Saussure, Paris.
Fluoformol Genin	50, rue de Lille, à Tourcoing.
*Fluoridia	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Foie-Endocrisines	
Fournier	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
Formagol Bouty	1, pl. Morand, Lyon.
*Fortossan Ciba	Laborat. CARRON, 40, rue Milton, Paris.
*Fosfoxyli Carron	8, rue de Constantinople, Paris.
Fostrychnol Chantreau	F. AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
*Frangolélne	6, r. de la Cossonnerie, Paris.
*Frangulose Flach	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Fraxol	

*Freinix	Etabl. A. BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
*Frêne Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Frialine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Fructaline Logea	30, rue de Chaillot, Paris.
Fructines Vichy	49, aven. Wagram, Paris.
Fucoglycine Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
*Fucosine Prothière	55, rue Auguste-Comte, Lyon.
*Fucus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Fumigarettes	Laboratoire FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.
Fumigator Gonin	60, rue Saussure, Paris.

G

Gadiodine Labesse	36, rue des Lices, Angers.
*Gaïacalcine Latour	17, place des Vosges, Paris.
Gaïacol phosphaté Pautauger	165, r. St-Denis, Courbevoie.
Gaïacophosphat Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Gaïarsine Ducatte	8, pl. de la Madeleine, Paris.
Gaïarsol Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
*Gaïasyl	CRESTEY, 164, r. Saint-Honoré, Paris.
Galactogènes Jollivet	140, faub. Saint-Honoré, Paris.
*Galyi Nafine	à Villeneuve-la-Garenne.
*Gardenal	Etab. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Gastérine Frémont	à Vichy (Allier).
*Gastrocalcine	Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
Gastrocaol	A. BENDERITTER, à Vendôme (L.-et-Ch.).
Gastropeptyl	71, rue Saint-Jacques, Paris.
*Gastro-Sodine	25, rue Vaneau, Paris.
Gastrozymase Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
*Gaurol	PEPIN & LEBOUCC, 30, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie.
Gayacolchine	A.-J. CHAUCHY, 40, rue de la Bienfaisance, Paris.
Gelée antidiarrhéique Lumière	SESTIER, 9, cours de la Liberté, Lyon.
*Géobarine	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
*Gélotanin	Lab. CHOAY, 44, avenue du Maine, Paris.
*Genêt Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Géodyl	J. ROBERT, 39, rue de Bourgogne, Paris.
Géraseptol	12, rue Vavin, Paris.
*Germose	Laborat. MOREAU, 7, rue d'Hauteville, Paris.

Gernyl	DELABORDE, rue Liberté, Dijon.
*Globules Hébert	à Saint-Lô (Manche).
*Globules Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Globules Lalnear	LANCOSME, 71, av. Victor- Emmanuel III, Paris.
*Globules Romon	Labor. MONAL & C ^{ie} , 6, rue Daubigny, Paris.
Globules tœniéfuges	LOGEAI, 30, rue de Chaillot, Paris.
Secrétan	Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
*Gloma	VERGELOT, 163, r. de Flandre, Paris.
*Glutinettes d'Hémoglo- bine	34, boulev. de Cléchy, Paris.
*Gluto-bulles Jouglia	13, boulevard de la Chapelle, Paris.
Glycérophosphate	BLOTTIERE, 6, rue Dem- basle, Paris.
Daloz	LE PÉRDRIEL, 11, rue Mil- ton, Paris.
Glycérométhylarsénié	FREYSSINGE, 6, rue Abel, Paris.
Glycérophosphates	à Villefranche (Rhône).
effervescent	13, rue de Poissy, Paris.
Glycérophosphates	Lab. DALIN, 1, rue de la Mar- tinière, Lyon.
Freyssinge	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Glycérophosphates	18, avenue Hoche, Paris.
Jacquemaître	Lab. Prod. Biologiques, 6, rue de la Baignerie, Lille.
*Glycérophosphate	G. PRUNIER & C ^{ie} , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Robin	Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur-Blanche, Paris.
*Glycocarpine	Lab. ALBARRAN, 3, rue Char- nex, Paris.
Glycogène Clin	LALEUF, 49, aven. Lamotte- Picquet, Paris.
*Glyco-lactinase	13, rue de Poissy, Paris.
Couturieux	GIVAUDAN-LAVIROTTE, 56, ch. Combe-Blanche, Lyon.
*Glycolyl	27, faub. Montmartre, Paris.
Glyco-phénique	CHARMAISON, 35, aven. de Royat, Clermont-Ferrand.
D ^r Déclat	MILLET, 8, r. Richer, Paris.
Glycophosphates	17, r. Ambroise-Thomas, Paris.
nulés Astier	Etablis. POULENC Fr., 32, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Glyco-Phytol	
Glycorol	
*Glykolaine Robin	
Glyphospher	
Gmet (Extraits)	
*Gobérol	
Goléane Maignon	
*Goménol	
*Gonacrine	

Goudron Freyssinge	6, rue Abel, Paris.
*Gouttes Fluxines	BONTHOUX, r. Nationale, Villfranche (Rhône).
Gouttes amères de Baumé	D ^r GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.
*Gouttes Livoniennes	TROUETTE-PERRET, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
*Gouttes de Loloté Isberg	99, avenue du Bac, La Varenne-Saint-Hilaire.
*Gouttes Nican	CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.)
Gouttes Pausodon	147, b. Montparnasse, Paris.
Gouttes Paidophiles du D ^r Guiraud	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
*Gouttes Scandinaves	D ^r H. PHILIPPE, 14, rue du Palais-Grillet, Lyon.
*Gouttes de Séru	M. LETTRY, 42, avenue de Brotenil, Paris.
*Grains Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
*Grains laxatifs Miraton	à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme)
Grains de Plombières	Henry ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
*Grains de santé du D ^r Franck	TRONCIN & HUMBERT, 96, rue d'Amsterdam, Paris.
*Grains de Valc	NOGUES, 64, boulev. Port-Royal, Paris.
*Grains de vie Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Granulé Bravais	3, rue Mogador, Paris.
Granulé calmafrinkel	CHEVRETIN & LEMATTE, 5, rue Ballu, Paris.
Granules Crosnier	NITOT, 6, rue Chanoinesse, Paris.
Granulé du D ^r Mousaud	H. RIVIER, 26, rue Saint-Claude, Paris.
*Granulé Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Granules du D ^r Papillaud	GIGON, 7, rue Coq-Héron, Paris.
Granules Homolle et Quévanne	14, rue des Beaux-Arts, Paris.
Granules Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Granules des Vosges	21, boul. Haussmann, Paris.
Granules trois cachets	COIRRE, 79, rue du Cherche-Midi, Paris.
Greffine	MURAIRE, 41, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
Grillerine	BLANCHON fr., 7, rue Saint-Lazare, Paris.
*Gui Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Guipsine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Gynaictol	J. TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.

*Gynéco-Phytol

*Gynéose

*Gynergène

*Gynopausine

Lab. ALBARRAN, 3, rue Chenev, Paris.

Lab. BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.

Etab. SANDOZ, 5, rue de Metz, Paris.

RANSON, 121, aven. Gambetta, Paris.

H

Hamaméline

LOGEAS, 30, rue de Chailot, Paris.

*Hamaméline Roya

41, rue de Rome, Paris.

*Hamaméliode

Lab. OBERLIN, 17, rue Cadet, Paris.

Hamaméllis Dausse

4, rue Aubriot, Paris.

*Hamaméllis Gmet

27, faub. Montmartre, Paris.

Hamaméllis Natton

34, boulevard Clichy, Paris.

Hamaméllis Virginica

61, rue Saint-Didier, Paris.

*Hectargyre Naline

à Villeneuve-la-Garenne (Seine)

*Hectine Naline

à Villeneuve-la-Garenne (Seine)

Hélénine du D^r Korab

11, rue de Navarre, Paris.

*Héltal

L. SIMON, 15, place Nationale, Dieppe.

Hémagène Tailleur

SEVENET, 55, r. Pajol, Paris.

*Hémagénine du D^r Giraud

PETIT, place de l'Eglise, Argenteuil.

Hémarsyl du D^r Roux

CAILLAU, à Argentat (Corrèze)

Hématogénoï

HAUTDIDIER, 37, r. Gallée, Paris.

Hémato-Sérum Corbière

27, rue Desrenaudes, Paris.

Hémocléline Lafay

54, Chaussée d'Antin, Paris.

*Hémoductyl

LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.

*Hémoïxine

BRANCHU, 4, r. Beaurepaire, Paris.

Hémoglobine Bovel

Lab. VENOT, 101, av. Mozart, Paris.

Hémoglobine Crinon

45, rue de Turonne, Paris.

*Hémoglobine Dalloz

13, boul. de la Chapelle, Paris.

*Hémoglobine Deschamps

9, rue Paul-Baudry, Paris.

Hémoglobine Star

3, rue du Trésor, Paris.

Hémoglofer Cros

Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.

Hémoneurol Cognet

43, rue de Saintonge, Paris.

Hémopausine

D^r BARRIER, Les Abres (Isère).

Hémoplasme Lumière

9, cours de la Liberté, Lyon.

*Hémostyl du D^r Roussel

21, rue d'Aumale, Paris.

*Hémostonine	Etabl. Albert BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Hémozol	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boul. Saint-Martin, Paris.
Hépatine Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
*Hépato-Byl	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
*Hépatotanie	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
Hermophényl	9, cours de la Liberté, Lyon.
Héroïne Vicario	11, boul. Haussmann, Paris.
*Hétérolysine	Laborat. OLIVIERO, 87, rue Denfert-Rochereau, Paris.
*Hexotal	Laborat. CAMUSET, Aulon (Seine-et-Oise).
Hippocrasine du D ^r Gran	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Hipposarcine Roy	GIVAUDAN-LAVIROTTE, 56, Chem. Combe-Blanche, Lyon.
*Histogénol Nallne	à Villeneuve-la-Garenne.
*Holos Deschiens	9, rue Paul-Baudry, Paris.
*Hopogan	12, rue Lamartine, Paris.
*Hormolaxine	DARRASSE Frères, 13 rue Pavée, Paris.
Hordénine Lauth	9, rue du 4-Septembre, Paris.
Hordéomaltine	10, rue Richelieu, Paris.
*Huile Croas	GIVAUDAN-LAVIROTTE, 56, Chemin Combe-Blanche, Lyon.
Huile au calomel Duret	Labor. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
*Hullaxine Gillot	59, rue de Châteaudan, Paris.
Huile F. M. Hogg	2, rue Castiglione, Paris.
*Huile grise Duret	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
*Huile grise stérilisée	VIGIER, 12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
*Huile Riche	Labor. du TOPIQUE BERTRAND, Oullins (Rhône).
*Hydralin	CAILLAUD, 25, r. Drouot, Paris.
Hydrastis Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Hydrastis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Hypergal	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
Hypnase Vergelot	163, rue de Flandre, Paris.
*Hypneural Cos	LABELONYE, 99, rue d'A-boukir, Paris.
Hypochlorine	48, rue de Londres, Paris.
Hypodermie "Le Pecq "	39, rue Cambon, Paris.
*Hypodermozone	H. ROGIER, 9, rue de la Terrasse, Paris.
*Hypophosphites Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.

Hypophosphites Fellows	5, rue de la Paix, Paris.
Hypophyse-Endocri- sines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.

I

Ibagaïne Nyrdhal	LANDRIN, 20, rue La-Rochefoucauld, Paris.
*Immunizols Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Injection Brou	BLOTTIERE, 6, rue Dombasle, Paris.
Injection Clin Stry- chno-Phospharsinée	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Injectons Hg. Rogé Cavallès	PEPIN, 9, rue du 4-Septembre, Paris.
Inkolyol	35, rue des Petits-Champs, Paris.
*Internoses " Le Pecq "	39, rue Cambon, Paris.
Intralts Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Iodalbum Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Iodalla	BONETTI, 12, r. Vavin, Paris.
*Iodalose Galbrun	8, rue du Petit-Musc, Paris.
*Iodamells Logeais	30, rue de Chaillot, Paris.
Iodargol Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
*Iodarsenic Guiraud	98, rue Saint-Ginés, Bordeaux.
*Iodaselle Delamarre	à Beaugency (Loiret).
*Iodaseptine Cortial	125, rue de Turenne, Paris.
*Iodéline Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
*Iode Oberlin	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
*Iode Organique	32 bis, boulevard d'Argenson, Neuilly-sur-Seine.
Iodéol Viel	7, rue Saint-Yves, Rennes.
*Iodéyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Iodhyrine du Dr Des- champs	49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
*Iodo-Bismuthate de Quinine	FRAISSE, 8, rue Jasmin, Paris.
Iodocéréol Dalloz	13, boulev. de la Chapelle, Paris.
Iodocol Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
*Iodogénoï Pépin	à Courbevoie (Seine).
Iodo-Maisine	4, rue Elzévir, Paris.
*Iodométine Hautdider	37, rue Galilée, Paris.
*Iodone Robin	13, rue de Poissy, Paris.
*Iodostarine Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, place des Vosges, Paris.
*Iodo-Thyroïdine Catil- lon	3, boulev. Saint-Martin, Paris.
Iodo-Trypsine	50, rue Rennequin, Paris.
*Iodurase	COUTURIEUX, 18, avenue Hoche, Paris.

*Iodures Cros	Lab. DELATTE, 10, rue du Bac, Paris.
Iodures Foucher	142, boul. St-Germain, Paris.
Iodures Laroze	RÉHAIS & C ^{ie} , 2, rue de Lions-Saint-Paul, Paris.
*Iodure Philippe	14, rue Palais-Grillet, Lyon.
*Iodures Souffron	Etabl. BUISSON, 157, rue de Sèvres, Paris.
Ioglysol	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Iolase Corbière	27, rue Deaenaudes, Paris.
Ionoïdes (Procédés Fouard)	DARRASSE, 13, rue Pavée, Paris.
Ipéca total Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
Irol Churchill	SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
*Isobromyl	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.

J

*Jécol	36, rue Rivay, Levallois-Perret (Seine).
*Jugland Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Juglandine Ferrouillat	35, rue de Rivoli, Paris.
Juglane	à Chambéry (Savoie).
Juglanrégine André	2, rue des Alpes, à Valence.
Juvénor	6, rue du Mont-Thabor, Paris.

K

Kalmine	METADIER, à Tours.
Kéfir Carrion	V. BORRIEN & C ^{ie} , 54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Kélène	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Képhaldol	RATIÉ, 45, rue de l'Echiquier, Paris.
*Képhir Salmon	28, rue de Trévise, Paris.
*Keriol Lerck	à Saint-Etienne.
*Kinosline Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
*Kinectine	12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne.
Kineurine Moncour	49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
*Kipsol	BERTAUT-BLANCARD, 64, r. La-Rochefoucauld, Paris.
Kola-fer Trouette	15, rue Immeubles-Industriels, Paris.
*Kola granulée Astier	45, rue du D ^r Blanche, Paris.
Kola granulée Roy	81, boulevard Suchet, Paris.
Kola Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.

Kola Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Kola Monavon	VACHERON, 4, av. Vallicoud, à Sainte-Foy, près Lyon.
Kola Pausodun	FOURNIER, 147, boulevard Montparnasse, Paris.
Kola Pichat	5, cours Charlemagne, Lyon.
Kréazone	TROUETTE, 15, rue des Im- meubles-Industriels, Paris.

L

*Lab-Lacto-Ferment	MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Laccodermes Brisson	111, rue du Mont-Cenis, Paris.
Lactagol Pearson	43, rue Pinel, Saint-Denis.
Lactéol Boucard	30, rue Singer, Paris.
*Lactinase Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Lactobacilline	13, rue Pavée, Paris.
Lactobyl	21, rue Théodore-de-Banville, Paris.
Lactochol	id.
*Lactolaxine Fydau	PARIS, 4, r. Lamotte-Piquet, Paris.
Lactophosphine	8, rue de la Pompe, Paris.
Lactosone	J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
*Lactozymase B.	Labor. CHEVRETIN & LE- MATTE, 5, rue Ballu, Paris.
*Lantol Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
*Lansoyl	ROBERTS & C ^o , 5, r. de la Paix, Paris.
Lait de Magnésie Phil- lips	62, Champs-Élysées, Paris.
*Lauco-dragettes	NOVALIS, 1, r. Chavanne, Lyon.
*Laurénoï	BÉLIERES, 19, r. Drouot, Paris.
Laxagarine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
*Laxamalt	LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.
Laxamer Lefèvre	52, rue Decamps, Paris.
Laxatif Châtel-Guyon Gubler	PÉRRAUDIN, 70, rue Le- gendre, Paris.
Laxatif ferment	* à Malzéville (M.-et-M.).
*Laxatif Orgeat	36, rue Rivay, Levallois-Perret.
Laxatone Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Laxoïl	RAMBAUD, 12, r. Beautreillis, Paris.
Laxol Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
Laxo-Ilia	182, av. de Versailles, Paris.
*Laxopeptine Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Laxophore Brachin	à Joinville (Haute-Marne).
*Lebnoï	Labor. THEVENOT, à Dijon.

Lécithine Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Lécithine Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris
Lécithine Vial	8, rue Vivienne, Paris.
Lécithosine Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Leniforme	20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
Leptandrine Royer	LAUMONIER, 225, rue Saint-Martin, Paris.
Levurase	CHARMAISON, à Clermont-Ferrand.
Levure Coltre	79, r. du Cherche-Midi, Paris
Levure Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Levuline extractive	18, avenue Hoche, Paris.
Couturieux	
Licutine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Limol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Lipiodol Lafay	54, Chaussée d'Antin, Paris.
Lipochoi Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris
Lipocithine	DOUETTEAU, 20, faub. St-Honoré, Paris.
Lipocytol Grémy,	14, rue de Clichy, Paris.
Lipoféine	1, pl. Morand. Lyon.
Lipogyre Ciba	id.
Lipoïdes H. I.	H. CARRION, 54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Lipoïodine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Liqueur d'Hermès	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boulev. Saint-Martin, Paris.
Liqueur Laprade	COLLIN & C ^{ie} , 49, rue de Maubeuge, Paris.
Liqueur Laville	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Liqueur peptophosphorique	ADRIAN, 9, rue de la Perle, Paris.
Liseronine	BÉLIERES, 19, rue Drouot, Paris.
Listose Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Litharsyne Ferré	142, boul. St-Germain, Paris.
Lithine effervescente	LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
Luargol	POULENC Fr., 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Lustine	SAYE, 2, av. Parmentier, Paris.
Luatol	POULENC Fr., 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Lusoforme]	CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, Paris.
Lutéovar	FOULON & C ^{ie} , 188, faub. Saint-Martin, Paris.
Lycétol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Lysiodé Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Lysol	31, rue Parmentier, Ivry (Seine)

M

- *Magnésie Durel 7, boulevard Denain, Paris.
- Magnésie Roy 81, boulevard Suchet, Paris.
- Magol Churchill SWANN, 12, rue Castiglione, Paris.
- Maltase Fanta 6, rue Guyot, Paris.
- *Malt-Calcine Labor. BOUTARD, à Luc-sur-Mer (Calvados).
- Malt Déjardin 100, boul. Haussmann, Paris.
- Maltéa Moser 12, rue de Bruxelles, Lyon.
- Maltine Gerbay à Roanne (Loire).
- Malt Moritz 189, rue de Vaugirard, Paris.
- Malt Régina 34, rue Pajol, Paris.
- Malt Strauss DEMORY, 12, r. Broca, Paris.
- Maltéine Defresne MACQUAIRE, Les Lilas (Seine).
- Malto-Fer Déjardin 109, boul. Haussmann, Paris.
- *Maltosan Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
- Mamelle-Endocrisines 26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
- Fournier
- *Mangaïne SCHMIT, 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- Manganésia 64, rue des Tournelles, Paris.
- *Marcyl LONGUET, 34, r. Sedaine Paris.
- *Marinol (Laborat. du) à Dieppe (Seine-Inférieure).
- Marron d'Inde Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
- Marsyle Clin 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Mas de la Ville à Arles-sur-Rhône.
- Maya Bulgare 322, rue Saint-Honoré, Paris.
- Médication arrhénique COMAR & C^e, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- simple et composée
- *Ménovarine MONDOLAN, 11, place des Vosges, Paris.
- Mentholina GUIGNIER, à Bois-Colombes.
- *Mercuriaux Vigier 12, boul. Bonne-Nouvelle. Paris.
- *Mésoforme Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, Paris.
- *Mésothorium Buisson 157, rue de Sèvres, Paris.
- Méroléol Salle 4, rue Elzévir, Paris.
- Métacuprol 150, rue de la Pompe, Paris.
- *Métarsenobenzol SACA A. MILLET, 19 bis, rue Richer, Paris.
- Métharlier Bouty 3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
- Métharsinate Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Métharsol Bouty 3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
- Méthylarsinate Vicario 17, boulev. Haussmann, Paris.
- Méthylarsinate Vigier 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.
- Méthylase 14, rue de la Paix, Nice.
- Métricine 25, Grande-Rue, Asnières (Seine).
- *Metritols LEES, 124, rue du Bac, Paris.
- *Micranyl GRÉMY, 14, r. Clichy, Paris.

*Mictasol	Labor. JOCYL, 39, rue Saint-Georges, Paris.
*Migrainol	FRANÇOIS, 16, cours Gambetta, Lyon.
Minéralogène	VIAL, 4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
Minérol	10, rue Richelieu, Paris.
Minérolaxine Le Tanneur	6, rue Delaborde, Paris.
Mokaflament	BLANCHON fr., 7, rue Saint-Lazare, Paris.
*Mokavène	Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroy, Paris.
Mondorasme	LANGRAND, 95, rue de Turenne, Paris.
Moride (Produits)	20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Morrhualène Gautier	Lab. DORANTOWICZ, 17 bis, avenue Parmentier, Paris.
*Morrhuéline Jungken	DUHEME, à Courbevoie.
Morrhuline Puy	à Grenoble.
Morrhuel Chapoteaud	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Mouches Albespeyres Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Mucogène Astier	45, rue du D ^r Blanche, Paris.
*Mucosodine	CAILLAUD, 25, rue Drouot, Paris.
Muqueuse Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Musculosine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Mutandine	GRÉMY, 14, r. de Cléchy, Paris.
*Muthanol	G. FERME, 55, bd Strasbourg
Néofilhos Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Mycodermine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Mycolysine Doyen	LEBEAULT, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Mycidol Badel	à Valence-sur-Rhône.

N

*Nalodine	LOGEAIS, 30, rue de Chaillot à Paris.
Narcotile Bengué	47, rue Blanche, Paris.
*Narcyl Grémy	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Narsénol	POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Néo-Arsycodile	M. LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
*Nécarsite	286, faub. Bannier, Orléans.
Néofilhos Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
Néo-Kola Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon
*Néol Bottu	9, rue Dupuytren, Paris.

- Néo-laxatif Chapotot
 *Néolidés H. B.
 *Néolyse
 *Néoplalysine
 *Néo-Rhomnol
 *Néo-Trépol
 Néphrine Bouty
 Néphrine Byla
 *Nergine Heudebert
 Nervocitrine Tissot
 *Neurène
 *Neurinase
 *Neurobore
 *Neurodose
 Neurogafacol Dethan
 Neuroiodure Dethan
 Neurosine Prunier
 *Neurosthyll
 *Neurotanic
 *Neurotrophol Byla
 *Neurovoïne
 Neutrose Vichy
 Névralgésine Débordés
 *Névralgol Brossard
 Névraltélène Rogier
 *Névrosthénine Freys-
 singe
 *Nisaméline
 *Nitroyl
 Nopirine Vicario
 Nosol Aguetant
 *Novargyre Guillaumin
 Novarine Vicario
 *Novarsénobenzol Billon
 Novoplasmine
 *Nucléarène Cognet
 *Nucléarsitol Robin
 *Nucléatol Robin
 56, boulevard Ornano, Paris
 9, rue Dupuytren, Paris.
 Pharmacie STOULS, 155, r.
 Victor-Hugo, Paris.
 MERMINOD & C^{ie}, 49, rue de
 Paradis, Paris.
 LEPRINCE, 62, rue de la
 Tour, Paris.
 CHENAL & DOUILHET, 2
 rue de la Sorbonne, Paris
 3 bis, rue de Dunkerque, Paris
 26, avenue de l'Observatoire
 Paris.
 rue Saint-Germain, Nanterre
 34, boulev. de Clichy, Paris
 DANIEL-BRUNET, 6, rue de
 la Source, Paris.
 GENEVRIER, 2, rue du Dr
 barcadère, Paris.
 E. BACHELARD, 8, rue De-
 nouettes, Paris.
 Dr FRAYSSÉ, 130, r. d'Abou-
 kir, Paris.
 11, r. Al-de-Neuville, Paris.
 11, r. Alph.-de-Neuville, Paris
 6, rue de la Tacherie, Paris
 PARIS, 4, r. Lamotte-Picquet,
 Paris.
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
 26, av. de l'Observatoire, Paris
 GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
 49, aven. de Wagram, Paris
 à Moulins (Allier).
 1, r. Cordouan, La Rochelle.
 19, avenue de Villiers, Paris
 6, rue Abel, Paris.
 TROUETTE, 15, r. Immeubles
 Industriels, Paris.
 Lab. LEYSIN, 1 bis, r. Molliat,
 Paris.
 17, boulev. Haussmann, Paris
 36, quai Falchiron, Lyon.
 13, rue du Cherche-Midi, Paris
 17, boulev. Haussmann, Paris
 POULENC Fr., 92, r. Vieille
 du-Temple, Paris.
 LINDEUX, 18, av. Daumes-
 nil, Paris.
 43, rue de Saintonge, Paris
 13, rue de Poissy, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.

Nucléo-fer Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Nujol	BEDFORD PETROLEUM C ^o , 88, av. Champs-Élysées, Paris.
Nutritine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Nutromait	Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
Nyctal	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Nyrdhal (Produits)	20, rue La Rochefoucauld, Paris.

O

Océanine Chevrelin et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Ocréine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Oenase Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
Oenophos	29, place Bossuet, Dijon.
Oléo-Iode Dubois	35, rue Pergolèse, Paris.
Oléolaxine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Opocalcium	121, aven. Gambetta, Paris.
Opolaxyl Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
Ophtalmine Leprince	62, rue de la Tour, Paris.
Opothérapie Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
Opothérapie Byia	26, avenue de l'Observatoire Paris.
Opothérapie Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Opothérapie Choay	44, avenue du Maine, Paris.
Opothérapie Chaix	10, rue de l'Orne, Paris.
Opothérapie Chevrelin et Lematte	5, rue Ballu, Paris.
Opothérapie Coirre	5, boul. du Montparnasse, Paris.
Opothérapie Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Opothérapie du D ^r Frayssé	130, rue d'Aboukir, Paris.
Opothérapie Furnouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Opothérapie Moncour	49, aven. Victor-Hugo, Bou- logne-sur-Seine.
Opothérapie "Le Pecq"	39, rue Cambon, Paris.
Opothérapie S.F. O.	SOC. FRANÇ. D'OPOTHÉRA- PIE, 58, r. Taitbout, Paris.
Opothérapie Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
Opozones Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Opsine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Optarsigoi	DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Orchitine Byia	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Orexyi	LOUIGRAND, 186, r. Natio- nale, Villefranche (Rhône).
Organol	LEGRAND, 20, r. des 3 Frères, Paris.

- *Ostéo-hépatine DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
- *Ostréine Buisson 157, rue de Sèvres, Paris.
- *Ouabaïne Arnaud 49, boulev. Port-Royal, Paris.
- *Ouataplasme Langiebert SABATIER, 10, rue Pierre Ducreux, Paris.
- Ovaire-Endocrisines 26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
- Ovarine Dubois LALEUF, 49, aven. Lamotte-Picquet, Paris.
- Ovigénine Bouty 3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
- *Ovo-lécithine Billon POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
- *Ovomaltine Etabl. WANDER, 58, rue de Charonne, Paris.
- Ovothyrol DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
- *Ovules Chaumel 78, faub. Saint-Denis, Paris.
- *Ovules Derma ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
- *Ovules Roche HOFFMANN-LA ROCHE & Co 21, pl. des Vosges, Paris.
- Oxycyanure d'hydrargyre GUILLAUMIN, 168, boulev. Saint-Germain, Paris.
- *Oxydothyrique Paris 4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
- *Oxydovarine Paris 4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
- Oxygénés du Dr Prim 27, rue Fourcroy, Paris.
- Oxygène-Bore Obs A. OBOUSSIER, 10, r. Victor Hugo, Neuville-sur-Saône.
- Oxygénozone 11, rue Saint-Sabin, Paris.
- *Oxymenthol Perraudin Laborat. SCIENTIA, 7, rue Fromentin, Paris.

P

- *Pain essentiel Heudebert 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
- *Pains spéciaux Heudebert 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
- Pahudase Corbière 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Panbiase Antiphymique Lab. CHARRON, à Nantes.
- *Panbiline Labor. de la PANBILINE, à Annonay (Ardèche).
- Pantromine J. TINARDON, 17, rue Cadet, Paris.
- *Pancalcine L. PAPET, 15, r. d'Etampes, Bourdan (S.-et-O.).
- Pancréas-Endocrisines 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
- Fournier
- Pancréatine Defresne MACQUAIRE, Les Lilas (S.).
- *Pancréatotaric GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris.
- Pandigitale Houdas H. RIVIER, 26, rue St-Clément, Paris.

Pangaduine	SOUILLARD & C ^{ie} , 41, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
*Pangestyl Narty	G. TINARD, 134, boulevard Péreire, Paris.
*Panglandine Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
*Panhémoi	BOUYSSOU & C ^{ie} , 90, avenue des Ternes, Paris.
*Panlacto-Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Pantopon Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. Vosges, Paris.
*Panuroi Tissot	34, boulev. de Clichy, Paris.
Panvalérine Delattre	10, rue du Bac, Paris.
*Papaine Trouette	15, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
Papier Albespeyres	FUMOÛZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Papier du D ^r Baume	ROGIER, 19, avenue de Villiers, Paris.
Papier Barral	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Papier Fayard	DALET, 94, b. des Batignolles, Paris.
*Paracarbochloryl	ALEZARD, 76, rue Réaumur, Paris.
*Paraffinéol Hamel	HAMEL, Le Mans,
Paralactine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Paratétanine	Institut MERIEUX, 17, rue Bourgolat, Lyon.
Paralaxol	TULIVET, à St-Germain-en-Laye.
Parathyroïde-Endocrisines Fournier	26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
Para'oxine Lemolne	8, pl. de la Madeleine, Paris.
*Paroxyl	THIRIET & C ^{ie} , 26-28, rue des Ponts, Nancy.
Pastilles Brunelet	22, rue Turbigo, Paris.
*Pastilles Citon	STAMBACH, à Colmar (Alsace)
Pastilles de Cocaïne Midy	9, rue du Colonel-Moll, Paris.
*Pastilles Géraudel	GÉRAUDEL, 36, rue Rivay, Levallois-Perret.
Pastilles Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Pastilles de Mackenzie	40, r. Bienfaisance, Paris.
*Pastilles Méry	Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroy, Paris.
*Pastilles laxatives Miraton	à Châtel-Guyon (P.-de-D.)
Pastilles Vichy-Etat	24, boul. des Capucines, Paris
Pâte Aubergier	CÔMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Pâte Berthé	FUMOÛZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.

- Pâte thionique Ram- 12, rue Beautreillis, Paris.
baud
- Pectine
- Pectopunch Mousnier
- *Peiogastrine
- *Péiospanines
- Penghawar Vicario
- *Pepto-fer du D^r Jalliet
- *Peptokola Robin
- *Peptonal
- *Peptonate de fer Robin
- Peptone Byla
- Peptone Catillon
- Peptone Chapoteaud
- Peptone Defresne
- *Peptone Vassal
- Pepto-Thymoi Gigon
- Peptovalériane Gigon
- Péricols Legros
- *Péristaltine Ciba
- *Perles Taphosote
- *Peroxydines
- *Persodine Lumière
- Pertussin Salle
- Pessaires Chaumel
- Pessaires J. P.
- Pétroléine Lancelot
- Phagocytine Bureau
- Pheneucalyptol
- Phénoi Bobœuf
- Phénosaiyl Tercinet
- *Phlyctol
- *Phoscaigène
- *Phosféryl Fournier
- *Phosoforme
- *Phosote Lambiotte Fr.
- Phosphersyl colloidal
du D^r Pinard
- *Phosphate Vital de
Jacquemaire
- TINARDON, 17, r.Cadet, Paris
à Sceaux (Seine).
- LICARDY, 38, boulevard. Bou-
don, Neuilly-sur-Seine.
- FOURNIER Frères, 26, boul.
de l'Hôpital, Paris.
- 17, boulevard. Haussmann, Paris.
- DARRASSE, 13, r. Pavée, Paris
- 13, rue de Poissy, Paris.
- DURET & REMY, 5, avenue
des Tilleuls, Paris.
- 13, rue de Poissy, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 3, boulevard. Saint-Martin, Paris.
- VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
- MACQUAIRE, Les Lilas (S.).
- 28, r. Hôpital Militaire, Lille.
- 7, rue Coq-Héron, Paris.
- 7, rue Coq-Héron, Paris.
- 74, r. Raspail, Bois-Colombes.
- 1, pl. Morand, Lyon.
- LAMBIOTTE Frères, 3, rue
d'Edimbourg, Paris.
- 135, rue de Rome, Paris.
- 9, cours de la Liberté, Lyon.
- 4, rue Elzévir, Paris.
- FUMOUBE, 78, faub. Saint-
Denis, Paris.
- PENEY, 242, av. Berthold,
Lyon.
- 11 bis, rue du Conservatoire,
Paris.
- 26, rue Saint-Claude, Paris.
- MOUSNIER, à Sceaux.
- ALEXANDRE Fils, 47, rue
de Rome, Paris.
- LEMAITRE, 158, rue Saint-
Jacques, Paris.
- Lab. ROBERT & CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris.
- LESCAROUX, à Châteauroux
- 26, boulevard. de l'Hôpital, Paris.
- DROUET & PLET, 37, rue
de Marly, Rueil.
- 3, rue d'Edimbourg, Paris.
- à Angoulême (Charente).
- à Villefranche (Rhône).

*Phosphatine Fallères	6, rue de la Tâcherie, Paris.
Phospho-Fluor	38, rue Poulet, Paris.
Phospho-Guaiacol Mary	32, rue de l'Ouest, Paris.
*Phosphogène Favri- chon	à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
Phosphinal Juin	3, quai aux Fleurs, Paris.
Phosphocol Tissot	34, boulev. de Clichy, Paris.
*Phosphorgane	BERNAMONT, 87, rue du Commerce, Nevers.
Phosphotal Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Phosphure de zinc Clin	id.
*Phosphrine	DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
Phostrychnol	CHANTEREAU, 8, rue de Constantinople, Paris.
*Phylactone Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Physéine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Phylosthénine	DROUET & PLET, 37, rue de Marly, Rueil.
*Phytinate de Quinine Ciba	O. ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon.
*Phytine Ciba	id.
Phytol	Lab. ALBARRAN, 3, rue Cha- nez, Paris (16).
*Phytothérapie Colre	5, boulev. Montparnasse, Paris.
Pilules antidiabétiques Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pilules antidyspeptiques Lancelot	H. RIVIER, 26, rue Saint- Claude, Paris.
Pilules Bengué	47, rue Blanche, Paris.
*Pilules Blancard	64, rue La Rochefoucauld, Paris
Pilules Bland	24, place des Vosges, Paris.
Pilules Bosredon (d'Orléans)	GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
Pilules Couplier	20, r. Louis-le-Grand, Paris.
Pilules Crauck	34, boulev. de Clichy, Paris.
Pilules du D ^r Cronier	75, rue de la Boétie, Paris.
Pilules Cuticura	3, avenue Lowendal, Paris.
*Pilules du D ^r Debouzy	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
*Pilules Doumer	A. BOMEL, à Annonay (Ardéc.)
*Pilules Gip	64, boulev. Port-Royal, Paris.
*Pilules héliénennes Vaud	29, rue Philippe-de-Girard, Paris.
*Pilules d'Hermal	H. RIVIER, 26-28, rue Saint- Claude, Paris.
*Pilules du Docteur Séjournet	LEPRINCE, 62, rue de la Tour, Paris.
Pilules Lartigue	FUMOUBE, 78, faub. Saint- Denis, Paris.
*Pilules Lemang	14, rue Palais-Grillet, Lyon.

- Pilules de Moussette 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 *Pilules Philippe 14, rue Palais-Grillet, Lyon.
 *Pilules purgatives du 147, faub. Saint-Denis, Paris.
 D^r Dehaut
 Pilules de Quassine FREYSSINGE, 6, rue Abel,
 Frémint Paris.
 *Pilules réductrices à Châtel-Guyon (P.-de-D.).
 Miraton
 Pilules savonneuses DELOUCHE, 356, rue Saint-
 Boissy Honoré, Paris.
 *Pipérazine Midy 4, r. du Colonel-Moll, Paris
 Pipérazol Tissot 34, boulevard de Clichy, Paris.
 Piscidia Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.
 Pituglandol Roche 21, place des Vosges, Paris.
 Pitullobine Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Pisol Koekly 7, rue Rodier, Paris.
 Placenta-Endocrisines 26, boulevard de l'Hôpital, Paris.
 Fournier
 *Placentodose D^r FRAYSSE, 130, rue d'A-
 boukir, Paris.
 Plasma de Quinton 54, faub. Saint-Honoré, Paris-
 *Plurion Couturieux 18, avenue Hoche, Paris.
 *Pneumobiol 27, rue Cavenne, Lyon.
 Pneumo-calcine 50, rue Rennequin, Paris.
 *Pneumogéline Renard 142, avenue de Clichy, Paris.
 *Pneumotonic Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
 *Pnoliol Lab. NOVALIS, 1, r. Chavanne
 Lyon.
 Podophylle Coirre 79, r. du Cherche-Midi, Paris.
 Poliol Churchill 12, rue Castiglione, Paris.
 Polybromure Gonnon 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Polyformlate Coutu- 18, avenue Hoche, Paris.
 rieux
 *Pommade adrénos- Laborat. MIDY, 4, rue du
 styptique Midy Colonel-Moll, Paris.
 Pommade Cuticura 3, avenue Lowendal, Paris.
 *Pommades ophtalmolo- 98, rue Saint-Ginès, Bordeaux.
 giques du D^r Guiraud
 Pommades Royer LAUMONIER, 225, rue Saint-
 Martin, Paris.
 Potlon Boissel 4, cours Cicé, Bordeaux.
 Potlon Bonnet TINARDON, 17, r. Cadet, Paris
 Poudre américaine MORIDE, 20, rue La Roche-
 Leroy foucauld, Paris.
 *Poudre Escoufflaire à Balsieux (Nord).
 Poudre de viande BLOTTIERE, 6, r. Dombasle,
 Favrot Paris.
 Poudre de viande TROUETTE, 15, rue Im-
 Rousseau meubles-Industriels, Paris.
 Poudre de viande TROUETTE, 15, rue Im-
 Trouette meubles-Industriels, Paris.

Poudre du D ^r Cléry	53, boulevard. St-Martin, Paris.
*Poudre Esplé	20, rue Saint-Lazare, Paris.
*Poudre Génia	AMOUROUX, 188, rue du Chemin-Vert, Paris.
Poudre Jifa	FOUGERAT, 44, r. Chaptal, Levallois-Perret.
Poudre Lartigue	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Poudre Laxative de Vichy (du D ^r Sou- lligoux)	G. PRUNIER & C ^{ie} , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Poudre Paterson (Dhane)	11, rue Alphonse-de-Neuville Paris.
Poudre sulfureuse Simon	MARIANI, 41, boulevard. Hauss- mann, Paris.
*Preventyl	40, rue d'Enghien, Paris.
Procuta	Labor. BRISSON & C ^{ie} , 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
*Produits diététiques	FAVRICHON, à St-Sympho- rien-de-Lay (Loire).
Produits de Régime "Therma Vichy"	17, pl. du Champ de Foire, Vichy.
Produits Ugma	17, r. des Magasins, Strasbourg.
*Propidon	Etab. POULENC Fr., 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
*Prosthénase Galbrun	8, rue du Petit-Musc, Paris.
Protéozymase Courret	75, r. Saint-Dominique, Paris.
Protéol	5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Protiode Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Protylène Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. Vosges, Paris.
*Proveinase	MIDY Frères, 4, r. Colonel- Moll, Paris.
Prunelline Bost	à Villefranche (Rhône).
*Psalnase Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Pulmine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Pulmocardine	PERROCHON, à Valence-sur- Rhône (Drôme).
Pulmonine Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
Pulmosérum Bailly	15, rue de Rome, Paris.
Pulmostéryl	LÉSCAROUX, à Châteauroux (Indre).
*Purganol Daguin	5, rue des Remises, Saint-Maur (Seine).
Purgyl Kochly	7, rue Rodier, Paris.
Purific	SOUCHEYRE, 118, avenue de Villiers, Paris.
Pyramidon	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Pyrélaïne Collas	GRIGNON, 2, r. Duphot Paris.
*Pyréthane	Labor. CAMUSET, à Ablon (Seine-et-Oise).
Pyroléol Edet	à Alençon (Orne).

Q

*Quassia-Kina-Rabot

Quassine Fréminet

*Quilétol

*Quina Baron

*Quina-fer Mechling

Quina Laroche

*Quinby (Quinlo-Bismuth)

*Quinéase

*Quinéline

Quinine Pelletier

Quinium Roy

Quinoforme Lacroix

*Quinoïdine Duriez

*Quinquina Gmet

Quinquina granulé

Astier

Quinquina Watelet

Quiphos Churchill

49, rue de Ditcho, à Courbevoie (Seine).

6, rue Abel, Paris.

POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.

P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon.

à Mulhouse.

COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

CANTIN, à Palaiseau.

DROUET & PLET, 37, rue de Marty, Rueil.

10, rue Fromentin, Paris.

VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.

81, boulevard Suchet, Paris.

31, r. Philippe-de-Girard, Paris.

20, place des Vosges, Paris.

27, faub. Monmartr., Paris

Labor. ASTIER, 45, rue du Docteur Blanche, Paris.

BLANCHOT, 15, aven. Montsouris, Paris.

12, rue Castiglione, Paris.

R

Radjunal Chevrler

Rami-gouttes

*Reconstituant Mary

*Rectoline

*Rectopanbiline

Rectosol

*Régénérateur pulmonaire du D^r Bouyer

*Régyl

Rein-Endocrisines

Fournier

*Renotanic Grémy

*Résyl

Remède d'Abyssinie

Exibard

Retroplutine Carrion

21, faub. Montmartre, Paris.

FOUGERAT, 44, rue Chaptal, Levallois-Perret.

LAYADOUX, 32, r. de l'Ouest Paris.

CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.

Labor. de la PANBILINE, à Annonay (Ardèche).

CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.

BARTHELEMY, 5, rue Dugommier, à Nantes.

Lab. FIÉVET, 53, r. Réaumur, Paris.

26, boulev. de l'Hôpital, Paris.

14, rue de Clichy, Paris.

Lab. CIBA, 1, pl. Morand, Lyon.

BLOTTIERE, 6, rue Dombasle, Paris.

54, faub. Saint-Honoré Paris.

- Révuksior
 *Rhagadine Bracquemond
 *Rhéantine Lumière
 Rhésal-Vicario
 *Rhinargyne
 *Rhino-Menthol
 *Rhodarsan
 *Rhodazil
 Rhodocaïne Coutureux
 *Rhoféline
 *Rhonnol Leprince
 Rhoïnopalmine
 *Riodine Astier
 Roburène Dehay
 Rosanol
 *Royérine Dupuy
 *Rubyl
 *Rythmos
 PAULIN & BARRÉ, à Tours.
 71, avenue de Villers, Paris.
 9, cours de la Liberté, Lyon.
 17, boulev. Haussmann, Paris.
 DÉBŒUF, 10, rue Washington
 Paris.
 CARTILLIER, 48, rue de
 Berri, Paris.
 USINES DU RHONE, 21, rue
 Jean-Goujon, Paris.
 id.
 18, avenue Hoche, Paris.
 USINES DU RHONE, 21, rue
 Jean-Goujon, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 5, boul. des Brotteaux, Lyon.
 45, rue du D^r Blanche, Paris.
 rue Saint-Géry, Arras.
 L. HINGLAIS, à Epervain (M.).
 225, rue Saint-Martin, Paris.
 POULENC Fr., 92, r. Vieille-
 du-Temple, Paris.
 Labor. LEYSIN, 1 bis, rue
 Molitor, Paris.

S

- *Salbine du D^r Fayès
 *Salénal Ciba
 *Salène Ciba
 Salicarbine Viel
 Sallcéral
 Sallcol Dussaule
 *Salla Châtel-Guyon
 Miraton
 Salubrine Phénix
 *Salyptol Narty
 *Salsérum
 *Sambul Gondard
 Sangule Dubat
 Sanogyl
 Sanoram
 Santal Blanc
 Santal Bretonneau
 Santal Cln
 Santal Midy
 *Santal Morat
 3, rue du 4-Septembre, Paris.
 1, pl. Morand, Lyon.
 id.
 7, rue Saint-Yves, Rennes.
 COMAR 20, r. des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 à Châtel-Guyon (Puy-de-D.).
 60, rue Saussure, Paris.
 G. TINARD, 134, boulevard
 Péreire, Paris.
 DROUET & PLET, 37, rue
 de Marly, Rueil.
 à Evreux (Eure).
 80, faub. Saint-Denis, Paris.
 LA BIOTHÉRAPIE, 3, rue
 Maubanc, Paris.
 id.
 à Narbonne (Aude).
 26, rue Saint-Claude, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
 6, rue Daubigny, Paris.

Santalol Monagu	49, boulev. Port-Royal, Paris.
Santal P. Petit	12, boulev. Saint-Martin, Paris.
Santal salolé Lacroix	31, r. Phil.-de-Girard, Paris.
Santeïne Montagu	13, rue des Lombards, Paris.
*Santhéose	4, rue du roi de Sicile, Paris.
Santogenol Caubin	CARTERET, 9, rue des Pyramides, Paris.
Sapolan	R. CAVAILLÉS, 34, rue de Turin, Paris (8 ^e).
*Saturol	DURET & RÉMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
*Sauge Gmet	27, feub. Montmartre, Paris.
Savelline Savé	2, even. Parmentier, Paris.
*Savon antiseptique	A. RICHELME & C ^{ie} , 12, rue Jacquend, Marseille.
Lieutaud	3, avenue Lowendal, Paris.
Savon Cuticura	6, rue de Béarn, Paris.
Savon Mollard	A. RICHELME & C ^{ie} , 12, rue Jacquend, Marseille.
*Savons pharmaceu-	RAMBAUD, 12, r. Beautreillis, Paris.
tiques S. P. A.	12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.
Savons Vassy	Etabl. SANDOZ, 5, r. de Metz, Paris.
*Savon Vigier	COMAH, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Scillarène	USINES DU RHÔNE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Scorogènes	id.
*Scurénalline	id.
*Scurocaline	Jean-Goujon, Paris.
*Scuroforme	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
*Sécacornine Roche	164, rue Saint-Honoré, Paris.
Sédacrine Crestey	97, avenue Marceau, Paris.
Sédatif Logeals	7, rue Coq-Héron, Paris (1 ^{er}).
*Sédatoxe Gigon	54, r. Francs-Bourgeois Paris.
Sedlitz Ch. Chanteaud	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
*Sédobrol Roche	Labor. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
*Sédogène Sallé	157, rue des Sèvres, Paris.
*Sédol Bulsson	DEHAUSSY, 44, rue Inkermann, Lille.
*Sédoneurol	VIGIER, 12, boulev. Bonne-Nouvelle, Paris.
Sedrocadinol	LONGUET, 34, rue Sedaine, Paris.
Sektal Grémy	ODINOT, 25, r. Vaneau, Paris.
*Sel digestif B. M. C.	11, rue Milton, Paris.
*Sels Le Perdriel	16, rue Bouleinvilliers, Paris.
*Sel de Hunt	140, feub. Saint-Honoré, Paris.
Sel Jollivet	

Sei de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
*Sélénol Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
Seivan Couturier	18, avenue Hoche, Paris.
Sei Vichy-Etat	24, boul. des Capucines, Paris.
Sénophile Foucher	BRUNEAU, 61, rue de La Rochehoucauld, Paris.
*Seotral	Lab. LEYSIN, 1 bis, r. Molitor, Paris.
*Septicermine Cortiai	125, rue de Turenne, Paris.
Séquardine Bouly	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
Sérénol	50, rue Rennequin, Paris.
Séro-Comprimés	Lab. GAVIGNET, 4, rue Alph. Fochier, à Lyon.
Séroferrine	LEMATTE, 5, rue Balu, Paris.
*Séroplase	Sté Fse d'OPOTHERAPIE (S. F. O.), 58, r. Taitbout, Paris
Sérosthényl Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
Sérum antiasthmatique de Heckel	CORBIERE, 27, rue Desre- naudes, Paris.
*Sérum antiphymique Vadam	9, rue Mogador, Paris.
Sérum antityphoïdique de Rodet	Lab. AGUETTANT, 36, quai Folchiron, Lyon.
Sérum Coliye	BYLA, 26, av. de l'Observa- toire, Paris.
*Sérum Neurophile Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
*Sérums Fraisse	8, rue Jasmin, Paris.
Sérums de l'Institut Mérieux	17, rue Bourgelat, Lyon.
*Sérum Oliviero	87, r. Denfert-Rochereau, Paris
*Sigmodine G.émy	14, rue de Clichy, Paris.
Sigol	à Saint-Fons (Rhône).
*Silicyl	Labor. CAMUSET, à Abion (Seine-et-Oise).
*Silisode	MICHEL, 22, rue des Ber- nards, Paris.
*Sinahin	CARTERET, 15, r. d'Argen- teuil, Paris.
Sinapisme Rigollet	13, rue Pavée, Paris.
*Sinapiasme du Dr Faure	4, rue Brunel, Paris.
*Sinrénaïne	DEHAUSSY, 44, r. Inkermann Lille.
Sirodion	228, rue de Paris, à Montruil- sous-Bois.
Sirope d'Aconit Ecalie	157, rue de Sèvres, Paris.
Sirope antilasthmatic Favrot	BLOTTIERE, 6, rue Dom- basle, Paris.
Sirope d'Aubergier	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
*Sirope Auzes	BLANC & C ^{ie} , Agen.

Sirop Berthé	78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Sirop de Blancard	64, r. La-Rochefoucauld, Paris.
Sirop Briant	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Sirop Buc	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Clérambourg	4, rue Tarbé, Paris.
Sirop Crosnier	6, rue Chanoineasse, Paris.
Sirop Delabarre	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Sirop Derbecq	74, boul. Beaumarchais, Paris.
*Sirop de Digitale	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Sirop Dubois au Créosol	Lab. LALRUF, 49, aven. Lamotte-Picquet, Paris.
Sirop du D ^r Dubreuil	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
Sirop de Dusart	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Sirop Famel	26, rue de la Réunion, Paris.
Sirop ferrug. Laroze	2, rue des Lions, Paris.
Sirop Blottière	6, rue Dombasle, Paris.
*Sirop Gélinau	MOUSNIER, à Sceaux.
Sirop de Gilbert	à Maisons-Laffitte (S.-et-O.).
*Sirop Girard	48, rue d'Alsia, Paris.
Sirop Grimault	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
Sirop Guilhaumon	DEGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Sirop du D ^r Hecquet	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop d'Hémoglobine Byla	26, avenue de l'Observatoire, Paris.
Sirop Henry Mure	71, rue Saint-Jacques, Paris.
Sirop Ferré	6, rue Dombasle, Paris.
*Sirop du D ^r Gélinau	J. MOUSNIER, à Sceaux (S.).
*Sirop Grillel	BÉLIERES, 19, rue Drouot,
Sirop Jane	3, rue du Trésor, Paris.
Sirop Jolivet	140, faub. Saint-Honoré, Paris.
Sirop de Lamouroux	73, rue Sainte-Anne, Paris.
Sirop du D ^r Manceau	à Château-du-Loir (Sarthe).
*Sirop de la Maternité	LAURIN, 86, boulev. Port-Royal, Paris.
Sirop Nourry	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Sirop Patrice	DEBCEUF, 10, r. Washington, Paris.
Sirop phéniqué Déclat	PRUNIER, 6, rue de la Tacherie, Paris.
Sirop polyiodure Gen- non	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
*Sirop Prega	44, rue Inkermann, Lille.
Sirop Rabuteau	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

Sirop Rami	FOUGERAT, 44, rue Chaptal, Levallois-Perret.
Sirop Rébillion	13, rue des Minimes, Paris.
Sirop du D ^r Reinwiller	DÉGLOS, 131, rue de Vaugirard, Paris.
Sirop Roche au thlocol	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
* Sirop de Teyssède	34, faub. d'Angoulême, Limoges
Sirop Tréhyou	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop tribromuré Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
Sirop Vacheron	4, av. Vallicoud, Ste-Foy (Lyon)
Sirop Vauthier Marq	93, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop des Vosges	68 bis, av. de Châtillon. Paris.
* Sistolensine Ciba	1, place Morand, Lyon.
Soderseïne	18, rue de Beaune, Paris.
* Solubaine Nativelle	49, boulev. Port-Royal, Paris.
* Soluroi	COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Solution Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
* Solution Henry Mure	Pharm. BOREL, à Annonay (Ardèche).
* Solution Laroyenne	DUREL, 7, boul. Denain, Paris.
Solution Pautauberge	165, r. Saint-Denis, Courbevoie
Solution Schoum	6, rue Corvetto, Paris.
* Somnifène Roche	HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
* Soneryl	POULENC Fr., 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
* Sorgal Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.
* Sornyl	CHENAL & DOUILHET, 22, r. de la Sorbonne, Paris.
Sous-nitrate de Elsmuth Thulane	BAUDRY, 68, boulevard Malesherbes, Paris.
Sorol Churchill	12, rue Castiglione, Paris.
Sparadraps Le Perdrtel	11, rue Milton, Paris.
Spartéine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Spasma Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
* Spasmaïne Roche	21, place des Vosges, Paris.
* Spasmine Jolly	27, rue Mazarine, Paris.
* Spectrol	71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
* Sphérullines " Montcour "	46, aven. Victor-Hugo, Boulogne-Paris.
Spirillan	PALLOC, 23, r. de Berne, Paris
* Splénodose	D ^r FRAYSSE, 130, r. d'Aboukir, Paris.
* Splenotanlc	GRÉMY, 14, r. de Clichy, Paris
* Stanion Couturieux	18, avenue Hoche, Paris.
* Stannoxyl	37, rue de Bourgogne, Paris.
* Stannylose Thévenot	21, rue des Roses, Dijon.

- * Staphylase du D^r Doyen LEBEAULT, 5, rue Bourg-
l'Abbé, Paris.
- * Staphylocide Audras 89, boul. Victor-Hugo, Calais.
- * Staphylo-coccine Laborat. SCIENTIA, 10, rue
Fromentin, Paris.
- Fraquet M. BONNET, 102, rue du 11-
 Stéarol Novembre, Saint-Etienne.
- * Sténergine BEAUGONIN, 4, place des
 Vosges, Paris.
- Sténofor Lumière 9, cours de la Liberté, Lyon.
- * Sténophyl Vigan 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- * Stéramline Lab. des Antiseptiques Chlorés,
 40, rue Thiers, Le Havre.
- * Stibyl POULENC Fr., 92, r. Vieille-
 du-Temple, Paris.
- Stomacol Boulet 36, avenue Duquesno, Paris.
- * Stomophile Lab. DORANTOWICZ, 17 bis,
 avenue Parmentier, Paris.
- * Stovaine Billon POULENC Fr., 92, r. Vieille-
 du-Temple, Paris.
- * Stovarsol id.
- Stronal Monnier 19, r. Chartres, Neuilly-s-S,
- * Strophantus Catillon 3, boulev. Saint-Martin, Paris.
- * Strychnal Longuet 34, rue Sedaine, Paris.
- * Strychnarsitol Robin 13, rue de Poissy, Paris.
- * Strychno-Fluocodyle Labor. LAFARGE, 6, rue de
 Babylone, Paris.
- Styrum Chalon à Bagé-le-Châtel (Ain).
- Succcharure Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
- * Succomusculline Chalx 10, rue de l'Orne, Paris.
- Sucre Edulcor Ferré 142, boulev. St-Germain, Paris.
- Sue Wlandyl 27, rue des Petits-Hôtels Paris
- * Sulfarène (Laborat. du), à Agen.
- Sulfarsenol Pluchon 36, rue Claude-Lorrain, Paris
- Sulhydryl Ch. Chan- 54, rue des Francs-Bourgeois.
 teaud Paris.
- Sulfo-Benzol VAURS, 239, faubourg Saint-
 Honoré, Paris.
- Sulfo-bore Roy 81, boulevard Suchet, Paris.
- * Suffodermol RAMBAUD, 12, r. Beautreillis,
- * Suffoidol Robin 13, rue de Poissy, Paris.
- Suffoléine Rozet BENDERITTER, à Vendôme.
- Sulfo-mel du D^r Fayès 3, rue du 4-Septembre, Paris.
- * Sulfo-rhinol Fayès 3, rue du 4-Septembre, Paris.
- Sulfureux Poullé 112, rue du Bac, Paris.
- Sulfurine du D^r Lan- ADRIAN, 9, rue de la Perle,
 glebert Paris.
- * Sulfurion Couturieux 18, avenue Hoche, Paris.
- * Sulfuryl Monal 6, rue Daubigny, Paris.
- Sulphaqua Pépin 9, rue du 4-Septembre, Paris.
- Sulphénine Trouette 15, r. Immeubles-Industriels,
 Paris.

Superoi	33, rue de Vaugirard, Paris.
*Supparyre du D ^r Faucher	Labor. TISSOT, 34, boul. de Clichy, Paris.
*Suppo-Gynai	LEES, 124, rue du Bac, Paris.
*Suppositoires Chaumei	FUMOUE, 78, faub. Saint- Denis, Paris.
Suppositoires Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
*Suppositoires Midy	4, rue du Colonel-Moll, Paris.
*Suppositoires Pépét	18, avenue de Villiers, Paris.
Suppositoires Raynai	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Suppositoires Royer	225, rue Saint-Martin, Paris.
Surrénaie-Endocrisines Fournier	26, boulev. de l'Hôpital, Paris.
Surrénaline Bouty	3 bis, rue de Dunkerque, Paris.
*Surrénotanin Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
Syncaline Clln	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Synergyl Vadam	29, rue Mogador, Paris.
*Synthol	Produits Biologiques, Les Aydes (Orléans).
Syphilitothérapie Duret	DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.

T

Tablettes du D ^r Bousquet	140, faubourg Saint-Honoré, Paris.
*Tablettes oxymenthol Perraudin	Lab. SCIENTIA, 10, rue Fro- mentin, Paris.
*Tablettes Perroud	7, rue des Archers, Lyon.
Tablettes de thyroïde	CATILLON, 3, boulev. Saint- Martin, Paris.
*Taburoi Monai	6, rue Daubigny, Paris.
*Tœnifuge Kirm	DANIEL-BRUNET, 6, rue de la Source, Paris.
Tœnifuges Limousin	Lab. DELATTRE, 10, rue du Bac, Paris.
Tamar Indien Grillon	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Tampol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
Tampovuies Corbière	27, rue Desrenaudes, Paris.
*Tanacetyl	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Tannurgyi D ^r Letan- neur	8, rue de Parme, Paris.
*Tarbisol	USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Tartrate Borico-potas- sique du D ^r Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Taxol	Lab. de Bio-Chimie appliquée, 21, r. Th.-de-Banville, Paris.

Teinture de Cocheux	AGUETTANT, 36, quai Fulchiron, Lyon.
Tercinol	158, rue Saint-Jacques, Paris.
*Terkal Monal	6, rue Daubigny, Paris.
Ternose Trouette	18, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
Terpine Gonnon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Terpine Vigier	12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.
Terpinol Adrian	9, rue de la Perle, Paris.
Testicule-Endocrisines Fournier	26, boulev. de l'Hôpital, Paris.
Tétralaine Routhier	à Vierzon (Cher).
*Thalassotonine Vadara	9, rue Mogador, Paris.
*Thalaxine	DURET & REMY, 5, avenue des Tilleuls, Paris.
Thapsia Le Perdriel	12, rue Milton, Paris.
*Thébaïl	USINE DES AUBRAIS, 286, faubourg Bannier, Orléans.
Théinol Bailly	15, rue de Rome, Paris.
*Théobromine Dubat (Théïsine)	89, faub. Saint-Denis, Paris.
Théobromine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Théobromine Houdé	9, rue Dieu, Paris.
Théobromine Rousseau	à Ermont (Seine-et-Oise).
Théobromine Vicario	17, boulev. Haussmann, Paris.
*Théobromose	DUMESNIL, 10, r. du Plâtre, Paris.
*Théobryl	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
*Théosalvose	GUILLAUMIN, 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
Théosol Rousseau	à Ermont (Seine-et-Oise).
Théoxantine	Lab. DEGLAUDE, 6 bis, rue d'Assas, Paris.
Thiarsol	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Thigénol Roche	F. HOFFMANN-LA ROCHE & C ^{ie} , 21, pl. des Vosges, Paris.
*Thiocol Roche	id.
*Thionhydrol Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Thiopeptone du D ^r L. Bru	F. MOULIN, 2, rue Léon-Cogniet, Paris.
Thymus-Endocrisines Fournier	26, boulev. de l'Hôpital, Paris.
*Thymine	DELABRE, 11, chaussée de la Muette, Paris.
Thymusine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thyratoxine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Thyrénine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Thyroctéine Grémy	14, rue de Clichy, Paris.

Thyrodose	D ^r FRAYSE, 130, r. d'Aboukir, Paris.
Thyroïde-Endocrisines Fournier	26, boulev. de l'Hôpital, Paris.
Thyroïdine Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Thyroïdine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Thiodine Cognet	43, rue de Saintonge, Paris.
*Tisane Saint-Luc	Comte de GRAUWE, 16, rue de Rocroi, Paris.
Tissus emplastiques Le Perdriel	11, rue Milton, Paris.
*Tochlorine	Etabl. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple; Paris.
*Tonikéine Chevreton	5, rue Balbu, Paris.
Tonliécithine Rogier	19, avenue de Villiers, Paris.
Tonique Gannon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Tonique nerveux Koenig	37, avenue Marceau, Paris.
Toni-sérum Freyssange	6, rue Abel, Paris.
*Tonudol	LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.
*Topique Bertrand	Labor. du TOPIQUE BERTRAND, à Oullins (Rhône).
Topiques Chaumel	FUMOUE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Trépol	CHENAL & DOUILHET, 23, rue de la Sorbonne, Paris.
*Tribromure Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Tricalcine	Labor. SCIENTIA, 10, rue Fromentin, Paris.
*Tridigestine Dalloz	13, boulev. de la Chapelle Paris.
*Triféryl	HAUTDIDIER, 37, r. Gallée, Paris.
*Trinitrine Caféinée Dubois	Labor. LALEUF, 49, avenue Lamotte-Picquet, Paris.
Trinitrine Vicario	17, boulev. Haussmann, Paris.
Trisodine Terna	78, boulevard des Batignolles, Paris.
Tritonine	64, rue des Tournelles, Paris.
Trixyl Fraudin	4, aven. Desfoux, Boulogne-sur-Seine (Seine).
*Tubérol	23, rue des Moines, Paris.
Tubes Bayard	BEYTOUT & CISTERNE, 12, boulev. Saint-Martin, Paris.
*Tubes Duclis	D ^r FERRY, à Bourg (Ain).
Tubes Levasseur	23, rue de la Monnaie, Paris.
*Tuberculine C. L.	POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
*Tubes Sals	Labor. du TOPIQUE BERTRAND, à Oullins (Rhône).
Tulle gras Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.

U

- *Ultrine Berger 90, rue du Bac, à La Varenne-Saint-Hilaire (Seine).
- Ulmaire Gmet 27, faub. Montmartre, Paris.
- *Ulmarène Gigon 7, rue Coq-Héron, Paris.
- Ulmarol tGigon 7, rue Coq-Héron, Paris.
- Ultragen Leclerc 10, rue Vignon, Paris.
- *Uracétose 28, rue de Sévigné, Paris. ¹
- Uraiyisol Lab. Thérapie bio-chimique 159, av. de Wagram, Paris.
- *Urasol Lab. OBERLIN, 17, r. Cadet, Paris.
- *Uraseptine Rogier 19, avenue de Villiers, Paris.
- *Urazinc USINES DU RHONE, 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Uréol Ch. Chanteaud 54, r. Francs-Bourgeois, Paris
- *Urifluine BEAUGONIN, 4, pl. des Vosges Paris.
- Urtisol du Dr Des-champs 49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
- *Urisanine 28, rue Milton, Paris.
- *Urnotol 10, rue de Richelieu, Paris.
- *Urodol Clérambourg 4, rue Tarbé, Paris.
- Uroformine Gobey BEYTOUT & CISTERNE, 12, boulev. Saint-Martin, Paris.
- *Urométine Lamblotte 3, rue d'Edimbourg, Paris.
- Frères
- Urophille Bailly 15, rue de Roma, Paris.
- *Urosan DUFAYARD, 12, rue des Saints-Pères, Paris.
- *Urotrypsine Demasles à Vienne (Isère).

V

- *Vaccins BEAUGONIN, 4, place des Vosges, Paris.
- Vaccin antigonococ- OLIVIERO, 87, rue Denfert-rique Rochereau, Paris.
- Vaccin antituberculeux Lab. des Industries Biologiques, 25, rue Royale, Paris.
- Bossan
- Vaccins antipollin BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Vaccins atoxiques POULENC Frères, 92, rue Vieille-du-Temple, Paris.
- stabilisés
- Vaccins atoxiques Institut de Biologie appliquée, 30, avenue Reille, Paris.
- Cépède
- *Vaccins Bactériens Labor. Médical de Biochimie, 16, rue Dragon, Marseille.
- I. O. D.
- *Vaccins microbiens GRÉMY, 14, rue de Clichy, curatifs Paris.
- *Valbournine Rogier 19, avenue de Villiers, Paris.

*Valéral Puy	à Grenoble (Isère).
Valéramyl	188, faub. Saint-Martin, Paris.
Valérianate Gabail	3, rue de l'Estropade, Paris.
*Valérianate Grignon	2, rue Duphot, Paris.
Valérianate Laboureur	245, rue de Vaugirard, Paris.
Valérianate Pachaut	130, boul. Haussmann, Paris.
*Valérianate Pleriot	26, rue Saint-Claude, Paris.
Valériane Byla	36, av. de l'Observatoire, Paris.
Valériane Dausse	4, rue Aubriot, Paris.
*Valériane Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Valérianose Gigon	7, rue Coq-Héron, Paris.
*Valérobromine Legrand	DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, Paris.
Valéromenthol	Pharmacie Internationale, 71, faubourg Saint-Honoré, Paris.
*Valéronal	Labor. BERGER, 14, rue des Pyramides, Paris.
*Valimyl	COMAR & C ^{ie} , 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Valyl Midy	4, rue du Colonel-Motl, Paris.
*Vanadarsine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Vanadine Chevrier	21, faub. Montmartre, Paris.
*Vanuciéol	MÉROBIAN, 29, r. Philippe-de-Girard, Paris.
Varénols	BLANCHARD, 26, rue des Trois-Frères, Paris.
Varénofermets	id.
Varicine Béraud	12, rue Cadet, Paris.
Varicure Marek	G. MONNIER, 19, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine.
*Variilaxine	CRESTEY, 164, rue Saint-Honoré, Paris.
Vasogènes	43, rue Pinel, à Saint-Denis.
*Vasolaxine	FOURNIER Frères, 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Végétaline Dubois	LALEUF, 49, aven. Lamotte-Picquet, Paris.
Végétol Fournier	GASTÉBOIS, 8, r. des Quatre-Fils, Paris.
*Veinosine	LEBEAULT & C ^{ie} , 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
*Vériane	BURIAT, 30, r. Pergolèse, Paris.
*Véronidia Bulsson	157, rue de Sèvres, Paris.
Vésicatoires d'Aibes-peyres	FUMOUBE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Viburnum Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Vinsigre de Pennès	3, rue de Latran, Paris.
Vin d'Anduran	MOUSNIER, à Sceaux (Seine).
Vin Aroud	6, rue Dombasle, Paris.
Vin de Baudon	12, rue Charles-V, Paris.
Vin Bravais	3, rue Mogador, Paris.

Vin Brisse	VIVIEN, 6, r. d'Abbeville Paris.
*Vin de Bugaud	LEBEAULT, 5, rue Bourg- l'Abbé, Paris.
Vin de Chassabng	G. PRUNIER & C ^{ie} , 6, rue de la Tacherie, Paris.
Vin de Coca-Kola	CHEVRIER, 21, faub. Mont- martre, Paris.
Vin Désiles	18, rue des Arts, Levallois- Perret (Seine).
*Vin Girard	48, rue d'Alésia, Paris.
Vin de Kola Midy	4, rue du Colonel-Moli, Paris.
Vin de Lavoix	5, avenue Victoria, Paris.
Vin Marlani	41, boulev. Haussmann, Paris.
Vin de Moride	LANDRIN, 20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Vin Nourry	COMAR, 20, rue des Fossés- Saint-Jacques, Paris.
Vin de Séguin	165, rue Saint-Honoré, Paris.
Vin Urané Pesqui	au Bouscat-Bordeaux.
Vin de Vial	36, place Bellecour, Lyon.
Vin Voguet	5, r. Eugène-Delacroix, Paris.
Vioforme Ciba	ROLLAND, 1, pl. Morand, Lyon
*Vitamyli	Lab. Produits Biologiques, 6, r. de la Daignerie, Lille.
Vivassol	FUMOÛZE, 78, faub. Saint- Denis, Paris.
Voltargol Robin	18, rue de Poissy, Paris.
*Vulcase	Lab. BRISSON & C ^{ie} , 111, rue du Mont-Cenis, Paris.
*Xémaderm	CHLOT, 59, r. Châteaudun, Paris.
*Yaourtine	PRUNIER, 16, r. Saint-Gilles Paris.
Yoghourt Karlos	Lab. Biologique, à Léchelle (Nord)
Yoghourt Lagnei	7, rue de la Pépinière, Paris.
Yohourth Carrion	54, faub. Saint-Honoré, Paris.
Yohimbine Gilbert	3, rue du Trésor, Paris.
*Yse	Lab. de l'Yse, 62, rue Louis- Blanc, Paris.
Ystaline	A. CEDARD, 2, pl. du Théâtre- Français, Paris.
Zédene	37, rue de Bourgogne, Paris.
Zodac	Moulins de Puteaux (Seine).
*Zohol	Labor. de Bio-Chimie appli- quée, 21, rue Théodore-de- Banville, Paris.
Zomol	VIAL, 8, rue Vivienne, Paris.
*Zymatine Lescène	à Livarot (Calvados).



